



Collectanea medica

<https://hdl.handle.net/1874/348805>

Medic: **E** ♦ J.

1. 1700

Comis omnibus Comes Paris.

*Ego amicos iucundis,
Inimicos mitis et facilis.
Exoraber antequam roger.*

Sente. de Mt. beata. 20.

levum recens.

Scripta varii arg.

N° 401

*Mat. VI, pl. 2
n° 21
Var. 401 = 6*

**Hs.
7 E 27**

Synopsis Methodica Pharmacor: orūm Nicolai Dacier. Ticini 1614. // 4^o
 Systema Parascenasticum ad Praxin Māe Medicæ Sylvam completens, D. Morelli. Genevæ. 1620. // 4^o
 Formulæ
 Methodus ad Praxin Ioan: Helicij. Luigd: Bat: div: annis. // 4^o // 4^o
 Sennarti institutionum
 Fernely methodi medendi libri IV posteriores. Wittembergæ 162 // 4^o
 Formulæ et medicorū Petri Corraij. Paris: 15 // 16^o et Genevæ 16 // 16^o
 J: Scyronij methodus medendi. Genevæ: 162 // 16^o.
 Leonb: Fuchsij compend: Medicinæ. Basil: 15 // 16^o aut Paris. 15. // 16^o
 And: Christiani Enderid: medic: Tinnarellij Lib: 7^o. Basil: 1509. // 16^o
 And: Casalspini Speculum Artis Medicæ Hippocraticæ. Argent: 16. // 16^o

Gal: iv. de usu part: 13. sub persona Platonis: Cap: Bootij ultrajectini.
Ditiores sapientia ad virtutis
perueniunt: si verba neglexerim.

do. 12. c. xxxii.

Scal: exercit: cix. 3.

Hinc ad modum partita est Natura visus, atq[ue]
operas in y[s], quia condidit; ut idem non solum diversis
sit diversam speciebus; sed etiam eodem in corpore
alias atq[ue] alias comparat effectiones. A Sole incipit,
idem sane dealbat Capillum; cutem facit atam.
Desiccet Vitum, Solvit Butyrum, etc.




De Medicamentorum compositione

Aoniceletius . p: 873.

Lentivi liquoris, q̄ quamvis repellant, n̄ tamē exasperant. a. v. Albinus Ori
stingunt, sed propria sua substantia moderatiōna sūt, ut Famigraci dect.
Dez: p. 96. Lac. opt.

P. 24. HEPATICA FRIGIDA ex hepaticis pharmacis nullū esse debet videri
menter refrigerans. Gal. VIII. de comp. med. s. l. Dez: p. 97.

Dez: Guajaci usus. (333)




Pur: 1:291.

Purgationum differentia VII

650.

- III simplices, { Cholagoga, Plegmagoga, Melanagoga.
- III ex complicatione dilatarum, { Cholagoga et melanagoga, Melanagoga et Plegmagoga, Plegmagoga et Cholagoga.
- I ex complicatione omnium, { Cholagoga Plegmag: et Melanag:


Hemagogen medicamentum nullum cepit
 neq; etiam opis fuit, dum modi vacuandi san-
 guinis, hi fieri sint, Pblebotomia, Cerebritalia,
 Scazificatio, Sanguisuga, Flectio intor nasos.
 Alij modi attrahendi sanguinis & medicamenti vim
 perniciosa sunt et letalis: prater eos q sunt ad sangui-
 nem provocandum ab hemorrhoidibus, & mensibus multioribus. agen
 Pur: 290. h. 20, c.



Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to be organized into a list or table structure with several lines of text and some vertical lines suggesting columns or sections.

Item. 159.
Vitis

{	Tenuis in Acutis morbis	{	(Simplior) Tenuis in Acutis simpliciter.	Hydrofacchar.
	et quatuor		Misa n colata	
			Tenuior in Peracutis	Succus Prismanae
			Tenuissimus in Peracutis	Hydrofacchar.
{ Crassus in longis seu Chronicis morbis.				



Acetosa, Oxalis.

Eudivia, Intubus sativus, } IV Intuba vulgo utantur
Ciccorium, Intubus agrestis, }

Eudivia.
Ciccorium.
Ciccorita.
Scariola.

Tussilago, Farfara, Ungula caballina, Bechion, Josephbad.

Leptospermum, Milium solis.

Lichen, Hepatica.

Fuchsia sayacantha, Berberis,

Nymphaea, Nymphaea.

Acoris averis, Calaminis Aromaticis,

Rad: China, Apios.

Agallochum, Xylolobos, Lignum Aloes,

Solidanella, Brassica marina,

Elaterrimum, Sucus Cucumbris agrestis.

G. Strapium, Sagaptemum.

Dentalis, Mandibula Lincis (sive Lincij piscis) Conus Lincis.

Stacium, Carabo.

Apia Napos, sive Flo: Aromaticum.

Perma, Gummi Jambere,

Zyzypha, Jambere,

Myxaria, Schistia,

Rad: Dictamni albi, sive Fraxinella,

Acanthium, Atractilis Hierosolym, Card: Benedic:

Ogminum, Basilicon:

Pentaptyllum, Tormentilla,

Ira Antihetica, Chamaelytis,

Herba Paralytic, Antihetica, Primula Veris, (Berberonica aspera, Flerum q major est.)

Sal Baizacis officinaru a Boona. Lt. 50. Moril. 96.

Anagallis Aquatica, Biscabunga

Eufatorium, Agriemonia.

Polygonum, Centinodia.

Calceolar, Citriobium istum

Compobolux est Nibuli album (sicut etiam habentur Turtia, quamvis nunc Gettriam

Cadniam pro Turtia habent)

Olibanum, sive Res masculina.

Rad: Helicij, sive Emilia Camp.

Spodium, sive Ebis istum.

V. Myrcaloni { citrina, - obolagoga
 { berbula, - pbligmag:
 { emblica, }
 { helvetica, }
 { inda. - - melonag:

III. Santala, { alba,
 { citrina,
 { umbra.

Symphytium, seu Consolida { major,
 { minor,
 { sarconica.

Azitolocbia longa,
 { rotunda,

capite mactans
Q, il sp
fandi seligat
post diei, 1799
aromunat 1800
fructuorum

Si Oculorum morbi species nondum tibi satis cognita
perspectaque sit; hinc ne properes remedia adhibere:
sed rem totam naturam committito. Natura enim
proba vivendi ratione absoluta et iuxta, aut mortis
profligabit, aut patefaciet & vias profert:
Incerta quippe medicatio, & irrita, nisi discretio
discernitur. Si quid forte experiri cogaris,
leve id esto, ne fiat in re ancipiti factura
gravis. Fern: T. Metb. 3.

○varietas familiarium plurimum facit ad decus,
& splendorem tam artis, quam artificis: ad
salutem aegri nihil aut parum. L. 59. d.

Acabum descriptionibus multum
difficilius suadet. Adolf. Goallius Prof.
propter multa ingredientia, si abis
dubitandum potius sit, quam de certi
statuendum.

III imprimis ad curationem morborum in qualibet parte
 consideranda veniunt, in quorum recta dispositione Sa-
 nitas, mala vero Morbi vel Simularis, vel Organici,
 vel Communis consistit. Sicut, & haec tria

Temperies, quae in mixta, } ratiocinatione a Physiologo
 quam Usus — } apprehenditis.

Compositio. } quae colorum ab Anatomico considerantur.
 Unio. — }

Formae T. Meth: 1, et 7.

Sicut ex quibus mendum ars constituitur: tria itidem
 quae ad horum notitiam nos ducunt.

- 1^o Affectus seu Morbi Species, demonstrat Remedy Genus,
 unum, an multa esse noceat: si unum, simplex an
 compositum: si multa, simulne omnia, an sigillatim,
 sigillatim et quo quaeque ordine, legitimum, an posterius.
- 2^o Aff: seu Morbi quantitas, notat facit Remedy Quantitatem,
 quam validam, quo pondere, quoties, et quam diu
 exhibendum sit. Considerando etiam aegri naturam.
- 3^o Partis affectus, conditio, docet Remedio Utendi modum,
 per quae loca abigendus morbus, cui sedi adhibendus remediis,
 qua forma, quo morbi tempore, quavis hora.

~~consensus et societas
 in eam partem affectam se
 adhibent utque procedat.~~

partis situs, cui sedi adhibendus remediis: subiectus
 consensus et societas, et via in aff: parte di recta,
 quomodo intro sumendum remedium
 conformatio et consensus per quae loca abigendus morbus.

Affectus Species et partis natura ac situs, qua forma exhibi-
 dum remediis

~~Sex in lacte dies, ter sunt in sanguine tremi,
Bis seni caeterum, ter seni menses figurant. // 45.~~

~~Nervorum conjugationes. // Processus mammillares, ad dorsum.~~

~~Optica prima, oculos movet, altera, tertia gustat,
quartaque, quinta audit, sexta, Septima lingua.~~

~~Esuicant, vigilent, somnant, qui obsecrata creant.~~

~~Sex in lacte dies, ter sunt in san~~

Causa hystericalia.

antecedens.

contingens.

A. 41.

Alia ubi.

Symptoma

fructus lactis.

Exemplum: Kuesel.

Simpl.: Lax: affectus.

~~Sex in lacte~~

PHARMACIA.

Medicinae practicae partes, quae ab
operandi modo sumuntur, tres sunt,
Dialyticam, Therapeuticam, Praeparativam.

De postrema hac, Pharmacia utitur,
sic agere nostri est instituti. Quae quidem
demum reliquis duabus eo majoris est momenti,
quod medicamentorum omnium
administrandorum viam praemonstrat, quae
quibus praxin medicam exercere, et ad
quosvis affectus remedia praescribere sit
paratus.

Illius vero duae sunt partes.

Prima materiam medicam exponit.

Materia medica omnium medicamentorum,
tam simplicium quam Compositorum,
tam Internorum quam Externorum
penit uberrimum complectitur.
Ex quo ad omnes partes naturam affertur
fuerit expugnandos convenientia Remedia,
et ad quaslibet indicationes perficiendas idonea, deservunt.

Secunda praecpta tradit, quibus
varia medicamentorum formulae ex
ista materia componuntur.

Tanta est huius partis utilitas, ut
quicumque medicamentorum formulae
componendi regulam regulam noverit,
nunquam in praescribendi modo errare
possit.

2.
PARS PRIMA.
de Materia Medica.

Materia medica duplex est, Sim-
plex & Composita.

Simplex ex tribus fontibus deservi
solet, Plantis, Animalibus, Mineralibus.
Priorum ordinem in singulis classibus
sumus observaturi.

Composita in Pharmacopaeorum
officinis haberi solet. Quam eo ordine
proponemus, ut minus composita medi-
camenta præceptis magis composita
precedant.

Simplicia vero & composita secun-
dum facultatum classes proponuntur,
ut facilius indicationibus Medicis inser-
viri possint.

Utraq; duplicia sunt, Interna &
Externa.

Interna hic vocamus, quæ interna-
rum affectuum curationi sunt accom-
modata.

Ne quis agere ferat nos in Inter-
narum Catalogo illa etiam admiscere,
quæ foris admoventur: Sciat nos hic
Interna appellari, non solum quæ intra
corpus assumuntur, sed etiam quæ foris
admoventur, dummodo affectuum inter-
narum curationi inserviant. Quod
magno Tyrorum factum est commodo,
ut ad eandem indicationem adim-
plendam materiam internam &
externam simul congestam reperiant.

Externa vero, quæ curandis affectibus
externis inservire solent. Itæ-
dæ hujus primæ partis erunt Sectionis.

Prima

Prima materiam medicamentorū
internorū proponit.
Secunda vero materiam Extēre-

1.^a PARTIS SECTIO prima.
de Materia Medica interna.

In morborū internorū cūsa u-
tione præcipue indicationes respici-
unt vel Causas morbificas, vel Morbos,
vel ipsas partes affectas.

Causæ morbificæ majori ex parte
sunt varij humores, qui prout varijs
qualitatibus peccari solent, ita varia
requirunt medicamenta contrarijs
qualitatibus donata. V. G. Frigidi
humores calida, calidi frigida, ten-
nues incrassantia, Crassi attenuantia
Corrupti tandem expurgantia poscunt
remedia. Et ita de Cæteris.

Morbi quandoq; sublatis suis causis
permanent, et præuentionem exposcunt
curationem per contraria remedia,
ut luculenter in generali methodo
medendi docetur.

Partes deniq; affectæ corroborantia
requirunt, et alterantia specifica,
qualia sunt Cephalica, Thoracica,
Cardiaca, Stomachica, Hepatica, &c.
quæ omnia ordine suo proponentur.

Porro omnis hæc materia vel sum-
mits ex Plantarū Radicib; Lix-
quis, Corticib; Folijs, Seminib;,
Fructib; Florib; Gummas, Resi-
sivis, Liquorib; Succis; vel
ex Animalib; integris, aut ipsorū
partib;

partibus, tam viventibus, quam non
 viventibus, & Excrementis: vel deni,
 que ex mineralibus, qualia sunt,
 Terra, Succo concreti, Minerale salu
 pidis, & Metalla. Ex quibus omnibus
 varia composita parantur in Offi
 cinis, ut: Aqua, Symplicia, Conserua,
 Pulueres, Trochisci, Confectiones,
 Electuaria, Pillula, &c.

MATERIA MEDICA INTERNA, Simplex
 & composita constat
 xxxvii facultatibus.

1.	- Bilem refrigerantia & attenuantia.	-
2.	- - - - - & increasantia.	-
3.	- Pituitam calefacientia & attenuantia.	-
4.	melanchol: alterantia.	Splenica calida - 21.
5.	Atra Bilem pparantia.	- - - frigida - 22.
6.	Aperientia calida.	Nephritica calida - 23.
7.	- - - frigida.	- - - frigida - 24.
8.	Sudorifica.	Lithonteplica - - 25.
9.	Digestiva calida	Conceptum solvantia. 26.
10.	- - - frigida.	Partium coaduantia. 27.
11.	Cephalica calida.	Menses moventia. 28.
12.	- - - frigida.	- - - sistantia. 29.
13.	Thoracica calida.	Lac generantia. 30.
14.	- - - frigida.	- - - minuentia. 31.
15.	Cardiaca calida.	Semen generantia. 32.
16.	- - - frigida.	- - - Extinguentia. 33.
17.	Hepatica calida.	Flatus dissolventia. 34.
18.	Hepatica frigida.	Astringentia. 35.
19.	Stomachica calida.	Lumbicos emectia. 36.
20.	- - - frigida.	Vulneraria interna. 37.

De singulari ordine.

Cap. 1.

CAP. I.
Medicam: Bilem ^{refrig:}
Lacten:

SIMPLICIA.

Rad:

Acetosa,
Cichorij,
Graminis,
Asparagi,
Oxylapathi.

Fol:

Capit: rivinosis
Endivia.
Cichorij.

Sem:

W frig: majora.
Endivia.
Hordei.
Acetosa.

Fruct:

Poma involuntia.
Pruna acida.

Flor:

Cichorij.

Gum:

Campbora.

Liqoz:

Acetum.
Omphacium.
Succi.

Limonium.
Citiorum.
Azantiorum

Endivia.
Acetosa.
Cichorij.

COMPOSITA.

Ag:

Acetosa.
Cichorij.
Graminis.
Endivia.
Hordei.

Syz:

de Limonib:
Capill: Ven:
Acetof: simpl:
Cichorij simpl:
de Succo Acetosa.

Syz: Adiantij.

Consecr:

Fl: Cichorij.
Acetosa.
Capilli Vener:
Cerasa condita.

Pilv: &

Electuaria.

Diamargariton frig:
Diatrision Santa len.
Diarbodon Abbatis.

W.

Bilem ^{refrigerantia.}
L Incoasiantia.

SIMPLICIA.

Rad:

Rad:

Althaa.
Plantaginis.

Fol:

Portulaca.
Lactuca.
Malva.

Sim:

Portulaca.
Lactuca.
Malva.
Papav: albi.
Pnyllij.
Cydoniarum.
Bombacis.

Fz:

Injuba.
Sebestebis.
Cydonia pyza.

Fl:

Violaz.
Nymphaea.
Papav: Rubros.

Suc:

Amyli.

Gum:

Arabicum.
Tragacanthum.

Animal:

Cornu Cervi.
Spodium.

COMPOSITA.Aq:

Lactuca.
Portulaca.
Papav: Rubros.
Nymphaea.
Resarum.

Syz:

Violacinis. x
Injubarum.
Papaver: albi.
— — Rubros.

Mel: & Sacch:

mel rosatum.
// violacinum.
Sacch: rosatum.

Condit:

Resarum.
Violarum.
fl: Nymphaea.
Lactuca condita.

Elect:

Diatragacanthis:
Diaprodium sine speciebus.

Troch:

de spodio.
— Capryza.

III.

Pituita calefacientia
Lactoniantia

SIMPLICIA.Rad:

Emilla

x. violaceis sillis in Explan
vendis. eo qd in dilectio
nem dicitur in hinc viciah.
Fozit. III. Obs. d. 14.

Enula Campana.
 Cypri.
 Galanga.
 Petroselinum.
 Feniculi.
 Zedoaria.
 China.
 Salsa parilla.
 Zingiberis.
 Apij.

Lig:

Guajacum.
 Sassafras.
 Xyloaloes.

Cort:

Citri sicci.
 Guajaci.
 Cinnamomum.

Fol:

Salvia.
 Thymi.
 Majorana.
 Mentha.
 Origani.
 Pulgij.
 Rosmarini.
 Betonica.
 Calamentum.
 Chamadryes.
 Chamopytyos.
 Absintij.

Sem:

Dauci.
 Feniculi.
 Petroselinum.

Anisi.
 Apij.
 Amlos.
 Citri.
 Cardui Bened.
 Carni.

Fl:

Antbos.
 Botonica.
 Lavendula.
 Macis.
 Salvia.
 Staebados.

Fr:

Cubebazum.
 Seselios.
 Piper.
 Cardamomum.
 Garyophylli.

Anim:

Moschis.
 Castoreum.
 Zibeta.

Miner:

Ambazum.
 Chalybs pparatz.

COMPOSITA.

Aq:

Absyntij.
 Botonica.
 Card: Bened.
 Cinamomi.
 Calustis.
 Feniculi.

Hyssop

Hysopi.
Impatiens.
Melisse.
Salvia.
Theriacalis.
Aq. vita.

Ol: Olym:

Anisi.
Feniculi.
Cinnamomi.
Gazyophylorum.

Syr:

de Absynthio: vulgari
Conditura Cortic: Citri.
de Hysopo.
— Mentha.
mel rosatum.
Oxymel simplex.
— — composit.
de Radicibus.
de Stachado.

Cond: et Cons:

Cortic: citri conditi.
Rad: Emil: Comp: cond.
Myrobalani cond.
Fl: Salvia.
— Stachados.
Linzibz conditi:
Foliz: Absynthii.
Antbos.
Rad: Accos cond:
Nuxa moschata cond:

Confect:

Alchemis.
Aurca Alexandrina.
Mithridatum.
Tberinca.

Pilv: et Elect:

Diantra.
Diamoschum.
de Gemmis.
Dianthes.
Dianis.
Diagalanga.

Trocb:

de Absynthio.
Alipta moschata.
de Eupatorio.
Gallia moschata.
de Mirza.

IV.

Melanchol: attenuata

Melancholicis humor
ut frigidus est et siccus,
ita calfacientibus indi-
get et humectantibus
medicamentis. Cum
vero major calfaci-
entium pars etiam ex-
siccet, illis ideo, que pre-
ciliam vim obtinent
humectandi sunt ad-
miscenda, ut in seqq. fit.

SIMPLICIA.

Rad:

Apj.
Byglossi.

Em

Eringy.
Famici.
Enula campana.
Petroselin.

Cortic.

Radic: cappar.
Citri.
Mediani Praxim.
— — sambuci.
— — Thamazisci.

Fol:

Fumazia.
Lupulozum.
Melista.
Polytrichi.
Boragin:
Byglosi.
Capill: Mentis.
Cetrac.
Cuscuta.

Sem:

Famici.
Ocymi.
Anisi.
App.
Cucurbita.
Agni casti.
Citri.
Cardus Bened.

Fz:

Cappariz.
Uva Corinthiaca.
Grana Chermis.
Passula.

Poma redolentia.

Fl:

Boraginis.
Byglosi.
Calendula.
Crocus.
Gonista.
Sambuci.
Tamarisci.
violarum.

Gum:

Ammoniaccum.
Bellelinum.
Mener.
Chalybs Prapatz.

COMPOSITA.

Aq:

Boraginis.
Byglosi.
Card: benedicti.
Famici.
Melista.

Syr:

Bysantinis.
Capill: venedis.
De Fumazia simpl.
— Pomis redolent.
— Radicibus.

Conser: & Cond:

Radic: Enul. Camp.
Corticis Citri.

Flor

Florum Genista.

— — — Tamarisci.

— — — Boraginis.

— — — Byglossi.

Confectura violarum.

Radix Cappas: cond:

Cortex Citri cond:

Myrobalani cond:

Confect:

Confectio Albizinis.

Tberiac.

Pulv: & Elect:

Dianthea.

Dianthisim dulc.

de Gemmis.

Latificans Galeni.

Troch:

de Absinthio.

— Capparibus.

Gallia moschata.

V.

Atram bilem attenuata.

— vel melanobolium

admixtam preparantia.

Eadem sc. medica //

mixta requirit sero

ac bilis: quia tamem

crassa est, miscenda

attenuantia, parva tu

dosi, mixta caliditatis,

et si etiam humiditas

sint adijungenda. Hec

autem precipue

sint in atra

bile temperanda.

SIMPPLICIA.

Rad:

Byglossi.

Boraginis.

Liquiritia.

Fol:

Boraginis.

Byglossi.

Fumaria.

Lupulorum.

Sem.

W friz: majora.

Fl:

Boraginis.

Byglossi.

Nymphaea.

Violarum.

Fr:

Poma sedolentia.

COMPOSITA.

Aq:

Boraginis.

Byglossi.

Nymphaea.

Syr:

Violarum.

Pomoz: sedolentis.

Consi:z.

Lactuca condita.

Flor: Nymphaeis.

Violarum.

Rad: & Fl: Byglossi.

Fl: Boraginis.

Nymphaea.

VI

10a

Rad: V Apri coltis.

cal: { Apri.
 Feniculi.
 Petroselini.
 fo: { Coaninis. — al: Asparagi.
 Rhei.

VI.
Aperientia calida.

SIMPPLICIA.

Rad:

Apj.
Aristolochia longa.
— — rotunda.
Asazi.
Cypri.
Emula Campana.
Eryngj.
Feniculi.
Gentiana.
Petroselin.

Cort:

Rad: Cappasim.
retivilla Feaxini.
— — Tamarisci.

Fol.

Capillaris ocs.
Centaurj minoris.
Chelidonyi majoreis.
Hypozici.
Origani.
Pylagj.
Polytrichi.
Asiutij Rom.
Betonica.
Capill: venereis.
Calamentji.
Chama dryos.
Chama pyttos.
Ceteracj.
Artemisia in milieribj

Sem.

Danci.
Feniculi.
Petroselin.
Seselios.
Urtica.
Anisi.
Apj.
Amos.
Agni castj.
~~Cassia~~
Cardi Bemd.
Ciceris rubri.

Flor:

Antbos.
Betonica.
Cemista.
Hysopi.
Stachidos.
Tamarisci.
Sambuci.

Gum:

Ammoniacum.
Bdellium.
Myrra.
Terebintina.
Alois.

Liquor:

Quinum album
— Chalybatic.

Miner:

Chalybs.

COMPOSITA.

Aq:

Abfin

Cort:

Cinnamon.
Rad: Cassiam.

Cassia:

Fol:
Amygdala amara.

Tamarisci.

Fol:

Tamarici.
Euphorj. ad Agri monia.
Mazarij.
Nasturij. Atrij.
Cochlearia.
Bleubinga. x Anagall: eq.
Ciscula.
Tamarisci.

Absinthij.
 Betonica.
 Cardui bened.
 Cinnamomi.
 Faniculi.
 Hystopi.

Ol: Cym:

Anisi.
 Faniculi.
 Cinnamomi.
 #Terebintina.
 Spiritu Vitisoli.

Syz:

de Absinthio vulgari.
 Byzantiniis.
 Caymel simplex.
 — Composit:
 de V. radicibus.
 Rosarium siccaum.

Confit:

Zinziber conditum.
 Capill: Venetis.
 Fl: Genista.
 Rad: Emil: Camp:
 Fl: Absinthij.
 — Tamarisci.

Elect.

Aromatic: rosatum.

Confect:

Alicemmis.
 Theriaca.

Stroch:

de Absinthio.

de Capparisj.
 — Empatoriu.
 — mirba.

VII.

Aperientia frigida.

SIMPLICIA.

Rad:

Acetosa.
 Asparagi.
 Cicorij.
 Graminis.
 Oxylapathi.
 Rusc.

Fol:

Cicoribita.
 Hepatica.
 Endivia.
 Polytzibi.
 Acetosa.
 Agrimony.
 Cicorij.
 Capill: venetis.
 Ceterach.
 Capillaris ves.

Sem:

IV frig: majora.
 Acetosa.

Fl:

Cicorij.

COMPOSITA.

Aq:

Acetosa.
 Agrimony.

Cich

de Terebintina: thi. sicut Galen dicit
 est post. multo ipse est
 sicut: Rad: Alcamia Hungar. et
 sic pro Theriacis aliis abstrahit

Fol:

Fumaria.

Endivibita.

Sicut Limonium.
 Acetum.

Cichorij. -
 Endivia.
 Graminis.

Syr:

Acetosus simpl.
 Capillor: venis.
 Cichorij simplicis.
 de Limonibus.
 - Succo Acetosae.

Elect:

Diatizon Santalon.
 Diarrobios Abbatis.

VIII.
 Sudorifica.

Simplia.

Efficaissima.
 Lignum Guajacis
 & cortex.
 Sassafras.
 Radix China.
 - Salsaparilla.

Mimis efficaciter

Rad:

Angelica. Petroselin.
 Carlina. Apij.
 Scorzenera. Farniculi.

Liq:

Guajacum.
 Juniperinum.
 Sassafras.

Cort:

Guajaci.

Bardana. Pimpinella.
 Truncatilla. Zedaira.

Fol:

Scorj.
 Ulmaria.
 Cardui Bened:
 Bardana.

Sem:

Cardui Bened:
 Milij vulgaris.

Fl:

Cyami. Chamam:

COMPOSITA.

Aq:

Cardui Bened:
 Scabiosa.

IX.

Diuretica calida.

Simplia.

Rad:

Apij.
 Farniculi.
 Petroselin.
 Ononidis.
 Rhabbani.
 Valeriana.

Cort:

Cortex e mediana
 Cornuta efficacissima.

Fol:

Saxifragia.
 Silybustij.

Serbi

Terra sigill:

Cornu Cervi.

Res Sambuci.

Bisacordium minerali s. e. cum.

o. s. fixum sub diaphoretico.

o. s. fixum.

Herb:

Eryngij.
 Glycyrrhizae.
 Asparagi.
 Pimpinella.

Spica Nardi.
 Asarum.
 Absinth:
 Eupatorium.
 Valica.
 Betonica.
 Camositys.
 Chastitatis.
 Ruta.
 Scordium.

Sem:

Anisi.
Feniculi.
Cibicifolij.
Saxifrag:
Malva.
Alba.

Amigd. amara.
Nuclei Persici.
Ficus.

Sabinae.
Feniculi.
Nasturtij aquatici.
Pimpinella.
Apy.

Sem:

Lentisci.
Mily Solis.
Petroselini macedoni.
Rapdani.
Sesetos marfilienis.
Urtica.
Apy.

Cicera rubra.
Livisticij.
Semen Galinzi.

Fr:

Bacca Jampici.
- - Lauri.

Fl:

Genista.
Camomilla.

Gum:

Turbinthina.

Liq:

Vinum album.

Anim:

Sanguis Hiaci spaz.
Cantbaridi Beronic.

Minez:

Carabis.

COMPOSITA.Aq:

Apy.
Feniculi.

Sp: Sabir. ♀ ♀

Sabinae.

Syz:

Bysantinis.
Oxymel simplex.
- - composit:
Capilli Venet:
de 7 Radicibz.
Constru.

Fl: Genista.

X.

Diuretica frigida.

Simplicia.Rad:

Acetosa.
Asparagi.
Graminis.
Althaeae.
Oxylapathi.

Fol:

Capilli Venetis.
Herniariae.
Parietariae.
Acetosa.
Summitat: Asparagi.
Bis malva.

Sem:

iv frigida majora.
Acetosa.
Alkekengi.
Hordachm.

Flor:

Althaeae.

Gum

Gum:

Capivi.

Suc:

Limonium.

Fr:

Cucurbita. } caro
Peponas. }
Cucumeres. }
Feaga.

COMPOSITA.

Aq:

Acetosa.
Graminis.
Hordei.
Parietaria.

Syz:

de Althaa.
Capill: Veneris.
de Limonibus.

Cons:

Capill: Veneris.
Radic: Eriogly.
Cacui.
Cucurbita.

Troch:

de Capivi.

Corollarium.

Ad vacuantiu genus
spectant menses moru-
tia, qua tu ad hysteri-
coru Clazes melius
referunt. Imo potant.

XI.
Cephalica Calida.

SIMPPLICIA.

Rad:

Acozi.
Cyprzi.
Calami Aromatici.
Galanga.
Peonia.
Spica Nardi.
valeriana.
Zedoaria.
Jasos Florentina.

Lig:

Xyloalois.
Viscus Quercinus.

Coct:

Cinamomi.

Fol:

Salvia.
Lauri.
Majorana.
Poly montani.
Rozis marini.
Betonica.
Calamenthi.

Sem:

Peonia.
Cardamomum.
Sileris montani.

Fr:

Cubebazum.

Fol:

Hysopi. Herba Paralysis.
Melissa. Lignum Cassiis
Lavendula. Origani.
Ruta. Scrophularia.
Spica.
Viscus quercinus.

Grana

Grana Lermis.
 Gariophylli.
 Bacca Juniperi.
 ———— Lauri.
 Nuc myscata.

Flor:

Antbos.
 Betonica.
 Lily convally.
 Macis.
 Salvia.
 x Stachados.

Camomilla.
 Tilia arbores.

Minez:

Ambazim.

Aromata.

Gariophylli.
 Cinamomum.
 Xyloaloes.
 Macis.
 Jujuba.
 Cardomomum.
 Spica Nardi.
 Moschus.
 Zibeta.

Licit hac Aromata ad
 predictas classes referri
 possint, quia tamen in
 signiorum reborandi vna
 pia se ferunt, ideo se
 usim proprietas, ut
 commodius ad usum
 proprium revocari
 possent.

COMPOSITA.Aq.

Betonica.
 Cinnamomi.
 Celestis.
 Imperialis.
 Majorana.
 Napba v. fl. Alicantior.
 Salvia.
 Theriacalis.
 Aq. Vita.

Syz:

Mel antbosatum.
 de Stachado.

Conf:

Myrobalani conditi.
 Nuc moscata condi.
 Fl: Salvia.
 ———— Stachados.
 Zinziberis.
 Antbos.
 Radic: Acopi.

Conf:

Alkermes.
 Aitica Alexandrina.
 Nitridatum.
 Theriaca.

Pulv: & Elect:

Diambra.
 Diamelsum dulc.
 Dianbos.
 Diazis.

Troc.Flor:


Lavendula.
 Meliloti.

x. stachus Arabica vitam
 quasi rivis afflat, flus
 propterea cum ceteris admiscetur

Calamús feron:

herbarum hinc odorata caliditate
 succando caput reborant.
 Nimis arbor odorata maxime
 eas indicant, caput vapor
 etiam asplendo.

Diamarz: cal:



16a

Gal: II. xalà W
nos in finis
Cap. I.

Capiti nocentia

Semen castoris.
Lorè.
Affinitè succis.
Lac in potu.
Glandes quercina in cibo.
Olivæ nigrae.
Arbuti ferulæ.
Eruçæ.
Hederae Cæchinina.
Rhus.
Lentisci ferulæ.

Crocus.
Penedanum.
Cyclaminus sicca,
cùm vino opota.
Mandragora.
Cicuta.

Hyosciamus patens potatilis
tristitiam omnino dissipat
multis vero somnos
turbulenter inducit.

Troch:
de Carabi.
Gallia moschata.

Externa.

Ol:
de Castoreo.
Camomilla.
Jasinum.
Laurinum.
Nardinum.
Nucum.
Rutaceum.
de Spica.
Vulpinum.

Empl:

de Betonica.
- Baccis laevi.
- meliloti.
- nuciclagimibz.

XII.

Cephalica frigida.

Singula.

Lign:

Santali omnes.
ubi: citri: albas.

Fol:

Lactuca.
Portulaca.

Sem:

Lactuca.

Portulaca.
Papaveris albi.
Psylli.
in frigi: majora.

Suc:

Acetum.
Omphacium.
Opium.
Granatorum.
Limonum.

Lact:

Camporea.

COMPOSITA.

Ag:

Lactuca.
Nymphaea.
Papav: Abscond.
Portulaca.
Rosarium.

Syr:

Violaceis.
Narcoticis.
Papav: albi.

Cons:

Lactuca cond:
Fl: Nymphaea:
Rosarium.
Violarium.
Cucurbita.

Elect:

Flor:
Nymphaea.
Rosar.
Cicula.

si

Alipi Vasi
Columi Panipori.
Nellia.
Sacamabai.

his ab humilitatibus, praecipue in mellechallide
adhibere licet

Borrag:
Fyglif:
Poma strak
Amygd: dlla.

diam

Diantha.
Avena Alexandr:
Diacroed: Albatu.
Diacralli.
Mans Christi.

Diamargarit. frigid.
Diatrion Santalen.

Conf:

Philon: Roman. }
Requies Nicol. } Marcon
 } tica.

Pitt:

de Cynoglossa Must.

Externa.Ol:

Violaceum.
Nymphaea.
Rosatum.
Caphyra.
Omphacium.

Ung:

Rosaceum.
Populeum.
Refrigerans Galeni.
Ceratium Santalin.

XIII.

Theozacica calida.
attenuando & detur
gendo expectorantia.

Rad:

Aristolochia utriusq.
Enulla Campana.
Jasos Florentina.
Liquiritia
Zinziberis.
Scylla.
Diacunt. Heleny.
Azi. Angelica.
Pimpinella. vidis.

Fol:

Revis Solis.
Tussilaginis.
Thymi.
Hedera terrestris.
Hysopi.
Nicotiani pauca Testi.
 ga vomitoria.

Origani.
Prasfy albi.
Pedis Cat.
Calamentzi.

Sem:

Lini.
Urtica.
Brasica.
Seselis masiliens.

Fr:

Amygdal. dulc.
Dactyli.
Ficus.
Bacca Lauri.
Paspila dulces.
Nuclei pini.

Fl:

Croci.
Camomilla.

Gum:

Myrra.
Strobilina.

Animal:

Mel:
Pillmo Vulpis pparat.

Minea:Fol:

Britanica.
Vernica.
Cari: Britan.

Scabiosa qua Vernica
in parte ad spirit.

Sem:

Favus.

minera:
Flores Sulphuris.

COMPOSITA.

Aq:
Hysopi.
Tusfilaginis.

Syz:
Capill: venteris.
de Hysopo.
— Liquiritia.
— Tusfilagine.
Pedis Cati.
Oxymel Simplex.
— — Scillitic:

Cons:
Capill: venteris.
Radic: Enil: Camp:
Zinziberis.

Elect:
Diarrhis Salomonis.
— — Simplicis.

Sacc:
Gandam.

Externa.

Ol:
Jasinum.
Amygdal: dulc.
Camomilla.
Liliozum.
Airp:

Axungia Gallina.
— — Anatina.
— — Vitulina.
Butyrum recens.

Medul:
Cervina.
Vitulina.

Ung:
de Althaa.
Resumptivum.
Empl:
Fily Zacharia.

XIV.
Thoracica frigida.

Rad:
Althaa.
Liquiritia.
Fol:

Poly montani.
Capill: venteris.

Sem:
Malva.
Papaveris albi.
Pnylly.

iv frig: majora.
Althaa.
Bombacis.
Hordei.

Fz:
Dactyli.
Amygdal: dulc.

Pen-

Loob de pini
Loob de pulm: Valspi.

Tragacant: cal:
Diacaumontum
Diaprasium.

Pruna dulcia.
 Sebesten.
 Injuba.
 Nuclei pinei.

Fl:

Nymphæa.
 Papav: ^{Abcadas.}
 Violaceum.

Gum:

Arabicum.
 Tragacanthum.

Suc:

Amylum.
 Liquiritia succis.

Anim:

Caro Testudinis.
 — Canceri fluvialis.
 Lac muliebr.
 — — Asininum.
 — — Caprinum.
 Butyrum recens.

COMPOSITA.

Ag:

Hordei.
 Lactuca.
 Nymphæa.
 Papav: albi. ^{extrema}
 Portulacæ.

Syz:

Capill: ^{vincis.}
 Injubarum.

^{Abcadas.}
 Papav: albi.
 Violaceus.

Sacch:

Panidiatum.
 Rosatum. / Violatum
Cons:

Lactuca condita.
 Rosatum.
 Violatum.
 Fl: Boraginis.
 Caro Chenobita cond.

Elect:

Diamargarit: frig:
 Diapenid: ^{sin^o spiritib.}
 Diatragacanthum.

Diapapav.

Externa.

Ol:

Violaceum.
 Nymphæa.
 Amygdalar: dulc:

XV.

Cardiaca Calida.

Rad:

Zedoaria.
 Angelica.
 Dictamni, ^{sen^o Farindl}
 Dozonici.
 Gentiana.
 Pentaphylli.

Rad:
 Helvug

Spica

Pectori nocent

Nimis frigida, acida, rancida,
 acida, adstringentia.
 h: Felle immutabili,
 Mithridatum.
 Lepus maritimus.
 Ol: Nucum.

Spica Nazali,
Imperatoria.

Coct:

Citri sicci.
Cinnamomi.

Lign:

Xyloaloes.

fol:

Cardui Bened:

Scabiosa.

Melissa.

Poly.

Ocymy, ^{et Basiliconis.}

Roris marini.

Abrotani.

Lavendula.

Sem:

Ocymy.

Citry.

Cardui Bened:

Fl:

Anthos.

Boraginis.

Byglossi temperati.

Croci. Calandula.

Macis.

Melissa.

Fz:

Grana Tixtorum.

Garyophylli.

Nux moschata

Bacca Juniperi.

Gum:

Myrrha.

Mastix.

Thrs.

Suc:

Melissa.

Scabiosa.

Boraginis.

Anim:

Lapis Bezar.

Moschus.

Zibetia.

Sezicum cordum.

mintz:

Ambacum.

Succinum.

Anzum.

COMPOSITA.

Aq:

Cardui Bened:

Cinnamomi.

Celestis.

Imperialis.

Melissa.

Napha.

Roris marini.

Scabiosa.

Theriacalis.

Aq: vita.

Ol: Chym:

Cinna

Scordium Veronica.

Lignum Albu.

Cinnamoni.
Gasiophylozium.
Nucis muschata.

Syr:

Byzantinus.
Conditura Coct. Citri.

Cons:

Myzobalani conditi.
Nux muschata cond:

Flor: Anthos.
Corticis Citri.

Conf:

Alkermes.
Theriaca.

Elect:

Aromatic: rosatis.
Diambra.
Diamoschus dilect.
de Gemmis.
Latificans Galeni.

XVI.
Cardiaca Frigida.

Simplex.

Rad:

Acetosa.
Byglosi.
Bistorta.
Toomentilla.

Lign:

Santali omnes.

Fol:

Oxylapatbi.
Acetosa.
Boraginis.
Byglosi.

Sem:

Plantaginis.
Acetosa.
Cydoniozum.

Fl:

Boraginis.
Byglosi.
Xenupharris.
Rosazum.
violazum.

Fr:

Limonis.
Cydonia.
Gannata acida.
Poma odorata.
Ribes.
Cerasa acida.
Citria.

Gum:

Camphora.

Suc:

Folior: 27 pradicum.
Florum } pradicum.

Anim:

Lapis Bezoar.
Cornu Cervi.
Ebur.

Perla

Fol:

Agripa.
Plantaginis

Suc:

Citri.
Limonum.
Gannatoz.

Resata novella.

In Cordis palpitatum
(Diamarg: cal:
Diacambron.
Mithridatum.
Theriaca.

Resata novella de sebo ardente

Inter Cardiacā facile familiam ducunt, in pellenis rebis
noctis & venosiss, in tū Aquis Palpitation: infertat.

Lapis Bezoar: — a gr: ij. ad iij.

Cornū Cervi lot:

Margaritae s — — — — — ʒB.

Sal Perlatum Oriental:

¶ comminuta in subtiliori tenuis: aspersimata ut plurimum
cum

[Aq: Cinomoni

Aq: Card: Bezoar:

Syr: de Acetof: Citri] ad ℥ij

B. Fabae: iii. opus: physiol. & med: B.

226

Perla eximia.
Spodium.
Unicornu.
Os de corde Cerui.

Miner:

Bolus Armenus.
Corallus.
Aurum.
Fragmenta ptiosa.
Terza sigillata.

COMPOSITA.

Aq:

Acetosa.
Boraginis.
Byglossi.
Rosarum.

Syz:

Granatorum.
de Limonibus.
Violaceus.
de Siccis Acetosa.
Rosarum siccarum.
de Pomis edolentibus.

Cons:

Rosarum.
Violarum.
Rad: & Flor: Byglossi.
Folior: Acetosa.

Conf:

de Hyacintho.
Elect:

Diamargarit: frig:
Diatizon Sandalon.

XVII.

Hepatica calida.

SIMPPLICIA.

Rad:

Cypri.
Calami Aromatici.
Emula Campana.

Fol:

Centaurij minoris.
Mentha.
Absinthij Rom:
Agrimony.
Betonica.
Chamaedryos.
Chamaepytis.

Sem:

Feniculi.
Anisi.
Amicos.
Caryj.

Fl:

Anthos.
Macis.
Stachados.

Fr:

Gaziophylli.
Nux miscebata.
Passilae.

Rad:

Asparagi.

Fol:

Capill: ♀.
Salvia.
Chschta.
Hepatica.
Petrusilini.

Amigd. dulces.
amara.

Compo

Calamis Aromatici.
Castia liqua.
Cinnabulum.

Margarita.
Sapphirus.
Smaragius.
Lapis lazuli.

Mamis Boisti.
Diacoralli.

COMPOSITA.Aq:

Absynthij.
 Betonica.
 Mentha.

Syz:

de Absynthio vulg.
 Byzantinis.
 de Mentha.
 — V Radicibus.

Cons:

Corticis Citri.
 Rad: Enulae Camp:
 Myzobalani conditi.
 Nuc̄a mischata cond:
 Flor: Salvia.
 Anthos.
 Radic: Acort.

Conf:

Mithridaticum.
 Theriaca.

Elect:

Diatrium Santal:

Aromatic: rosatum.
 Diarrhodon Abbatij.
 Diambra.
 Diamuschum.

Troch:

de Absinthio.
 — Eupatorio.
 — Rhabarbaro.

Externa.Ol:

Nardinum.
 de Absynthio.
 — mentha.

XVIII.

Hepatica Frigida.Simplex.Rad:

Acetosa.
 Graminis.
 Asparagi.
 Cicorij.
 Ruscij.

Pol:

Dentis Leonis.
 Scartola.
 Endivia.
 Hepatica.
 Lactuca.
 Portulaca.

Acetosa.
 Capill: ventris.
 Cicorij.

Lign:

Santali omnis.

Fr:

Granata acida.
 Cucurbita.
 Pruna acida.
 Nuclei Persicorum.
 Cucumeris.
 Betebis.

Cera.
 Ribes.
 Fraga.

Succa

Suc:

Acetosa.
Cichory.
Granatorum.
Limonum.
Cydouorum.
Endivia.
Omphacy.

Anim:

Ebur.
Spodium.

Minez:

Corallus.

Fl:

Cichory. Viola.
Nymphaea.
Rosa rubra.

COMPOSITA.

Aq:

Acetosa.
Graminis.
Agrimony.
Cichory.
Endivia.
Rosarum.

Syz:

Cichory simpl.
— — composit.
Granatorum.
de Limonibus.
— Succo Acetosa.
Rosarum Sicarum.

Cons:

Berberis.

Florum Cichory.
Rosarum.
Folior: Acetosa.
Cerasa acida cond:

Elect:

Diamargaritum Saig.
Diatrion Santalen.
Diarrhodon Abbatis.

Troch:

de Spodio.
— Capryra.

Externa.

Ol:

Rosarum.
Omphacium.
Nymphaeas.

Urg:

Rosacum.
Ceratum Santali.
Refrigerans Galeni.

Stomachica calida

Simplexia.

Rad:

Cypero.
Calami aromatici.
Galanga.
Spica Nardi.
Zinziberis.

Coit:

Citri

Dialacca.
Diacurama.

Ad Hepat: &
Lienis obstru:
& Aq: in
terebinte.

Secundum Caprinum.

Sem: Saig: majora
minora
Hordei.

Syz: de Acetosa Romana, a phisicis
longe plures sit in Sapo resurgenti.
Syz: de acilliant Citeri, cum
pistruing siccum Citeri in solium
vix nulla sed et ex contrariis.
licet calidi expurget solent.

Citri succi.

Cinnamomi.

Liq:

Xyloaloes.

Fol:

Absinthij Pontici.

— — — Romani.

Betonica.

Mentha.

Rosmarini.

Salvia. Latri.

Sem:

Anisi. Cimini.

Feniculi. Carui.

Coriandri. ##.

Citri.

Piper.

Fl:

Anthos.

Betonica.

Croci.

Macis.

Salvia.

Gum:

Masticis.

Arom:

Gariophylli.

Nix mischata.

Macis.

Piper.

Spica Nardi.

Xyloaloes.

Croci.

Zinziber.

Cinnamomi.

Cardamomi.

Amber.

marca:

Ambacum.

Corallus.

COMPOSITA.Aq:

Absinthij.

Betonica.

Mentha.

Salvia.

Syz:

de mentha.

— Absinthio pontico

Conf:

Fol. Absinthij.

Anthos.

Radice: Acozi.

Cortic: Citri.

Myrobalani conditi.

Nix misch: cond:

Fl: Stachados.

Zinziber conditum.

Conf:

Alkermis.

Mithridatium.

Theziaca. (s: Xylabo)

Elect:

Aromatic: Rosat:

Diamba.

Diagalanga.

Droch:

de Absynthio.

— Rhabarbaro.

Externa.oleaBaica: Latri.
Lamperti.Asta novella.
Diatron Piper.
Dianisum.
Dia cuminum.
Aromat: Gariophylli.
Dia cinnamom.
Diagtingiber.

Ol:

Nardimim.
de Absynthio.
- Mentha.
Nucis muscator.
Masticimim.
Myrtimim.

Empl:

Pro stomacho.
de Mastiche. #

XX.

Stomachica frig:

Simplicia.

Rad:

Plantaginis.
Acetosae.
Santalii rubri.

Fol:

Plantaginis.
Myrtbi.

Sem:

Cydoniorum.
Plantaginis.
Myrtilli.

Fl:

Balaustiorum.
Rosae: rubrarum.

Fr:

Cydonia. Pyra.
Sorba. Persica.
Mespila. Citrilli.
Poma granata.
Fruga. Mora.

Suc:

Acacia.
Hypocystis.

Minez:

Corallus.

COMPOSITA.

Aq:

Rosarum.
Plantaginis.
Acetosae.

Syr:

de Aqesta.
Cydoniorum.
Myrtbinis.
Granatorum.
Rosarum siccas:
de Suceo Acetosae.

Cons:

Rosae: rubrar.
Fol: Acetosae.
Cecasa condita.
Ribes.
Berberis.

Elect:

Diatrion Santaloz.
Externa.

Ol:

Rosatum.
Lentiscinum.
Omphacinum.

Ung:

Rosae

Sacchari Rosatum.

Diarrhoedi. Abbatii.
Diaciton:

horum tanquam Emplastros
continuum usum esse
trivolum humorem
resistit, exsiccat
natura humiditatem
siccit M. Consil. p. 502

Fol:
Dioscoria. Cubory.
Zaithica.
Acetosae.
Endivica.

Fl:
Cydonicum.

Lign: Santalinum.

Rosaceum. Ungt.
Ceratum Santalin:

XXI.
Splenica Calida.

SIMPLICIA.

Rad:

Apij.
Aristolochia longa.
Calami Aromatici.
Enula Campana.
Juncus Florentina.

Cort:

Radic: Cappasim.
Cinnamomi.
Medulla Fraxini.
--- Tamarisci.

Fol:

Chamaedryos.
Chamaepytios.
Cotzrach.
Chscita.
Centaurij minoris.
Fumaria.
Sinnitat: Lspali.
Melissa.
Pyligij.
Thymi.

Sem:

Anisi.
Apij.
Agni casti.
Cardui bened:

Nasturtij.

Fl:

Calendula.
Croci.
Gonista.
Tamarisci.

Fz:

Cappasim.

Gum:

Ammoniacum.
Bicellium.
Myrrha.

Mim'a:

Chalybs preparatij.

COMPOSITA.

Aq:

Cardui bened:
Cinnamomi.
Feniculi.
Fumariae.
Melissa.

Syz:

de Fumaria.
Oxytel Scyllitichy.
de v radicibus.
--- Epithymo.

Cons:

Rad: Accosi.
Cort: Citri.
Gonista.
Flor: Tamarisci.

Conf:

Sambuci.

Amysq. Amara.

Rad:

Polypotij.
Gentiana.
Filiis.

Fel:

Asinatz.
Rutha.
Calamintha.
Petroselin.
Vivrona.
Nasturtij.
Cochlearia.

Prasij.
Gonista.

Sem:

Feniculi.

Alkto

Alkerms.
Elect:

de Gemmis.
Leticians Galeni.

Troch:
de Cappariibus.
- Eupatorio.

Externa.

Ol:
de Cappariibus.
Tamariſci.
Juni. Jun.
Rutaecem.

Ung:
de Arthemisia.
- Althaa.

Empl:
de mucilagimibus.
- Melilote.
Diachylum cum Gumis.

XXII.
Splenica Frigida.
eade ſerua Bilien atten:

Simulera.

Rad:
Acetosa.
Asparagi.
Byglossi.
Braginis.
Cichory.
Graminis.

Liquiritia.
Oxylapatſi.

Fol:
Acetosa.
Braginis.
Byglossi.
Cichory.
Capilliz: Veneris.
Dentis Leonis.
Endivia.
Fumaria.
Siummitat: Capuli.
Scariola.

Sem:
in frigida majora.
Acetosa.
Endivia.
Hordei.

Fz:
Poma uolentia.
Pruina acida.

Fl:
Braginis.
Byglossi.
Cichory.
Nymphaa.
Violarium.

Suc:
Limonum.
Omphacium.

COMPOSITA.

Aq:
Acetosa.

Brag:

Portulaca.
Sarcis.

Boraginis.
 Byglosi.
 Cicborij.
 Endivia.
 Graminis.
 Hordei.
 Nymphææ.

Syr:

Acetosa.
 Capill: Veneris.
 Cicborij simpl:
 de Limombus.
 — Pomus redolent:
 — Succo Acetosa.
 violaceus.

Cons:

Fol: Acetosa.
 Rad: & Fl: Byglosi.
 Fl: Boraginis.
 Capill: Veneris.
 Cicborij.
 Lactuca condita.
 Nymphææ.
 Violarum.

Elect:

Diamargarit: frig:
 Diabuta Surtali.
 Diarhodod Abbatis.

XXIII.

Nephritica medica
 menta.

Ad Renum affectus
 multa scilicet uscipiunt

medicamenta, quia sc.
 vel Urinas movent, vel
 Renum ardorem continen-
 pezzant, vel lapidem imo-
 minuant, vel artenulas
 detegunt; T sunt ita
 ordine recensenda.
 Urinas moventia (calida)
 Urinam
 proprijs capitibus separ-
 faciunt profusa.

Urinae & Renum ar-
 dorem temperantia &
 lenientia. sc.

Nephritica frigida.

SIMPPLICIA.

Rad:

Althææ.
 Liquiritiæ.

Fol:

Cacurbita.
 Endivia. Parietaria.
 Lactuca.
 Malva.
 Scariole.
 Portulaca.

Sem:

W Frigida majora.
 Althææ. Cydonior.
 Malva.
 Lactuca. Portulaca.
 Hordei.
 Papaveris albi.
 Psyllij.

Fr:

Amyg.

De Remediis Calorem.

200


Sicc: Postillaco cum Siccis liquat: ubi humidat.

Emulso Succi \bar{w} fz: major:

Sicc: ex Papavi albo cum Siccis et Syr: Violav:

Remis non multum onerandi assellat.

Clysters ex solo doto Veronica cum Saccharo et
bitryo.



354

Amygdala dulcis.
Jujuba. Fraga.
Passula.
Pruna dulcis.

Fl:

Nymphaea.
Violarum.

~~Nempharis.~~

Gum:

Tragacanthum.

Anim:

Butyrum.
Lac.

COMPOSITA.

Aq:

Lactuca.
Portulaca.
Nymphaea.

Syz:

Jujubarum.
de Liquiritia.
Violarum.

Cons:

Violarum.
Nymphaea.
Lactuca condita.

Elect:

Diatragacanth: fig:

Externa.

Ol:

Violarum.

Rosarum.
Nempharis.

Ung:

Rosaceum.
Refrigerans Galeni.

XXXIV.

Nephthica calida.

SIMPLICIA:

Rad:

Apj.
Eringj.
Feniculi.
Petroselini.

Fol:

Nasturtij.
Parietaria.

Sem:

Apj.
Ciceris rubri.
Seselsos.
ErUCA.
Petroselini.
Vetica.

Fz:

Bacca Juniperi.
-- Lauri.
Passula. Amygdala.
Nuclei Pinii.

Fl:

Genista.

Rad: Capparis

Fol:

Capit: ♀. Actinisa.
Vatica.
Ruta.
Botanica.
Ligustici.

Sem:

Feniculi.
Dauci.
mily-sebis.

Fl:

Chamamelli.

Schol

Actinim.
Succus Melensis.
Limonim.
Ribim.

Schoenantbos.

Gum.

Terebintina.

Murz:

Carabe.

COMPOSITA.

Aq:

Apj.

Fanickli.

Sye:

Byzantinis.

de v Radicibus.

Cons:

Fl: Genista.

XXV.

Lithonriptica.

SIMPPLICIA.

Rad:

Ononydis.

Lappae majoris.

Saxifraga.

virga serena.

Liq:

Nepheiticum.

Cort:

Fabarium siccardis.

Radie: Canki.

Fol:

Argentina.

Cinnamonum

Rad: v aperientis.
Rap. bami.

Calcitrapa.

Saxifraga.

Oxithim marini.

Fragaria.

Sem:

Milij Solis.

Raphani.

Vertica.

Fa: ^{Prunus:}

Nuclei ^{malus: Amegia: cons} cerasorum.

— — Persicorum.

officula ^{officula} Mespilorum.

Bacca Juniperi.

Gum:

Terebintina.

Anim:

Canceri fluvialis.

Mille pedis.

Scorpionum ciris.

Sanguis Hirci Pporae.

Ocelli Cancerorum.

Lap:

Indaicis.

Lincis.

Nepheiticis. #

Crystallinus.

COMPOSITA.

Aq:

Saxifraga.

Calcitrapa.

de Sapb.

Heiera terrestris.

Bonica.

Parietaria.

Sem:

Malva silvestris.

Althaa.

Ciceris.

Petroseli macedoni.

Amygdales amara.

Cabeba.

Kux Moschata.

Lap: Cancerorum.

de capis admirabilis factis
antibus. v. Post: de gom. et
Lapid: v. 10.

Lignum Nepheiticum.

Syz.

de Raphano Fernel.

Oxymul simplex.

— — Sybilliticis

Nephricat haurt: Joubert.

Syz:

de Raphano Fernel:

Nephrocathart: Joubert.

Elect:

Litbotripticon.

Detergentia eadem sunt,
q̄ diuretica et calculis
expellentia.

Efficacissima sunt haec

Terebinthina.

Pariotaria.

Raphanus.

Apium.

Cicera rubra.

Hysterica Medicam:

q̄ utrum respiciunt
eum corroborando vel
conceptionem promovet,
vel partus et foetum diu
naturam exclusionem
servant, vel menstruas
purgationes educunt,
vel nimium caridens
fluxum inhibent, vel
demum utrum ab ex
crementorum colluente
repurgant: q̄ ora sigillatim
latim proponunt.

XXV.

Conceptum juvenia.

Simplicia.

Rad:

Bistorta.

Cypri.

Galanga.

Spica Nardi.

Calami Aromatici.

Fol:

Botonica.

Majonana.

Salvia.

Rozis marini.

Fz:

Cariophylli.

Macis.

Nux muscata.

Fl:

Anthos.

Salvia.

Botonica.

Gum:

Mastix.

This.

Styrax.

Benjaminum.

Anim:

Moschus.

Zibeta.

Miner:

Ambazum.

Corallus.

Succinum.

COMPOSITA.

Aq.

Uterum Caffae.

Atemisia.
Matricaria.
Dectamum.
Phlegium.
Calamentba.
Elymus.
Melissa.
Sathocia.
P

Abomameli.

Syz: de Althaea Fern:

Aq:

Helonica.
Salvia.
Majorana.

Cons:

Anthos.
Myzobalani cond:
Nix Moschata cond:
Radix Satyrionis cond:
Fl: Salvia.

Conf:

Mithridatium.
Theziaca.

Elect:

Aromatic: Rosathus
Diambre.
Diamoschum.
ad Gemmis.
Diagalanga.

Troch:

Gallia moschata.
Alipta moschata.

Externa.Ol:

Nardinum.
Myrtinum.

CCXVII.

Partum & } eductia
Secundinas }

Qua mensis movent,
illa satum & secundinas
eductant, fecunditas

autem hac.

Dictamnus Creticus.
Artemisia.
Fl: Aristolobia utriusq.
Crocus.
Aqua Cinnamomi.
Confectio Alkermes.
Borax officinar. ad ʒj.
Sabina.
Opoponax.
Sagapenum.
Myrrha.
Castoreum.
Asa fetida.

Posteriora haec duo tantum
secundinis conveniunt,
quia gravi odore satum
educant.

CCXVIII.

Penses moventia.

Similia.Rad:

Aristolobia utriusq.
Cyprici.
Gentiana.
Valeriana.
Jus Florentinae.

Cort:

Cinnamomi.

Fol:

Abrotani.
Artemisia.
Calamentza.
Dictamnus Cretici.

Mzad Faciem movent:

Galbanum.
Ammoniacum.
Colocyntidis.
Ruta.
Ciculus silvestris.
Fel vaccinum.
Sulphur.
Vngula Asini suffitilis

Feniculi.
Petroselinus.
Ribia tructes

Alumbium.
Helonica.
Spica.
Asarum.
Chamaedrys.
Chamaepitys.

Mafozana.
 Mezchialis.
 Mateicaria.
 Nepetha.
 Origani.
 Pylegij.
 Prastij.
 Ritha.
 Salvia.

Sem:

Anisi. Petroselinij.
 Carii.
 Dauci.
 Faniculi.
 Ritha.
 Seselios.

Fl:

Crocus. Osmant.

Gum:

Assa fetida.
 Sagapenum.
 Myrrha.
 Opoponax.
 Galbanum.

Anim:

Castoreum.

Mintz:

Borax officinalis.

COMPOSITA.Aqde.

Artemisia.
 Cinnamomi.

Syr:

de Hysopo

de Artemisia.

Cons: & Elect:

petenda ex Diysaticis.

Troch:

de Myrrha.

Externa.Ol: & Ung:

petenda ab Emollien-
 tibus, q̄ in secunda parte
 tradentur.

XXIX.

Menses sistencia.

SIMPLICIA.Rad:

Bistorta.
 Tormentilla.
 Symphyti.

Fol:

Centinodij.
 Lentisci.
 Myrti.
 Mentha.
 Portulaca.
 Plantaginis.
 Summitat: Rubi.

Sem:

Acetosa.
 Plantaginis.

Fz:

Myrtilli.

Fl:

anara & leptomyrta sicut
 illa adstricti om̄e ee debent.
 ar. Centaure; mimit.
 Phlegium.

Bacca Juniperi.
 Latici.

Fl:

Balanisteriorum.
Rosarum rubrarum.

Gum:

Mastiche.
Sanguis Draconis.

Animi:

Cornei Cervi istius.
Ebur.
Spodium.
Coagulum Hædi.
— et Leporis.

Minez:

Corallus.
Bolis Armena.
Terra sigillata.

COMPOSITA.Aq:

Mentha.
Nymphaea.
Plantaginis.
Portulaca.
Rosarum.

Syz:

Myrtinus.
de mentha.
Cydoniorum.
Rosarum siccar:

Cons:

Rosarum.
Cydonia condita.

Conf:Conf:

Philonium Rom:
Diacodium.

Troch:

De Spodio.
— Terra sigillata.

Externa.Ol:

Myrtinum.
Cydoniorum.
Rosaceum.

Ung:

Comitisia.

Empl:

De Mastiche.
Contra voluptuam.

Uterum Expurgant.
eadem q̄ mensis mor-
ventio. et præcipue

Berionia.
Aristolochia utraq̄.
Gentiana.
Mercurialis.
Artemisia.
Matericaria.
Marrubium.
Chamaedris.
etc.

XXX.
Lac generantia.

Simplicia.

Fol:

Faniculi viridis.

Sem:

Faniculi viridis.

Anethi viridis.

Apj.

Brassica ~~detum~~

Lap:

Crystallinus pulvis.

Anim:

Butyrum cum
Lacte & Faniculo assu-
mptum.

XXXX.

Lac minuentia.

Simplicia.

Fol:

Calamentha.

Chelidony majoris.

Mentha.

Ocymi.

Sem:

Coriandri.

Gum:

Camphora.

Suc:

Acetum.
Omphacium.

Composit:

Syz:

Oxymel simplex.

XXXXII.

Semen generantia.

Simplicia.

Sem:

Eruca. Fraxini.

Napa. Lini.

Piptz.

Synapi.

Vetiva.

Fz:

Nuclei Pini.

Pistachia.

Avellana.

Nux Indica.

Anim

Stychnis.

Cerebell. Passeris.

Testiculi Galloz.

Composit:

Elect:

Diasatyron sepius
excitat venerem.

Bulbi.
Cicer.
Satyrion.
Eruca.
Allium.

Lad
Syringy.
Napo.

Sem Asparagus.
Zingiber viride.
Galanga.
Lapa sativa.

Apium.
Smyrnicum.
Polianth.
Polygala.

Hordei ptisana.

Portulaca.
Lacta.
Salvia.
Agnus castus.
Sempervivum.
Cucurbitz.
Hyoscyamus.

XXXIII.
Semen Extinguentia

Semen. a. extingunt
aut valde refrigerantia
aut valde discutientia
qualia sunt

- Lactuca.
- Portulaca.
- Campozoa.
- Mentha.

Semen Agni Casti.

- Cannabis — Anethi.
- Lactuca. — Rutba.

XXXIV.
Flatūs discutientia.

Simplicia.

Rad:

- Acori.
- Galanga.
- Erula Campana.
- Spica Nardi.
- Zedoaria.

Cort:

Cinnamomi.

Fol:

- Calamenthi.
- Lauri.
- Majorana.
- Peigani.
- Rutba.
- Pylegy.

Arcanthoz:
Nacis.

Flor:
Chamomill:
meliloti.

Thymi.

Sem:

- Anisi. # Lini.
- Cazdi. Agni casti.
- Amios. Lapium.
- Cumin.
- Danci. Petroselini.
- Faniculi.
- Piperis.

Fr:

Bacca Lauri.

Gaiophylli.

Anim:

Castoreum. &

reliqua ferè tam sim-
plicia quam composita
qua pituitam attenuant.

Diaphanicon in
Cystisibus discutit
flatūs.

XXXV.
Adestringentia.

Simplicia.

Rad:

- Bistoria.
- Tosmentilla.
- Symphyti.
- Pentaphylli.

Cort:

Myrobalarum.

Fol:

Byss

Sem: Anisi Fr. casti
conuincit: egrogis
infantibus a vituli
bile & piperita liberat.
Heron: T. pax. in flud.

- Galbanum.
- Pix sicca.
- Styrax.
- Sulphur.
- Sagapenum.

Abalub: testum.

Cort:
Granator:
Balis.

INCASSANTIA. ~~est~~ ASTRINGENTIA. 320.

Tortilaca, Bolus, Papaver, Actaea.
Oxya. Lentis, Mala Cydonia, Pyra agrestis.
Amylum. Sac Chalybeatum, Succus Gennatoz.

386

Equiseti.
Bellidii minoris.
Sanguinaria.
Raphani Barbati.

Sem:
Acetosa.
Rosarum.

Fr:
Noces Cypressi.
Myrtilli.
Mora immatura.
Corna. Acini uvae pass.
Galla. Cistitae Glauca.

Miner:
Alumina. Ferrum.
Lapis Hamatilis.
Siccus Hypocistidis.
Umbacolum. seu Agelita.
Acacia.

Byssa Pastoris.
Centinodia.
Plantaginis.
Summitat. Rubi.

Sem:
Portulaca.
Plantaginis.
Myrtilli.

Fl:
Rosarum rubrae.
Balanstia.

Fr:
Cydonia.
Mespila.
Sorba.
Pyra agestina.

Gum:
Mastiche.
Sanguis Draconis.

Ter:
Bolus Armena.
Terra Sigill.

Miner:
Corallus. Margar.
Spodium.
COMPOSITA.

Aq:
Rosarum.
Plantaginis.
Portulaca.
Centinodia.

Mentha.
Nymphaea.

Syr:
Cydoniorum.
Rosarum siccae.
de mentha.
— Myrtbo.

Cons:
Rosarum.
Cydoniorum.

Troch:
de Spodio.
— Terra Sigill.
— Polo.

xxxvi.
Lumbricos Encantia

Simplicia.

Rad:
Graminis.

Fol:
Abrotani. Acetosa.
Absinthij Romani.
Centaurij minoris.
Fumaria.

Hypocici. Persici.
Mentha. Rubea.
Portulaca.
Scordij.

Sem:
Atis

Syr:
Granatorum.
Myrtillorum.

Troch: de Carabo.
summu^o laudat d. 38. a.

Rad intus sicca, sine
frais hinc hinc applicata.

Rad:
Gentiana.
Filiis.
Helenij.

Corallina.
Nasturtium.

Dentis Leonis.

Haimagoga nulla est probat. ^{46a} pern 291 / 3.205
neq; illoz: $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ee $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ mti letalis. 290.

Nela // modum dignoscendi dosin medic. compositi.
67 Seni inst: 1134.

406

usq ad Hepatis Curam

Humores existentes in Regione

Per: 203.

usq ad b. v. d. d.
R. 20. d.

2^a mitioribus }
11^a mediocribus } purgantibus
11^a validioribus }

Macrosedij difficulter admodum terunt, fortiora tñ stimulantia Cur
+ baritica, cum ex se facili in Alvi profluvio incident. Obstant

Nota // quod Valerium in Africa de
la Colidra a Cere
Ductos, quorum No in
alium subsiderent
si forte nigro corpore albissim.

1^a Est usq ad Hepatis curam, 2^a Escopoticis, seu minoratis.
sive usq ad vena inclusivo }

PURGANTIA MEDICAMENTA.

Ut facile innotescat, non solum quæ
humorum vacient singula Cathar
tica, sed etiam quæ dosi exhiberi
debeant: hic cuiusq; propriam dosin
proponimus, quæ ita accipienda est,
ut sola et seorsim usurpans. Alioq;
si multa simul premisceant, cuiusq;
quantitas erit proportione minuenda.

Notandum hæc omnium Cathar
ticorum dosin præscribi, quatenus
in Substantia premisceant aut
usurpans. Nam Infusa vel Decita
maiori Dosi præscribunt, hæc tere
proportione: ut Vehementiora duplâ
quantitate exhibent in Infusione
quam in Substantia; in Decocto v.
triplâ: Mitiora v. & mediocria
triplâ tere in Infusione, & quadruplâ
in Decocto. Sed a regula
excipiunt Rhabarbarum & My
robalani, quæ magis purgant in
Infusione quam in Substantia, pro
pterea aditericoriam vim, quæ in Infu
sione deperdit.

CHOLAGOGA.

Mitiora.

Cassia.	— —	ab ℥j. ad ℥jß.	— etiam ad ℥ij. Henan: II. præx. 22.
Manna.	— —	ab ℥j. ad ℥ij.	
Succus Rosarum.	— —	ab ℥jß. ad ℥ij.	

Tama

Sacchar. Viol.
Syr. Rosar. solut.
— Violat.

Serebinthina, ℥ij, ad ℥ij.

prodest pedes, renibus, et Vesicae hauritis,
v. et Sen: inst: 679.

Urinae acrimoniam curat. Silv: 1113.

copi: de stranguria, v. et Af. p: 240.

Tibis viscer: et Venar: obstructionsibz

Solventis aptissima. R. 25, c.

modo pellucida sit, et non adullerata

Lemm:

Causes de Constu: Cat: p: 139.

Urges de Catarrho. p: 175.

In videri videtur et conseruatur
offic: Medicor: Europ: p: 200.

Tamarindi. — ab ℥ij ad ℥ij.

Mediocria.

Aloë. — a ℥j. ad ℥ij.

corrigits mastiche & Tragacatho.

Rhabarbarum — a ℥ij ad ℥ij.

tam in substantia q Infusione.

corrigits Spica Nardi, et Cinamom

Myrobalani Citrini, a ℥ij ad ℥ij.

magis adstringunt, q purgant.

Vis adstrictoria eorum minuit

Infusione & lactione eorum

Ol'io Amygdalar: dulci

Vehementiora.

Scammoniã — a gr: viij ad gr: xv.

corrigits Succo Cydoniorum, &

Coractis Diagonidien appellat.

COMPOSITA.

Syrupi.

Rosat'is Solutioj. — ab ℥ij ad ℥ij.

de Cichoto. comp: cum Rhco

— ab. ℥ij ad ℥ij.

Opiate.

Catholicoim. — ab ℥j. ad ℥ij.

Diaprunum Simplex

Diacassia. — ab ℥j. ad ℥ij.

Electuar:

de Succo Rosarum. ab ℥ij. ad ℥ij.

Opia

Spica Nardi. Sen
maior ingratu.

In substantia ultra ℥ij non
ascendunt, in infusione
ultra ℥ij. nec dicit
minquam procedendum
si fortiter exprimat, seu
lapis tantum fiat expellit
ad x usq procedens licet
in vino cum spica et Cinn
Myrobali: in substantia ℥ij ad ℥ij
in infus: a ℥ij ad ℥ij.
in sero lactis cum passulit
at R. 13. in substantia
dant, in infusione ad ℥ij
in lactione ad ℥ij. x
biben posse aserit.

Pl. 295 de Compositis nullum est
ingt, q. puzam Bitem educeat possit.

Tamariaci: Kirgime in Juro habet, et
etiam habet in Jene: Cerevisia: quod
habet, & in febris: et Synochis
causis: hoc Ag: vol: dicitur. [C. 92.]

42a

Indicium

Abalbarazi — Sabanaut: — al: Spica Nard
Scamoriij — Succu Cydon. Cinnam:
Agaici — Zinziber.
Senae — S. Anisi.

Opiata fortioris.

Diapnoimim solutio: } ab ℥β. ad ℥j.
Theophrasa Persica. }

Pitt:

Aurca. --- } a ℥j. ad ℥iiij.
Sine quibus. --- }
de Rhubarbaro. --- }

sed raro sillis Pillulis vacuatis.

PHLEGMAGOGA.

SIMPLICIA.

Mitiora.

Chartamis. --- ab ℥β. ad ℥j.
corrigits Aniso vel Cinnamonio.

Mediocria.

Agaricus --- a ℥j. ad ℥iiij.
corrigits Zinzibere & Sale Gema.

Agaricus in {
subst: ℥iiij. ad ℥v.
infus: ℥iiij. ad ℥β.
coct: ℥β.

Vehementiora.

Turbitis. --- } a ℥iiij. ad ℥v.
Hermodactylus. --- }
corrigits Zinzibere.

Turbitis in {
substant: ℥β. ad ℥iβ
infus: ℥iiij. ad ℥v. iiij
coctione: ℥i
Sim. inst. 1130

Colocynthidis non exhibetur nisi correa
ta & preparata in Turbitis,
q̄s Albandel appellants.

--- a. gr. viij. ad gr. xv. vel ad stannus ℥i. k. 13. 71

COMPOSITA.

Opiata & Elictiaria.

Catbol -

Agaricus n̄ trochiscatus,
aqua dicit, trochiscatus
p̄liqua visidit. k. 13. 6. a

Catholicum.
 Diaphanicum.
 Hiera picra.
 Elect. Diacarthomi.
 - ad Citro solutivis

} a ℥vj ad ℥ij.

Pitt.

De Agarico.
 Sino quibus.
 Stomastica. } ad ℥ij.

Coccia majoris.
 - - minoris.
 Fetida majoris.
 Læcis majoris.
 Asthetica.
 ad Hermodactylis. } a ℥ij. ad ℥ij.

Trochisci.

Agaricus Trochiscatis. a ℥ij. ad ℥ij.

MELANAGOGA.

Senna. - - - a ℥ij. ad ℥ij. - aut etiam ℥ij. Dosis
 Polypodium. - - - a ℥ij. ad ℥ij. quatuor ad ℥ij. h.u.
 Epithymon. - - - cocta a ℥ij.
 Helleborus Niger. a gr. xv. ad ℥ij.
 præstat infundere
 vel decoquere. } a ℥ij. ad ℥ij.

Nota. Præstantissimum est Remedium
 pro Melancholicis.

℥. vini albi ℥. i. Helleb. nigr. recent. ℥. iij.
 infundens q. triduum. bitando decolentis
 cum Sauch. q. s. si. Symplicis.

Dosis

℥. ℥ij.

44a

Faint, illegible text on a light-colored strip, possibly a label or page fragment, with some markings and a small number '44a' visible.

476

Amstelredami in No. 10. 1700. ~~Frans~~ in No. 10. 1700. tot
reusit. ~~Frans~~ reperit quendam Radix, dicta
Rad: Gelab, cuius si exhibita in pilulis,
cum vel sine vino Pituitum & Aquas purgat.
Cadaui familiau
non hanc radicem
habent, sed vna
vis. ~~Frans~~ a. fe.
Optimo. a. vnae supplet ipsi defectu Mechacae huiusmodi carit. exopt.

Dosis est ℥i. vel ℥i℞.

COMPOSITA.

Operata. & Confectionis.

Catholicum. — } a ℥vi. ad ℥x.
 Diastenna. — }
 Confectio Hamich. a ℥iiij. ad ℥vi.

HYDRAGOGA.

SIMPlicIA.

Mitiora.

Ebuli Semen. — ad ℥j.
 --- Cortex mediana. — ad ℥iiij.
 Succus ejusdem — ab. ℥j. ad ℥x.
 Sambucus idem praestat, sed in
 feminis.

Mediocria.

Meboacam — a ℥j. ad ℥iiij.
 non coquits, sed infundits in vino
 albo: & liquor simul cum pulvere
 exhibets.

Jalapa — idem ac Meboacam.

Rebementia.

Soldonella pulv. — a ℥j. ad ℥iiij.
 Radix Jidis pulv. — a ℥j. ad ℥iiij.
 Succus Jidis. — ab. ℥j. ad ℥j.
 Elaterium — a. gr. viij. ad ℥viij.
 Esilla — a gr. viij. ad ℥viij.

Simil

EXTERNA.

Ung: de Acthanilla majoris Hypogastrio
 u imunctum. ℞. 340.

Ol: Aloinum cum ebulo, subtili
 u rosata guttula u castoreo.

Ung: e Satyridis Formely. ℞. 32.

[Aqua, quidem si Hypogastriam
 Laetia vero si Stomachus Zinnigals.

Omnia Fella illien: ventrem solvunt
℞. de morb: inf: p. 16.

Epomballon. ℞. 31.

Agaricus simpl: Hydragogum
 trochiscum Phlegmogogum
 est. ℞. 46. a.

Aq: ebuli, ℞. 34.

Timelca ʒa gr: v. ad ʒʒ.
 Chamæwa ʒa gr: v. ad ʒʒ.

COMPOSITA.

Diatribitis — — est pulvis pū-
 gans. datiz ad ʒj.
 Diacarbannim — a ʒvi. ad ʒj.

Pitt.

de Sagapeno — — — ad ʒij.

VOMITORIA. —

vide Sennaeft: in st:
 p: 006.

Purroca.

Aqua tepida.
 Aqua Hordei tepida.
 Juscula pinguis tepida.
 Butyrum.

Aqua cum panillo Mellis
 & Salis.
 Pitrona cum Mellis.

Ficus recentes conuſtae. & Aqua tepida
 supra superbibita.

Pulv: Lad: Betonica ſiccata: ʒj. ad ʒij.
 cum Hydromeli exhibitā hinc eſſicit
 viſcidos ac pituitoſos caſtaſq; hinc
 res. Dod: herbi. fo. 51.

* Oleum Simplex, cum aqua.
 † Oxymul Simplex, cum aqua tepida.
 Semen Atroplicis.
 Flores Acetosa.
 — — Genista.
 Succus Acetosus.

x ab Oleo abſtinentiam
 ait Forde: II. Dis. 10. 13.
 q' multitudine vidisse ait,
 7 postea relaxata hinc
 tunc nihil actinebat.

† Form: V. M. 15. 53. et
 Oxymul vomitum citra
 nigat, et p. Actum ad
 ſtingat, multaq; ma-
 gis impoſat †: A.

qua oca magno haustu exhibitanda.

Mediocria.

Radix Asari — — a ʒj. ad ʒij.
 et in decocto — — ad ʒij.
 Radix Peponis.

Asarum, 7 castoreo pōbat
 Forml: V. M. 43. et
 VII. M. Electuar: Diaphn.

EXTRAHSEA.

Ung: De Asbanita major. Formaco 1111
 Ulim 1. 340.
 Ung: de Satbyride. id. 32.

Rapb.

Raphani succus. - - ad ℥ij.
Sem: Raphani. - a ℥ij. ad ℥β.
in decoctione.

Agaricus. - - - }
Sem: Vatica. - - } ad ℥i.
Inglanidis cortex med. }
Florus seu Glandes ejusd.

Veherentia.

Vitriolum album, solutum, filtra-
tum, & coagulatum.
- - - a. ℥β. ad ℥ij.

Antimonium preparatum.
ejus dosis varia secundum
varios preparandi modos.

Cronitoriorum omnium vis colitur
manet. Fern: V. m. 13.

Quomodo Ervhina a Stru-
untate differt, etc.
tam aliquot Ervhina et
lectura et videretur
habet, Fern: p. 344.
Sunt inq. Ervhina minus
tam vicia, a Stru-
ticia, et aqua majori
ni vicia quod posteriori
vicia, partibus vel hanc
ces vicia, valido in-
cassa a vicia.

ERRHINA.

Radices.

Jacos. Gentiana. Chelidon.
Cyclaminis.

Folia.

Betula. Ralba.
Anagallidis. Asarica.
Majonica. Nigella.
Salvia. Phlegij
Bettonica.
Hedera.

Succi.

Rad: & Folior: predictorum.
Elatezinum.

Nicotiana decocta & expressa egregia

Stez: _____

STERNUTATORIA.

Alchem. max. p. 127.

Radices.

Zinziberis.
Pyrethri.
Jatos Florentina.
Hellebori albi.

Folia.

Betonica.
Majorana.
Salvia.
 alij p̄miscenda tanq̄ Corcectina.

Siper albam.
Castophylli.
Pharmica.

Gummi

Euphorbium.

Animalia.

Castoreum.

in illa etiam ex Erbina
 modo substatu contenta
 ut p̄ colatorum ad caelū
 hūm penetrat.

COROLLARIUM.

Quemadmodum Erbina & Sternu-
 tatoria sunt Cerebri vacuantia:
 Ita & Beccica pectus peculiariter
 expurgant, quae tamen hic non re-
 censentur, quia omnis eorum Materia
 desumitur ex Thoracis infra de-
 scribendis.

Peen. p. 348.

OPHTHALMICA.

Ad varios oculorum affectus varia
 usurpantur remedia, quae aut vi-
 sum acutunt, aut dolorem sedant,
 aut fluxionem inhibent, aut super-
 fluum humiditatem exsiccant, aut
 materiam impactam digerunt & detergant.

Oxydo

HUMES

Calcfacientia.	Refrigerantia.
Scor. Cyballia isipour.	Rosa. Malva.
Ruta. Lactis.	Vicia. Althaea.
Costus. Nigella.	Lactuca. Nympha.
Castoreum. Cope.	Salsis folia.
Amygdala dulcis amara	
Elleborus albus in melle	Luc. miltaria topiis.
Mojibus cum laua latic:	

Apoplegmatizanta.

- Mastix.
- Vera passia.
- Castoreum.
- Pyretzum.
- Cabeba.
- Cort: Rad: Cappaz:
- Zingiber.
- Nigella.
- Difer album.
- ingrum.
- Simapi.
- Thalict.
- Staphis. agria.
- Hysopis.
- Oreganum.
- Majorana.
- Symis.

486

Appt balmica

*Chelidonium.
Feniculum.
Euphorasia.
Rota.
Verbena.
Majosana.
Bironica.
Helleborus.*

Aq: Mustolara.

OXYDERCICA.sive visum acientia.Radices.Feniculi.
Chelidonia.
Raphani.Folia.Chelidonia.
Verbena.
Ruta.
Euphrasia.
Feniculi.Semina.Feniculi.
Raphani.
Semini majoris.ANODYNA.

Lac muliebr.

Albumen ovi agitatū & in
aquam ~~imbucellam~~ convessum.

Aqua Rosarum.

~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~ ~~Emulsiō~~

Mucilago Scti: Pylly.

— Cydonior: cum Aq: Ros: Extr:

Medulla panis maceata &
in lacte cocta, addito panico
Croco.

Poma dulcia cocta sub cineribz.

Pomorum pateridorum pulpa.

Trochisci albi Rbasid cum Opio.

Repel.

REPELLENTIA.

Aquæ.

- Aquæ Rosarum.
- Plantaginis.
- Portulacæ.

Succi.

- Succus Cydoniorum.
- Pomorum acidorum.
- Albumen Ovi.

EXSICCANTIA.

- Cerussa lota.
- Tinctia lota.
- Antimonium lotum.
- Unguentum de Tinctia.
- Trochisci albi Rhasis sine Opio.

DIGERENTIA.

- Sarcocolla nitrita in Lacte.
- Crocus.
- Lac mullebræ.
- Destilum Farnigæci.
- Sanguis Colomb: juniorum.
- de pennis majoribus in oculum expressus.

DETERGENTIA sine mesura.

- Saccharum cand:
- Syrupus Rosarum siccarum.
- Tartia.
- Pompholyx.
- Plumbum ustum & lotum.
- Antimonium lotum.

betes

Aegleia seu
neogeleia calia.

majorana.

Herba paralytica.

Betonica.

Stachas.

Chamaepitys.

Rosmarinus.

Salvia.

Fol: Laili.

Lavendula.

Artemisia.

et plura Cephalica.

Castoreum.

Umbolici turreslati.

Xylocopa.
Terebinthina calida &
abscessiva tubicola
microgaster a. praeparatula
cognat. Linn. p. 1006
Sub. N. 39.

DE TERGENTIA cūm morfu.

- Fella Piscium, leniora.
 -- Quadruped: media.
 -- Avium, fortissima. et
 -- Perdices omnium validissimis
 -- Gallinae v. mitissimum.
 Succus Chelidonia.
 -- Faniculi.
 Aqua Mellis composita.

ARTHRITICA.

Humores in articulis ipsorum
 medicamentis, ac in Cerebro, praeparantur: Quandoquidem eadem
 nervorum et Cerebri est ratio.
 Quaedam tamen peculiariter ad
 Articulorum doloris commendantur.
 Topica praesertim, quae ita distin-
 guuntur, ut alia statim initio dor-
 lorem compescant, et fluxionem
 arceant: nec tamen humores in
 partem inflammataam altius im-
 pingant; alia dolorum citra in-
 flammationem compescant: Alia
 humorum impactum dolorum
 dato digerant.

FLUXIONEM INHIBENTIA.

Folia.

- Hyoisycami.
 Cuscuta.
 Mandragora.
 Solani.

Sem

Semper vivi.

Succi.

Hyo/cyami.

Solani.

Opy.

Lactuca.

Liquores.

Acetum.

Seminis Psylli.

Cydoneorum.

Gummi.

Capbura.

Aqua.

Plantaginis.

Rosarum.

Solani.

Olium.

Rosarum.

DOLOREM SEDANTIA.

Rad: Althea.

Lac
Stercus } Vaccinum.

Oesypus.

Vitelli Ovorum.

Flores Camomillae.

— meliloti.

Crocus.

Olorum Liliozum.

DIGERENTIA.

Rad

Ol: de Palma, egregium et
tenuis succedaneum est Ping: Human,

cum et istis viribus possent, nec
tam facile corrumpitur.

Ping: Humana admodum nutritiva
est, sed tunc ff de ar, et ex sano
homo,

22a

Christoforo Bontio.

Notandum si sit cum Herbis
et virtutibus ponderata.
de quo videtur: Si Cabaginis

526

Radices.

Enula Campanæ.

Folia.

Verbasci.

Chamaepytis.

Urtica.

Ebuli.

Salvia.

Centaurij minoris.

Semina.

Urtica.

Nasturtij.

Gummi.

Opoponax.

Bdellium.

Ammoniacum.

Sagapenum.

Galbanum.

Euphorbium.

Animalia.

Castoreum.

Vituli vivi impositi.

Liquores.

Vinum.

Aqua vita.

Vitriolum.

Cera.

- ad Lateribus.

Oleum de Lateribus.

Emplastera.

de mucilagine.

- meliloto.

Oxyeratium.

Ext.

1.^o PARTIS. SECTIO secunda.

de Materia Medica Externa.

MATERIA MEDICA EXTERNA
 simplex et composita constat
 XVII Facultatibus.

1.	Refrigerantia.	Detergentia. --	10.
2.	Repellentia.	Sanguinē sistentia	11.
3.	Emplastica.	Glutinantia. --	12.
4.	Anodyna. --	Sarcotica. --	13.
5.	Narcotica.	Epulotica. --	14.
6.	Emollientia.	Cathartica. --	15.
7.	Resolventia.	Vesicantia. --	16.
8.	Astringentia.	[Caustica. -- 17. [quo et hinc] [Pulverific: Absorbent:]	
9.	Suppurantia.		

1.
Refrigerantia.SIMPPLICIA.Coct:

Rad: Solani.

-- Mandragora.

Fol:

Lactuca.

Hyoscyami.

Lenticula aquatica.

Umbilici Venereis.

Illa refrigerant simplicitate

Hae refrigerantis adstringunt

Portulaca.

Plantaginis.

Polygoni.

Ligustri.

Sem:Frigida { majora.
 { minora.

Hyoscyami.

Papaveris albi.

Psyllij.

Fl:

Nymphae.

Rosarum.

Violarum.

Succ:


Aceti liquoris.

Granatorum.

Citri.

Lat





Lactuca.
 Lymonium.
 Ompbacij liquoris
 Opj.
 Plantaginis.
 Portulacae.
 Sempervivi.
 Solani.

Animal:

Albumen Ovi.

COMPOSITA.

Aq:

Nymphaea.
 Solani.
 Polygoni.
 Plantaginis.
 Rosarum.

Ol:

Violarum.
 Hyoscyami.
 Mandragora.
 Nymphaea.
 Papaveris.
 Rosacearum.

Ung:

Ceraurum Santalinum.
 Populeum.
 Refrigerans Gallici.
 Rosaceum.

W.
 Repellentia & Adsteg

DRUGS.

Rad:

Bistorta.
 Rapontici.
 Symplyti.
 Tormentilla.

Cort:

Granatorum.
 Jugland: virid:
 Mediani Sumach.

Fol:

Centinodia.
 Absinthij.
 Bursae Pastoris.
 Cypresij.
 Ebulli.
 Equiseti.
 Mentha.
 Myrti.
 Olivastri.
 Plantaginis.
 Polygoni.
 Quercij.
 Verbasci.
 Vitis. &
 Capivi ejusdem.

Sem:

Gean

Grana Tinctorum.
 Byssa pastoris.
 Plantaginis.
 Portulacæ.
 Acini Uuarum.

Fl:

Balanistia.
 Rosarum rubræ:

Fr:

Cydonia.
 Gallæ immatura.
 Mespila.
 Myrtilli.
 Sorba.
 Nux Cypresii.

Suc:

Acacia.
 Hypocystis.
 Plantaginis.

Gum:

Arabicum.
 Sandaraca.
 mastice.
 Sarcocolla.
 Sanguis Dracon:
 Tbus.

Miner:

Bolis Armena.
 Alumn.
 Corallis.
 Terra Sigill.

COMPOSITA.

Aq:

Corticis Nucis.
 Ferrata.
 Plantaginis
 Rosarum.
 Solani.

Ol:

Rosarum.
 de Absinthio.
 Lentiscinis.
 Masticeinis.
 Myrtinum.
 Ompbacinis.
 de mentha.

Ung:

Comitis Jac.

Empl:

Contra erupturas.
 de Crusta panis.

III.
Emplastica.

Ex his alia simpliciter
 talia sunt, nec alia alia
 qualitate molesta, alia
 simul exsiccant, quodam
 simul adstringant, max
 ima tamen pars omnes
 istas facultates simul h.

SIMPLICIA.

Faz:

Tert:

Sem: Farnigacii.

Mucilag: omnes.
 Pincis: nuclei aqua m
 cornt.

Scitici.
Fabazum.
Sile.

Amyli.
Gum: Arabicis.

Mastiche.
Sang: Draconis.
Minc:

Lapis Calaminans.
Lapis Hamatilis.
Lithargyrus.
Plumbum unum.
Pompholyx.
Terza Sigill.

Alumen.
Bolis Armenia.
Cadmia.
Cera.
Antimonium.
Coralis.
Gypsum.

Anim:
Mumia.
Albumen Ovi.
Ung: COMPOSITA.

Album Rostis.
Deficativ: rubris.
Diachalchicos.
Diapompholwes.
de Lithargyro.

IV.
Anodyna.

SIMPPLICIA.

Rad:

Althea.
Liliorum.
Malva.

Fol:

Althea.
Malva.
Branca uesina.

Sem:

Althea.
Famigraei.
Lini.

Faz:

Famigraei. Hordei.
Lini. Scitici.

Fl:

Liliorum. Cereis.
Camomilli. Sambuci.
Meliloti. Sambuci.
Thalli ^{partib.} COMPOSITA.

Ol:

de vitellis oorum.
Amygdal: dulce. amar.
Anethinum.
Camomelinum.
Communi.

Umbriat. ^{Prin}
Hyperici. ^{pro nervis.}

medicamentum calida, doloris
definienda. Corra: dist. p. 40.

Herb.
Sambucus.
Chamaemelin.
Melilotis.
Anethinum.

medulla panis albi.
Butyrum vitium.
Pinguedo gallina.
antheris.
Vitelli coram.
Anagala pascina.
Lec. Aspidium.

ll: dulce medic etatis.

Ad dolores Internos.

ll: Amygd. dulce. - Siv ad 3^{tes}
Sem: Lini. 3^{tes} ad 4^{tes}

Anodyna specia. ~.
ap: Kufner: de Morb: puer: p. 67.

Gum: Azabichin.
Sarcocolla.
Tengalaba.

Alyps. accontivets.
Medulla.
Butyrum vitium.
Cereis.
Cera.

Tacamahaca ubi inter Amyluna praestantiss.
a. p. 132. & Monardi de Plant: Ind: p. 817.

Iridium.

Ung:Resumptivum.
de Althea.V
Narcotica seu
dolecem sedantia.Simplicia.Rad:Hyoscyami.
Mandragera.Fol:Cicuta.
Hyoscyami.
Mandragera.
Papaveris albi.Sac:Cicuta.
Opj.
Hyoscyami.Sem:Hyoscyami.
Papav: albi.Composita.Ol: violae:Mandragera.
Hyoscyami.
Papaveris albi.VI.
Emollientia.Simplicia.Rad:Althea.
Beonia.
Cucumeris agrestis.
Ebili.
Malva.
Iridis.
Liliorum albor:Fol:Althea.
Atroplicis. Beta.
Beonia Vesina.
Ebili. mercenialis.
Malva.
Parietaria, seu Perdicis.
Violaria.Sem:Althea.
Fenigræci.
Lini. Sesami.
Malva.Fl:Camomilla.
Liliorum.
Methuti.Fz:

Ficus pinguis.

SicSimpliciter doloze quasi sopitibus.
v. Gorræi del: p. 310. sensus
n. doloze tenuiter sopitibus, &
sopitibus.

Lac Mæche.

Dest: Salicis.

Aurt: vis in Oleo codicis.

O si qua alia refrigeratis. // 54 //

Laudanum.

Herba emollientes.

Malva.

Althaea.

Viola. — (al. Mercurialis. (al. Chamamblm.

Passiflora.

Branca castina. (al. Acta. (al. Arctostaphylos)

NARCOTICA IN STUDIO FACIENTIAINTERNA.

Materia Syr: viol:
 de Papav:
 de Sicc lactuca.

Succi lactuca.
 semper vivi.
 Solatvi.
 Portulaca.
 Cichor.

Cous: viol:
 Nymphaea.

Q si qua una Billem refriger: & incras:
 //G.//

Quae sunt entia.

Philonis antidot: }
 Atbanasia. }
 Dialibanum. }
 Diacodiam. }
 Nicotiana. }
 His si nisi maxima ne
 cessitate Atbania, neq
 continua, sed ex intervallo
 a 24 ad 31. cum
 Syr: Ros:

Philonis antidot: }
 Atbanasia. }
 Dialibanum. }
 Diacodiam. }
 Nicotiana. }

586

maxillam egerit in articulo: Torbis. R. 40.
q. parat. ex veteri et corniculato capite cum fere, in
quo nulla caro ad tubum coarctat.

Succ:

Ladanum.

Gum:

Ammoniacus.

Bdellium.

Galbanum.

Opopanax.

Styrac liquidus.

Terebinthina.

Anim:

Adeps Salsus.

-- Gallinaceus.

-- Anserinus.

Butyrum recens.

Medulla Cervina.

-- Vitulina.

Oesypus.

Composita.Ol:

Communi.

Camomulinum.

Catulorum.

Lini. Litorum.

Jesmin.

Limbriocus.

Violaceum.

Ung:

de Althea.

Resumptivum.

Empl:

Gerontium.

Fil: Zabaia.
 Diachylum magnus.
 de Meliloto.
 - Mucilagin:
 Oxycocum.
 de Romis.

VII.

Resolventia, & Allen:

Simplicia.Rad:

Helony.

Jeros.

Aristolochia.

Dauci.

Enula Campana.

Galanga.

Fol:

Absinthij.

Calamentij.

Hysopi.

Majorana.

Origani.

Rosis marini.

Ruthe.

Salvia.

Pulegij.

Saturcia.

Scm:

Anethi.

Anisi.

Cymini.

baica

Pex.
 Resina.
 Cera.
 Oleum simplex.

- Adeps vitulinus.
 Hadinus.
 Secum Vervicinis.
 Medulla foz omnis.

Dauci.
Fenugraeci.
Feniculi.
Nigella.
Lini. Lupini.

Fe:

Bacca Juniperi.
— — Lauri.

Piper.

Fl:

Anethi.
Camomillae.
Hysopi.
Lavendulae.
Occhiloti.
Stachados.

Composita.

Ol:

de Spica.
Scorpionum.
Terebinthino.
Quilpinum.
Amygdalar: amara:
Anethinum.
De Cappazibus.
Hyperici.
Nardinum.
Rutaceum.

Ung:

Agrippae.
Aragon.

martiatum.

Empl:

de Bacis Canalis.
— Sulphur.
Diaboli icati.

VIII.

Attrahentia.

Rad: Simplicia.

Acistolocchia utriusq.
Anacardia
Cyclaminis.
Hellebori.
Hermodactyli.
Iris.
Pyretrei.
Thlaspi.

Fol:

Vitica.
Anagallidis.
Calamentha.
Hadra.
Saponaria.
Nasturtij Agrestis.

Sem:

Nasturtij.
Synapi.
Thlaspi.
Vitica.

Fr:

Colocynthidis.

Antimonis.
Dracunculi.
Gentiana.
Ranunculi.
Narcissi.
Amandinis.
Aci.
Thapsia.

Flammula.
Lepidium.
Ranunculus.

Sile

Allium.
Cepa.
Fermentum.

Gambium.
Pix sicca.
Styrax.
Sulphur.
Sagapenum.

Succi.

Elaterium.

Gum:

Ammoniacum.

Euphorbium.

Pix secca.

Resin:

Castoreum.

Fimus Colubæ.

-- Gallinaceæ.

-- Anserinæ.

Stercus Caprillorum.

Miner:

Sulphur. Compos:

Ol:

Ricinum.

Synapium.

Empl:

de Meliloto.

-- Sulphuræ.

Oxycoceum.

de Baccis Lauri

IX.

Suppurantia.SIMULCIA.Rad:

Althea.

Liliorum.

Capa cocta.

Fol:

Althea.

Branca Vesina.

Malva.

Oxalidis.

Plantaginis.

Sem:

Althea. Tritici.

Lini.

Fenugraci.

Fl:

Composita.

Meliloti.

Gum:

Ammoniacum.

Bdellium.

Pix liquida.

Resina.

Cerebintina.

Far:

Fenugraci.

Lini.

Tritici.

Medulla Janis occu-
tis adhuc calētis TrossaAnim:

Adeps Sullis.

-- Gallinaceis.

-- Anserinis.

-- Vitulinis.

Butyrum.

Medulla Cervina.

-- Vitulina

Oestipis

Gallanum.

Sagapitulum.

Opopanax

Propolis.

Cantbaris.

Styrax liquidus.

Carica pinguis.

Ista inchoata & pinguis.
in quibus calor est moderatus.

Oestypis.
Vitellus Ovi.

CONDOSITA.

Ol:
Commūno. dulce.
Hydrocoleum.
Irinum.
Liliozum.

Mūcilag:

Altbæa.
Famūgraci.
Lini.

Ung:

Agrippa.
Basilicum.
de Altbæa.
Resumptivum.

Empl:

Diachylum magnus.
de Mūcilagin:

X.
Detergentia & Ex-
purgantia abscessus
& Ulcera.

SIMPLICIA.

Rad:

Apij.
Aristolochie.
Gentiana.
Ireos.
Sigilli Salomonis.
Samaris ei.

Cost: Cappasum.

Fol:

Absinthij. Absotoni
Agrimony.
Anagallidis.
Centaurij minoris.
Narzij.
Plantaginis.

Sem:

Apij. Vatica.
Plantaginis.

Suc:

Folior: pradiator:
Saccharum rubrum.

Liq:

Lixivium omne.
Urina.
Vinum.

Faz:

Fabazum.
Hordei.
Famūgraci.
Lini.
Lupinorum.
Orobi.

Gūm:

Aloes.
Mirba.
Terebinthina.
Thūs.

Mūcer:

Arūqo.
Salpētra.
Vitriolum.

Coni

Scolopendra:
Scylla.

Apij.
Nyssoji.
Nasturij.
Agromonia.
Beta.
Chamaedrys.
Tanacetum.

Fi:

Amigdala amara.
Hordeum.

-Siccus Limonium.

Fistulas.

Anim:

Fel.
Mel.
Serum lactis.

Nerium.

Tuchisei de Solo armena,
et de terra sigillata in
internis et externis scilicet
et admoti possunt.

Tberiacia sola purgat,
incarnat, cicatrizat, tunc
maligna et benigna ulcera
tutissimè ea hinc R. 4
Ol: R. a chymi ad illera
interna. Emulcato.
R. 40, e.

COMPOSITA.

- Syr:
- Nel rosatum.
- Ol:
- Sambucinum.
- Tartari.
- de Mirzba.
- Ovozum.
- Ung:
- Apostolosum.
- Egyptiacum.
- Aureum.
- Empl:
- de Botonica.
- Divinum.
- Gratia Dei.

Hæmastatica.

XI.
Sanguinem sistentia.

Simplex.

- Rad:
- Pentaptylli.
- Symphyti.
- Fol.
- Vatica.
- Ebuli.
- Pimpinella.
- Vinea pervinca.
- Plantaginis.
- Equiseti.
- Fz:

Galla immatura.

- Fl:
- Balaustia.
- Suc:
- Acacia.
- Hypocystis.
- Liq:
- Acetum.
- Omphacium.
- Gum:
- Mastiche.
- Mirzba.
- Sang: draconis.
- Thus.
- Anim:
- Mumia.
- Albumen Ovi.

Miner:

- Bolus Armen:
- Alumen.
- Corallus.
- Jasps.
- Lapis Hamatites.
- Terra Sigill:
- Vitriolum.

In ipsam Testant Euphan
stra omnia, et ad hunc
sensum etiam referunt
Cautica medicamenta.
Qua usurpant solent, ubi
hæc non sufficiunt ad
desperatas hamorrhagias
compescendas.

Pulv:

Pulv: et Empl:
harmastatic:
P. S. 11. 00.

Pulvis ad sistend:
Sangu

2 Bols Aombr:
Sang: Dracon:
Aloes.
Tibris. An. q. s.
fi. Pulvis.

Terebinthina.
Thús.

Arim:
Lumbri. ci.
Múmia.
Pili Leporis minutis
inasi. —
Miner:

XII.
Glútinantia.

SIMPPLICIA.

Rad:
Pentapbylli.
Symphyti.
Tormentilla.

Fol:
Aznoglosfi. n. Plan // taginis.
Betonica.
Búgula.
Cynoglosfi.
Hyperici.
Millefolij.
Pilosella.
Prunella.
Sanicula.
Scabiosa. salicis.
Verbena. ulmi.

Gum:
Aloe.
Mirba.
Pix.
Sarcocolla.
Sang: Draconis.

Litbargyrus.
Ol: COMPOSIT

Mirba.
Nicotiana.
Balsamum.

Ung:
Aureum. v. 334.
Desiccativ: rubr:

Empl:
Contra rupturá.
Nigrum.
Triapharmacum.

XIII.
Sarcotica seu defi-
cientem carnem in
vulnere aut in ulcere
cavo prosequentia.

SIMPPLICIA.

Faz:
Fenugraci.
Orobi.
Lupinorum.
Gum.
Aloe.

Ol:
Alouinon.

Sals:
Italum.
Sulphuris.
Vulturnale.

mir

SARCOTICA.

Bals.
Aloe.
Colophonin.
Masticob.
Resina pinea.
Lachryma abietis.
Farina hordei.
Eeni.
Aristolochin.
Cadmia.
Gris.

Cera.
Tutia.
Pompholyx.
Litargyrum.
Symplytum.
Hypericam.

640
Poculo hoc, tangt Semp. arr. p. 260.
vix aliqua mero Sarcotica sunt,
sicut T. abietis numerans, nec simul
agglutinantia, vel deturgetta, nec
maturantia sunt, ~~admixta~~
tamen si aliorum admixtione tenui
perent, etiam pro Sarcoticis adhi-
biti possunt.

leaf 01: } Hypothesis: Fern. W. M. S. 29.
Ung. }

Mercha.
Pix.
Sarcocolla.
Terebinthina.
Thús.

Miner:

Cerúsa.
Plumbúm ústúm.

COMPOSITA.Ung:

Apostolorúm.
Áureúm.
Basílicon.
Diapompbólgon.

Empl:

de Actonica.
Divinúm.
de lanúa.
Gratia Dei.

XIV.

Epúlotica, sive Cicatrisem inducentia.

SIMPLICIA.Cort:

Granatorúm.
Plantaginis.

Fl:

Balaústia.
Rosarúm.
Miner:

Alúmina ústúm.
Es ústúm lotúm.
Bolis semen:
Cadmia.
Antimonium.
Calx.

Cerúsa.
Antimon: ústúm.
Lapis Calaminari.
Plumbúm ústúm.
Pompbóliz.
Schoria ferri.
Terza Sigill.
Vitriol: ústúm.
Squamma aris.

Ung: Compos.

Albúm Rhasis.
Diapompbólizos.
Desiccac: rubrum.

Empl:

de Cerúsa.
Diapalma.
de Lapide Calaminari.
Paracelsi.

XV.

Cathartica, seu
Siphias carnis exedentia.

Aq:

Secúndina.
miner:
Alúmen ústúm.
Acúgo.
Es ústúm.
Flos Feis.

Anti

Ung: de cerúsa.
de cerúsa compdorato.
de calce
— de gl. et J. Carp:
Ung: de Tántia. id. 15.

Calx.
Salicitis.Præcipitat:
Sublimat:Mis.
Soy.Antimox. ustis.
Cinnabaris.
Mercurij præparatus.
Plumbum ustum.
Pisces crematis.
Sal torrefactus.
Squamma Aris.
Vitriolus ustus. ^{in calx}
_{cinabaris.}Ol:
Vitriolum. Sulph:
Vng:Egyptiacum.
Apostolorum.
Desiccativ: rubris.XXVI.
Vesicantia.Rad:Pyretica.
Thlaspia.Sem:Staphis agria.
Synapi.
Piperis.Gum:

Euphorbium.

Anim:Cantbarides.
Fimus Columbinus.Empl:

Vesicatorium.

XXVII.

Caustica.

Mixt:

FIXIS

Es ustum. Aris. flo.
Antimonium. Vitriol.
Calx viva.
Mercurij sublimatus.
Causticum vulgare.
— — Chyrurgic.Septica. seu Pu
tesfacientia.Anceipigmentum.
Arsenicum.Sandaraca Græcor:
Grifocella. q̄ raro uosi repanda, nec nisi post
crebram lotionem ex succo
portulacæ, Solani, Scamper
vivi, Cinnamon

Absorbentia.

Mixt:Sal. Nitrum.
Sulphur. Alumin.
Calx elota.Cin:Fermontorum.
Ficulinens.
Ilicis. Brassicæ.Liq:Lixivia a dict: Ciner:
— — ex Calce.
Acetum. MuciaOl:Castorei.
Euphorbii.
Philosophorum.
Petroleum.

PRIMÆ partis.

Cinis facum Veni.
Ficulinens.
Fenugri.

Sabina.

— Fimus Columbinus.
Helleborus albus.
Thapsia. Sinapi.
Deacurculis.
Hydroppis. Scylli
Staphis agria.

Droptiris.

Ptyocampis.

Aconitum.

Lapis septicus, seu Cast
terium potentiss. V. S.
v. S. Jambert. Jamb.
adtingunt. n. in usque
q̄ si facile emendat: pro
lavio ab his p̄cipis in, ab
p̄cipis membra in p̄cipis
a p̄cipis.Flammula.
Raminiculis.

Fermentum.

Isobarotica media
inter Vesicantia & Caustica. // 233. //

PARS SECUNDA.

de Compositione Medicam:

Composita Medicamenta triplicia
sunt, Interna, Media, & Externa.

Interna quae sunt, intra corpus suum
muntur. Talia sunt.

{ Apozemata, Potiones, Julepi,
Syrupi, Emulsiones, Boli,
Opiata, Tabella, Pulveris,
Trochisci, Pillula, &c.

Media, quae neque intra corpus suum
muntur, neque Corporis superficiem ad-
moventur; sed in certas Corporis
capacitates immittuntur. Quae sunt.

{ Suppositoria, Clysteris, Injections,
Pesjalia, Erzhina, Masticatorum,
Collyria, &c.

Externa, quae partibus exterioribus
admoventur, Cujusmodi sunt.

{ Epithemata, Fomenta, Balmia,
Olea, Unguenta, Emplastra,
Cataplasmata, Sacculi, &c.

Idco hujus partis secunda tres erunt
sectiones.

Prima interiorum }
Secunda mediorum } medicamentorum: com-
Tertia exteriorum } ponendi regulas
proponit.

II.^a PARTIS SECTIO prima.
de Compositione Medicam: Intern:

CAP. I.

De APOZEMATE ALTERANTE.

NO. *Apozema* lat: Decoctum, vcl
tribus Paquetisq, qualescunq purgationibus potio.
Apozema est decoctio Medicamentorum
Saccharo vel melle condita, clarificata,
aromatizata, pro iv aut v dosibus
vnter facta ad humorum conco-
tionem seu praeparationem, et in
triduum ad tractationem
ergo ab effectu duplex etc.

NO. In Alterante tu diligentr observ.
Compendiaratio, vltudi modis,
Utilitas.

I. In Compositione vi purganda

I. Maā, ex qua vis &
facultas medicatrix
elicenda: seu ex qua
componunt Apo: sicut

Radices	hoc qd ordinā Dosi ut in textū.
Cortices	
Ligna	
Folia	
Semina	
Fructus	
Floris	
Aromata	de qd p: hq:

Apozema est forma Medicamenti
multorum simplicium decoctione con-
flata, Saccharo vel Melle dulcorata,
in tres, quatuor, aut quinque doses ad
alterandum vel purgandum comparata.
Ideo duplex esse solet. Alterans
sc. & Purgans.

Apozema alterans componitur ex
Radicibus, Corticibus, lignis, Folijs,
Seminibus, Fructibus, & Floribus.

Quorum omnium quantitas talis esse debet.

Radicum	— — — ab ℥iij. ad ℥vi.	raro ad viii.
Corticum	— — — ab ℥i. ad ℥ii.	Purgandi ad sem. vel ℥ ad simulum.
Lignorum	— — — ab ℥i. ad ℥ii.	
Foliorum & Herbarum	— a ℥i. ad ℥ii.	
Seminum	— — — ab ℥i. ad ℥ii.	
Fructuum	* minorum, ut Passularum ab ℥i ad ℥ii. interdum numero mensu- rants, ad paria xii. vel xvi.	— iij. sub: Sebest:
	* Majoris vero fr. tui numero nu- sicans, eoaq paria: ut ficus, ad paria vi. vel vii.	
	* Maximi vero numero impari, ut Poma.	
Florum	— — — a ℥iij. ad ℥vi.	floris n nisi macerent secul.

II. Liquor, in quo Consi-
deratitas

Hac omnia decoquunt in liquore idoneo,
qua vulgo est Aqua fontis; vel inter-
dum etiam Aqua Hordei in affectibus

Aliquando ad febres humores, et ad Bilios.
melancholicos ex sero lactis fit decoctio. NO.

* addita etiam sibi sibi
nem interdum Aceti
parte octava, si est
refrigeratio est
quaq est purgatio
petitur. NO.

68a

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several lines and is mostly obscured by fading and discoloration.

IV.^o Dissolvenda in Calatira facta cui considerantur ratione

Qualitatis ratione dissolvuntur vel

Syrupi tantum, et tunc semper, quibus loco idonei.

Saccharum aestate solum, et ad calidos morbos ac naturas.

Syrupi et Saccharum simul.

Mel hyemum tantum et ad frigidos morbos ac naturas

Medicamentosi Succi (vel per decoctionem et clarificationem, vel per residentiam depurati).
quibus vel

Herbarum variarum pro varietate indicationis

Ita passim ad morbos Melancholicos Siccis
Borag: Fumar: aut Capuli depurati dissolvit.

Fructuum siccis acidorum, idque maxime ad
calidos et biliosos affectus, ut: Citiorum,
Limon: Granator: etc. Et eodem modo et
passim ad Melancholicos Siccis Toros: addit:

Liquores ut

Acetum, ad calidos et biliosos affectus non modico
caute temperandos, ad obstructions etiam
pariter solvendas, ubi attendendum ac incidendum.

Vinum, cuius precipua vis hyemum ad crassos lentosque humores,
ad obstructions, ad morbos frigidos ac diuturnos, qui
sunt febres fatigant: ad quosvis Symplo vel Medicato liquoris
praestantissimum est. Cuius a. Vinum nam familiare ac in
eundem sit, suas vires per omnia secula insimulans prompte in ab-
ditissimas eius partes diffundit, et quibus opt: Medicinae ubi dicitur.

Quantitas //
deca in textu

tenor

Bilioſis; vel Hydromel in Pituitofis. Nonnunquam etiam in Obſtructionibꝫ fit decoctio in equal: partibus Aquæ Fontis & Vini albi ſub finem additi, vel duabus partibus Aq: Fontis & una Vini albi, pro arbitrio medici.

Quantitas

Liquoris quantitas non definitur, ſed hac præſcribitur formula. V. G. ſi. decoctio in Aq: Fontis q: s.

Decocti tamen colati quantitas deſignari ſolet, ſc. ad ℥j; pro tribus doſibus; ad quart: v. pro quatuor doſibus; ad ℥jſſ, pro quinque; a. hac formula, de Colathra capo, ℥jſſ.

Postea diſſolvuntur Symp̄ ea quantitate, ut pro unaquaqꝫ doſi Apozematis ſit ℥jſſ Symp̄i: hac formula, In qua Colathra diſſolve Symp̄i, (v. G. Capitlor: ♀, Violarum) an ℥ij.

Interdum ſolum Saccharum præſcribitur eadem doſi, præcipue quando ſucci aliqui diſſolvuntur, qui Apozema reddunt efficacius: raro nitentur Symp̄ additi.

Illi autem ſucci utiliſſime præſcribuntur in Apozemate ad ℥ij. Hac formula, In Colathra diſſolve Succorum depuratorum (v. G. Dozaginis, Acetoſæ) an ℥j. Sacchari albi ℥ij. Utplurimum vero ſacchari quantitas non definitur, ſed præſcribitur Sicc: alb. q. s.

His præſcriptis Apozema condiri ſolet aliquo Aromate, quo jucundius evadat. Frequentiſſima tamen, et magis grata Aromata ſunt, Santalū Citri

et craſſis humoribus attenuandis aut lentis detergendis, aut retentis infarctibus expediendis.

b. ad frigidos humores et inchoatas obstru-
tionibus Aq: Chalybeata eximie occurrat, ex Aq: et Vini aq: p. ℞. rariore vino ſolo, quod prompte acciſat aut vaporet, rariore ex Aq: Stillat: q: vis ejus exoleſcat.

Mate ℥. (ingr ℞.) ſtatuit quam Aquam ſimplicem imm̄ elicitur: aridum enim eſſe maam: Neqꝫ enim ut cum frigidis frigida, ita cum calidis calida neqꝫ ſi ſecum diſtans cogit (ut ille dicit) calcſcit, ſed frigida ſemp̄ tamēſi nung peſſit.

d. Doſis ℥xx non excedat, aliqui autem niſum facit corruſcunt, aut ſtium contrahunt ita ut ſint ℥. pro quolibet doſi ℥ij, vel ℥ijſſ.

℥j aut aliquando ℥ijſſ Symp̄i.

Interdum Symp̄is et Saccharum, V. G. Symp̄i ℥ij, Sacchari q. s. vel ℥ij aut ℥ij.

f. ℥ij, vel ℥ij.

Clarificatio poſtea imperata, ut uſu fiat jucundiora, et diu-
tius aſſervata, nec putreſcant
facile. ℞.

iii. Decoctione ipsa
vel Decoctum.

iv. Dissolventia
in ipso deco.

v. Clarificatio.

vi. Aromatizatio.

Aromatizantur (ingr ℞.) cum Apozema fit pur-
gatorium: Aromata enim odore jucunditate nos
modo oblectant, ſed et corroborant, et corporis ſpiritus reſerunt et efficiunt
animi quoqꝫ exhilarant.

Santalis Citriniis semper fit ad u
matizatio, Si in partium infla
matiom in consensu trahat tepor.

2. Usus seu Utendi ratio est, ut detz
pro. v. aut v. dosibus, manu
jejuno stomacho. NO.
interdum mane et vesperi.
3. Utilitas. NO. Morel: p. ...

In Apozemate purgante faciendo v. ac v
curantur perpendenda: Materia ex qua fit
Catharticum; Dissolvenda in colatura,
Usus; Utilitas. NO.

1. Materia purgantis Apozematis sunt
Cathartica simplicia vel decoda
vel infusa una cum man. Alti
rantis Apozematis.

Nonnulli purgantia simplicia coquere
distingunt, eo quod eorum vis purgas
aut p. distributionem in vapores transeat,
aut obtundat; ac primum eorum dosis
difficiliter admittam observari possint.
Deinde decto alteranti Rhabarbarum
aut aliud purgans in decocto infundi
distingunt, eo quod vis purgantis
propter decocto insiditatem v. extrahat,
ac praeparata E. G. Rhabarb: si purgans
sit indicio, eorum in Aq: Cichorij, aut
alia stillatitia infundunt: Sin ratio
ratio scopis sit, in decocto alteranti
mon? Wiegman.

Citrinum, et Elect: Diatrion Saru
talum in Apozemate refrigerante.
Cinnamomum vero in calefaciente.
Et horum Aromatum Basis est Ziss, vel
Zij. Hac formula. fi. Apozema
clarificatum, et Aromatum Zij
Cinnamomi electi, pro quatuor dosibus
Matutinis.

CAP: II.

DE APOZEMATE PURGANTE.

Apozema purgans est, quod huius
mores noxios non solum preparat, sed
una eademque opera evacuat, purgans
tibus medicamentis cum alterantibus
commixtis.

Hodie usitatissimum est hoc Apo
zematum genus, et solum ferè in usus
vocatur; Illud enim, quod sim v
pliciter alttrat, Julesi non usuplu
rimum usupari solet.

Quadruplex a. esse solet, pro qua
druplex Catharticozum differentia,
Cholagogum, sc. Pilemagogum, Me
lanagogum, et Hydagogum.

Componitur eadem alterantium
Materia eademque forma; ac praeterea
Cathartica adduntur, cum suis coru
rectivis, et inter Fructus et Flores
collocantur ea proportionè, ut totides
sint Catharticozum doses, quot Apo
zematis.

Usitatissimum autem in omni Apo
zemate Sennam pro Basi praescribit
ferè ad Zij. Cui adduntur Polyprodi
um et Semen Cathami eadem quan
titate

Monspely (ubi Medicina maximum accepit incrementum) solent praescribi,
Op. Sol: Sennae Dosis: munda:
Polyprody Cileicis recentis,
medulla Sem: Cathami mediocr: contus:
© Zij, Zijß, Zij, pro basi.

In- Aromatizatione itidem
respicienda sunt

Qualitas v. ad Saporis gratiam
laevitate vel
Aroma simplex, ut
Santala
in calidis affectibus
Cinnamomum
in frig: affectibus
Aroma compositum,
Patris Electiar: all:
Diatrion Santal:
in cal: affectibus
Aromat: Rosat:
Diambra
in frigidis affectibus

Quantitas, sic
pro tñ. decocto // Zij
pro toto decocto // Zij, vel
ad summum.

In M^{ta} purgantis Apozematis III^a Consideranda

70a

I. Qualitas, cuius ratione alia Cathartica sunt

Coquenda una cum his correctorijs

Sem: Carthami.	—	Anis: Cinnamom:
Turchibb.	—	Zinz: Cinnamom:
Hermoadactyli.	—	Zinz: Cinnam:
Fol: Senna ^o .	—	Anis: Fœnic: Cinnam: Cariophyl:
Polypod: Phere:	—	Anis: $\bar{\alpha}$: Cinnam:
Epithymis.	—	Passifl ^a : viol ^a .
Ram: Eheb: nigri.	—	Anis: Cinnam: Cardiaca varia.
Sem: Ebali.	—	Cinnam:
Fol: Esula ^o .	—	Aceto maceranda.
Myrobalani.	—	Oleo Amygd: dulc: confusata ^o .

Infundenda

Rhabarbarum.	—	Cinnam: Spica Nardi.
Agaricus.	—	Zinzib: Sal Gemma ^o .
Tamarindi.	—	Cinnam: Macis.
sic & mine Paris:		
Cassia.	—	Anis: Cinnam:

II. Quantitas

III. Ordo Prescribendi. p. seq:

titate, vel saltem ad ℥j. utriusq[ue].
 Deinde alia præscribunt, Cathartica
 pro humore peccantis ratione, quoniam
 enim alia decoquunt, ut Turbith,
 Hermodactyli, Epithymis, Hellebori
 niger, Sem: Ebali. Alia vero in
 fundunt, ut Rhabarbarum, Agaricus,
 Tamarindi: Notandi tamen Tamarindos a

Illa, quæ non decoquunt, sed tantum
 infundunt, hæc formula præscribi so-
 lent. (Rhabarbari .V.G.) Sersim in
 fusi ℥β.

Quæ vero decoquunt, simplicitate en-
 nunciantur.

Dosim vero computatio ita fieri
 debet, ut unica Senna dosis in deco-
 ctione sit ℥j. Turbith, Agarici &
 Hermodactyli ℥β. Rhabarbari in-
 fusi ℥β. Polypodii v. Sem: Car-
 thami & Epithymi nulla habet dos,
 quia sunt exigua virtutis.

Sic quando Apozema componimus
 in iv doses possumus præscribere Senna
 ℥ij. Turbith & Agarici an ℥j. Ita
 enim erunt iv doses purgantium, sc.
 dua Senna, una Turbith & una Agarici.
 Quorum loco alia substituere possumus,
 prout indicatio exigit, eadem semper me-
 thodo observata.

Correctiva statim post omnium pur-
 gantium enumerationem præscribuntur;
 quæ ut plurimum sunt Zinziber & Caci-
 opbylli, utriusq[ue] ℥j; ita ut sint Correctivorum

In decocto colato ydem propemodum
 dissolvuntur, Symplicia, quæ in alteratib[us]
 Apozematibus præscripta fuerunt. In
 tertium vero, quando Apozema suffici-
 enter

illis etiam coqui: sicuti & Agaricum
 ac Rhabarbarum aliquando, quoniam
 hinc panno ligata esse debent: Præstat
 a. Rhabarb: non coqui sed solum infundere
 nam tenuis eius portio purgandi[us] aris
 coctione perit et exolvit. no.

℥β.

q. quandoq[ue] etiam Cinnamon: Anisum;
 passiflora, etc.

riorum in universum ℥ij ad ℥β.

quod soli si Apozema satis purgans videat[ur].

2. Dissolvenda in colatura.

.c. Interdum Syzyporum purgans
gandum & alterantium
℞i, vel ℞ii.

enter purgans non estimatur, Syzypi
purgantis dissolvuntur, & frequentis
sine Syzypis Rosatis solutivis;
aliquando Syr: de Cichoreo compositis
cum Rho, in affectibus Biliois; &
Syr: de Fumaria compositis cum Rho,
in affectibus melancholicis: c. d.

Nonnunquam & Veris tempore
dissolvitur Succus Rosar: pallidar: vel
infusio eazundem completa ad ℞iii,
in affectibus Biliois, & tunc nulli
prescribunt Syzypi: Sed Saccari, p. s.

In usu autem omnium Apozematibus
hoc observandum, ut initio humoris
in prima regione contenti Medicamento
Cathartico vacentur, & in fine illi
omnes humorum Reliquia expurgentur:
Quod sapientissime fit ipso Apozemate,
si prima & ultima illius dosis vali-
dus purgans efficiatur, dissolvendo in
illa Operata vel Electuarij purgantis
℞ii. plus minus pro dispositione a-
grotantis, Syzypi purgantis ℞i.

Hæc formula, In prima & ultima
dosi dissolve Electuarij (Ciacarthami)
℞ii. Syzypi (Rosati solutivi) ℞i. Miste
Fi. potio cap: cum regimini, seu custodia tu horis ante

Aliquando minorans medicamen-
tum prescribitur ante Apozema, &
tunc in ultima tantum dosi pur-
gantia illa dissolvuntur.

Nonnunquam & in affectibus Ca-
pitis & partium a ventriculo valde
remotarum Pite prescribunt post
Apoze

a. ad ℞iiii pro
aut v dosibus.

d. Interdum Electuarij
Mollia qdem, ut
Diaprun: solut: pro Biliois
Diapbarium pro Pite
Diasenna pro Melanch
Catholic: pro omnib
Solida vero ut
Elect: de Sac: Ros: pro
Biliois
Diacartham: pro Pite
Elect: de Citro solutiv:
pro Melanch: & Pite

atq; hæc quidem in
dosi usus tunc dissolvuntur
ad ℞ii, vel ℞iii.

3. Usus ergo idem, qui Apozematibus
alterantium, pro IV dosibus
matutinis, nisi q addatur

tu horis ante
partum.

f. vixissime trahens
excorpolivov Groti

Apozema, & tunc nihil dissolvit
in ultimâ dosi.

CAP: III.
de POTIONE PURGANTE.

^{1.ª Potus}
Potio est medicamenti forma li-
quida, in unicam dosin præscribenda,
ex variazum rerum decoctione, infu-
sione, aut dissolutione in eodem liquo-
re composita: ad humores quosvis expurgandos aut etiam alterandos:

quare & 10. Potiones dividit
in Purgantes & Alterantes. —

Eaq[ue] multiplex est, secundum varias
indicationes, in quibus usurpatur, sc.
Purgans, Corrobicans, Somnum con-
cilians, Limbricos enecans, Menses
promovens, etc.

Potio purgans multis modis parari
solet, & in ea tria considerantur.
I. Decoctio. II. Infusio. III. Dissolutio.

DECOCTIO.

Decoctio magis usitate præscribitur ex
Sennâ ad ℥ss. vel ℥vj. Sem: Anisi ℥j.
ad correctionem Sennâ: Vel Sem: Anisi
& Caryophyllos: an ℥ss. Herbarum af-
fectui propriarum ℥jss, vel ℥ij.

Liquirit: rasa & Pasticulæ: mund: an ℥ij.
C hæc duo sicut in oib. potionib. Præscribuntur, præ-
terea in nonnullis miltibus, q[ui]a dulcedine ab-
horrent Florum appropriator: Pj. vel ℥j.
& fit Decoctio ad ℥ij.

Vel sumitur Decoctum commune
Medicina purgans: quod in Officinis ha-
beri solet.

Interdum & in affectibus Pectoris
præscribitur Decoctum commune Pecu-
toral

INFUSIO.

Qua infunduntur, vel trita, vel pulveris
 rata, vel aliquando integra macerantur
 abest coctio per S , aut O .
 aliquando. a. eadem medicamenta nodulo
 inclusa ante infusionem in felleo incoquantur.

Pectorali purgans eadem methodo.

Infusio fit ex Rhubarbaro in af-
 fectibus biliosis; Agarico in Pleuritide
 vel utroque, in mixtis. Et eorum quantitas
 est a ʒj . ad ʒij . Ad dno correctivo
 Spica Nardi, vel Cinnamomo, vel
 Santalo Citrino ad ʒj . ad ʒij .
 Spica Nardi Rhubarbaro correctivo,
 Cinnamomum utriusque est, sed in affe-
 ctibus minus calidis. Santalum
 Citrinum in Febribus vehementissimis.

Liquor. a. in quo solet fieri Infusio
 est Aqua Stillatitia affectui propria,
 vel est Decoctum purgans predictum.

DISSOLUTIO.

In Dissolutione prescribuntur Com-
 posita purgantia, Opiata, vel Electuaria
 quaedam deest, pro majori vel minori qua-
 titate purgantium, qua in Decoctione
 vel Infusione prescripta fuerint, ut
 Symplicium aliquis purgans, v. G. Rosatig
 Solutivus sequentissimus; Interdum
 Syz: de Cicchoro composit: cum Rho,
 vel de Fumaria composit: qui minus
 purgant, quam predictus.

Syzuph. a. quantitas perpetua e ʒj .
 Nominatim vero in affectibus Pul-
 monum Scanna dissolvit ab ʒij . ad ʒij
 et tunc Syzuphi quantitas minor est ad ʒij .

His variis modis Potiones Catharticae
 componuntur: vel tribus hisce prepa-
 rationibus, vel duabus tantum, vel una.

Si enim fiat Decoctio Magistra-
 lis, cum infusione in eadem Decoctio-
 ne, ita prescribitur.

Potio purgans iv consideranda habet, quorum

1.^a Liquor ex quo fiunt potiones (pro dissolvendis alijs Medicamentis) tum ratio
Qualitatis ratione vel est

Decoctum

Alterans i. ex varijs Plantarum partibus (diablis aut triblis),
tum humorum vacuandum, tum sedem affectam respicientibz,
unde Catharticum efficacius reddit, idqz ut Aporemat
dosi, sicuti enim Aporema pro iv, ita Potio pro i. dosi est.
vel ii. decoctum tota Medicina. vel iii. decoctum florum
et Foliorum Cordialium, quod & decoctum Pectoralem
vocant. (in affectibus Thoracis.) vel iv. Infusulum puli
alteratum foli. Endiviae, Acetosae, Borag. Byglossae. (in
morbis biliosis, & febribz artuantibus.)

Purgans constat vel i. decocto aliquo jam dicto alteranti cum
Senna ad ℥ss ad ℥ss & corrol. Aniso, Garioph. ad ℥ss.
vel ii. Senna cum corrol. (dosi jam dicta.) cum floribus
cordialibus in Aq. cor., vel ut quidam in Aq. Stillat.
decoctis. vel iii. ex sola Senna cum Aniso in Aqua
fontana, aut stillatitia decoctis.

Infusio purgantium, quae licet ex omnibus cathartice parari possint,
hodie tamen plurimum fit ex solo Rhubarbaro a ℥ss ad
& ipsius corrol. Cinnamonu ad ℥ss vel ex Agarico eadem dosi,
vel potius Rhubarbaro & Agarico simul, dimidiata utriusqz dosi,
in liquoris idonei q.s. passim .a. Aq. Still. Endiviae, Cicboriz,
aut alterius Herbae sedi affectae, aut morbi accommodatae sinitur.

Decoctum cum Infusione simul, quod omnium frequentissimum,
Sicqz sinitur de colatura decocti alterantis aut purgantis q.s.
pro dosi, ~~in~~ a ℥ss vel ℥ss. in quo infundit Rhubarbarum
dicto modo. etc.

Liquor alius interdum in magna festinatione, ut Aqua Stillatitia
quaedam, Hydromel, etc sinitur. ad quibus, p. 76.

Quantitas est ℥ss aut ℥ss pro pueris, & mollioribus, aut ℥ss passim alijs.

Dissolvenda // p. seq. //

Usus, ad unicam dosin Prescribitur sinitur: mand cum custodia, lvi pcedenti caena.

Utilitas.

Dissolvenda in potione purgante considerantur vel ratione

Qualitatis ratione ea quae dissolvuntur, vel sunt

Purgantia & quidem vel

Simplicia, ut Cassia, Manna, // aliquando etiam RBararb. ℞j, ℞ij
in alvi fluxibus, P. Mechoacan ad vacuandos pituitosos humores //

Composita, ut
[Electoraria] molliā, cum Opیاتو, ut Diapod. Solūt. pro
Confusio. Diapod. Solūt. pro Biliofis.
Diapod. Solūt. pro Pituitosis.
Elect. Solūt. pro Diapema* & Melanchol.
Catholiceum pro armbus.
Solida cum Tabella, sic
Tabulatim electuar: de Succo Lepar. p Biliofis.
Diapod. Solūt. pro Pituitosis.
Electuar: de Citro pro Melanch: & pituit.

Pillula rarissime & nisi in affeclibus soporosis dissolvuntur.

Dulcorantia praeter haec cathartica semper sunt Prescribenda, sicuti
Mel, Saccharum, — sed passim et usitato Syrupi & licet
interdum simpliciter alterantes Prescribantur, (quando liquor per se
satis purgans, et vel Catharticozum satis in eo dissolutionem fuerit)
hodie tamen frequentissime ii Syrupi Prescribuntur, qui simul pur-
gandi vim habent, ut sunt Syrupus de Cichoreo cum RBo.
Syrup: Rosae: Solūt. quem
nunc in Belgio compositum
habent cum [RBo, Agario,] vel singulis
Senna.] vel unitis.

Quantitas vel Dosis horum purgantium, major // vel minor est, prout liquor & dextro, ^{vel infusio} magis aut minus fuerit purgatorius: Vbi vero cuiusmodi liquor vel nullam vel parvam
quam vim purgandi habet, tunc solvi possunt, si praescribantur

Simplicia ut Cassia, Manna, ℞j, ℞ij
Electoraria supra memorata ab ℞β, ad ℞vi, vel ℞j.
Pulveres et Pillula ad ℞j vel ℞j.
Syrupi ab ℞j ad ℞ijβ.

MEDICAMENTA quae infundi seu mace-
rari solent, sunt

- Aglicus. ℥v.
- Senna. ℥vi.
- Rhabarbar: ℥iij. ad vi
- Tarbitz. ℥j.
- Scammonium ℥ss, vel gr: xiii
- Hermodactylus.
- Myobalani. ℥iij.
- Tamarindi. ℥ij.
- Psyllium. ℥j.
- Fumaria. ℥j.
- Aloe. ℥ij.

et alia feruntur sicut cineres calidos temperant
aliquamdiu calore idoneo, ut vis resinosa
corrigatur.

NB. Rhabarbarum infundi, non coqui debet, ne vis
purgandi, et exloquatur evanescat.

Senna de coqui, non infundi debet, quia multo
coctum reddit liquidum. sic Riel: 13.14.
contra apud nos coquunt saepe Sennam, et
relinquunt in infusione cum Rhabarbaro.

74d

The ... of ...
- ...
...
...

℥. Fol: Senna, etc. si decoctio ad
 ℥ij. In Colatura infunde Rhabarb.
 (v. G.) ℥ij. Spica Nardi gr: viij. Ex
 pressione facta, dissolve Diapremi
 solutivi (v. G.) ℥ij. Syr: Rosat: solut:
 ℥j. Misc: si. potio, quia detur
 coas mane cum custodia et regimini
 artis.

Si vero fiat decoctio Magistralis
 cum infusione in Aq: still. Hac
 formula prescribitur. ℥. etc.
 si. decoctio ad ℥ij. In Colat: dissolve
 Rhabarb: (v. G.) in Aq: Cicborij cum
 Spica infusi et expressi ℥j. Electi
 ary de sicco Rosar: ℥ij. Syr: de
 Cicborio Compos: cum Abto ℥j.
 Misc: si. potio. Quia detur, etc.

Si fiat ex decocto Officiali cum
 infusione in Aq: still. Hac for
 mula prescribitur. ℥. (v. G.) Rhab:
 electi et Agarici trochiscati an ℥ij.
 Cinnamonli ℥ij. Infundant in Aq:
 Botonica, expressione facta dissolve
 Electuarj Diacasthami et Diaphan:
 an ℥ij. Syr: Rosat: Solutivi ℥j.
 Decocti communis Medicinæ purgant: ℥ij
 vel Deccti Pectoralis coas purgantis ℥ij.
 Misc: si. potio. Quia detur etc.

Nota interdum nulla Electuarja
 prescribi, quando sc. benignius est pur
 gandum: sed tantum Decoctum,
 Infusionem et Sympum.

Ex duabus tantum preparationibus
 conflata actiones duplices sunt. vel
 sc. ex decoctione et dissolutione, vel
 ex

ex infusione & dissolutione.

Ex decoctione & dissolutione fiunt Potiones hac formula. ℞. Infundant, &c. Expansione facta dissolve Electuary, &c. Syrupi &c. Misce, fi. potio.

Ex unica tantum preparatione fiunt Potiones, quae simplici dissolitione constant, quod fit in Casibus valde urgentibus, ubi decoctionibus aut infusionibus tempus non suppetit, & tunc Elect: purgantia dissolvunt cum jusculo, vel Aq: propriata, ad ℥vj. aut ℥j. Hac formula. ℞. Electuar: ℥j. (v. G.) Diacarthami ℥j. dots cum jusculo. ℞. Elect: &c. Syrupati solutivi ℥j. Aq: (v. G.) factonica q. s. Misce fi. Potio.

Interdum dissolvit Rhubarb: pul: creasat: cum jusculo. In Diarhea vel Dysenteria. Hac formula. ℞. Rhubarb: pul: creasati ℥j. Dosis Coas man: cum jusculo. Datur ad ℥j. pulcritis qui ferri nequeunt vehementiora Ca: & haezotica. Pueris etiam exhibit Mana cum jusculo dissoluta ad ℥j. & Ozoni: dioribus in affectibus Pulmonibus, ad ℥j.

ubi purgandam et ad stringendum simul.

aliquando etiam Pulvis Mechoacan: ad educendos pituitosos & sterfos hunc Pillula: vero rarissime dissolvenda: aut nunquam nisi in affectibus soporosis

CAP: IV.

de POTIONE CORROBORANTE,
Somnia concil: Lumbricos ente: &c.

Potiones istae, quia unica tantum dosi praescribuntur, sub Potionis titulo exponuntur, licet hodie usus invaluerit.

in fa

3
4
5
6
7
8

76a

70
Julepūs Arabūm inventūm est, vocantq; eo nōvū medicamentūm fluidūm,
delicatūm et suāvū. Rhetoricorūm Byzantinūm schola Ευδαμων appellavit.

Estq; duplex

Veterūm julepūs propriū erat medicamentūm jucūndūm conditū
liquorē grato suaviq; cūm Saccharo in Symplici gēre consistentiam
dedito, gratia oblectamēti potius quā medicamēti: quō
mōtūpē delasatos argos deliniant. Ejūsmodi duo olim
percellēbāt sūt, Violatūs, et Rosatūs sūt Alexandrinūs,
quī Medicis Parisiensibūs Julebūs Regiūs dicit; quōd is Regi
Francisco, litterarūm patrono sūmmo, esset in delicijs.

Recentiorūm Julepūs, sive hodiē usitatus duplex itidem statuitur
[propriū talis, pīssiorūm morō suavis et delicatū est, tūc inq; cū
cūndi saporis expers, ac instar Aquæ liquidūs.
impropriū talis Julepūs quī saporis inflavis et ingratus est,
estq; julep tantūm rationē formæ et compositionis, non
aliam rationē gratiæ ac suavitatis.

Eadem tamēn utriusq; componēdi ratio, ac Utendi modūs.
sicut quā statuit. NO. 4 differentiam cōterre conatū frustra

in facienda Medicina, ut sequentz
vocentur Julepi pro unica dosi, ad
differentiam vulgarium Juleporum,
qui ut plurimum pro dos: m̄ prescribunt

Fiant. a. potiois ex Aq: Cardiaca
℥iij. Sympsi Cardiaca ℥j. Confect:
Cardiaca ℥j. Pulverum Cardiaca ℥j.
Hac formula. ʒ. etc. misc̄ et fi. potio,
(vel fi. Julep: pro unica dosi) quam
cap: tali hora. Omnis enim hora est
hinc ut medio propinanda, sed potissimum
mane et sero usurpatur.

Somnifera potio fit ex Syr: de Pa
paree ℥j. Aq: Cardiaca ℥iij. Confect:
Albezum's ℥ss vel ℥j. Hac formula.
ʒ. etc. m̄. fi. potio, qua dets hac
nocto, hora somni.

Potus contra Vermes fit ex Aqua
Portulaca aut Graminis ℥iij. Syr:
de Limonibus ℥j. Confect: de Aya,
cincho ℥j. Pulv: contra Vermes ℥j.
vel alio modo consimili.

Ad reliquas indicationes adimplen
das eadem ingredientium proportio
strepentis erit observanda, ut sint
Aqua -- ℥iij. Sympsi -- ℥j.
Confect: -- ℥j. Pulvca: -- ℥j.
vel ad sumis - ℥ij.

CAP: V.

de JULEPIS. —

Julepis duobus modis componi solet
nimirum, vel ex Aq: Stillatitjs, vel
ex

ex simplicium decoctione.

Prescribitur autem ut plurimum pro III aut IV dosibus, ea proportione ut pro unaquaque dosi sint Aquar: ℥ij. vel ℥ij. Syz: ℥j. Haec formula. ℥ Ag: ℥c. M. fi. Julep: pro tribus dosibus mane & sero sumendus.

Interdum succi cum Aquis commissa centur ea proportione, ut pro unaquaque dosi sint Succorum ℥ss. vel ℥vj.

Nonnunquam etiam in Julepis prescribitur Sp: vitrioli gutta aliquot, non determinata. Julepis dico refrigerantibus, sed haec formula usurpatur, Sp: Vitrioli q.s. ad certam aciditatem.

Ex decoctione Julepis componunt eadem methodo, qua Apozemata alterantia. Minori parvo simplicium dose. In eo tamen differunt, quod in Julepis non prescribitur Clarificatio & aromatizatio, sed talis eorum est formula. ℥ Rad: ℥c. fi. Decoctio ad ℥vj. In Colatura dissolve Syzupor: ℥ij. M. fi. Julep: pro tribus dosibus mane & sero sumendus in hoc post partum.

a. potest tamen in Vasa desin etiam prescribi necessitate ita portabitur

R. 2a. c. Summe Succi Syzupor: part: ℥ij. Aquar: part: ℥ij.

d. quemadmodum et in Billesis scribitur magis in suspectis prescribitur aliquot ostendendum est hoc est liquoris ℥ij. et Austi Rosaci ℥j. ND

f. sed media tantum simplicium dose.

ND hoc Julepis decoctum tantum mane sumi videtur instar Apozematum.

CAP: VI. de SYRUPO ALTERANTE.

Syruporum duo sunt Genera, alterantium sc: & pulegantium.

Alterantes Syzupri raro componuntur a medicis, quia quamplurimum habentur in Officinis ad omnes indicationes adimplendas.

Syz: (usuales) } alterantibus (magistralis) } pulegantium

Julepi rarissime Aromatizantur: si tamen libeat, aromatizantur gratiore quodam Aromate vel pulvere ad ℥j pro dosibus singulis. ND

Potiones Corroborantes nonnulli etiam Julepos vocant: de quibus pag: Viced.

Serapia vel Syzupos esse Arabum in cypta appellatio ipsa barbara satis manifesta ostendit: veteres Graeci vix movebantur. Et autem Syzupus medicamentum liquidum in corpore stans decocto vel succo aliquo, mello aut saccharo conditum, et percoctum in eam consistentiam, uti extracta guttula atque refrigerata non amplius periclitatur, sed diluti nullis crassitudine induere potest ad humores quosvis alterandos, vel etiam expurgandos institutum. ND

78a

Syzupii Magistralis

ex Decto, Soli formula

℞. Rad. Herb. etc. si. Dectio in talis liq: q:
 de colatura capis, in qua dissolvit etc.
 si. Syzupii pfecti coctus, clarificatus
 & aromatizatus cibus. etc.
 reponat in ampulla vitrea, in loco frigido
 de quo capit etc. cum etc. toties in die
 vel hebdomada.

ex Succo eozß vel

Soli, ℞. Succorum depuratorum etc.
 in quibus dissolvit, etc.
 A. Syzupii, etc. in supra

Quando alia in eo decoquantur vel infunduntur

℞. Succorum depuratorum etc, in quibus
 vel decoquit, vel infunde, etc.
 de colatura capis, etc. ut supra.

plendas idonei.

Idco nunquam aut rarissimo Syrupi magistralis alteratis prescribunt, sed solum officinalis usurpantur: idq; dupliciter, vel enim in alijs liquoribus dissolventur, vel soli & p̄ se exhibentur.

Quomodo in alijs liquoribus dissolvantur, supra monstratum est in Apocremate, Potione & Julipo.

Sed praeterea dissolvi solent nonnulli Syrupi in Aq; cori vel Pti sana ad refrigerandam sitim: talis sunt Syr: de Capill: Vener: de Limonib; & Cydoniorum in Alvi fluxu, & solent

prescribi hac formula. ℞ Syr: (v. g. Capillor: ♀) ℥iij. utatur cum Aqua potabili sitis tempore, extra partem.

Soli & p̄ se exhibentur in Affectib; Ventriculi & Pulmonum potissimum.

In Imbecillitate Ventriculi frequentissimus est Syr: de Absynthio, qui mandatur exhibetur p̄ se hac formula,

℞ Syr: de Absynth: ℥j. Cap. mane dū abis horis ante partum, continuando p̄ triduum.

In affectibus Pulmonum prescribuntur Beebici Syrupi, hac formula.

℞ Syr: de Thsilagin: (v. g.) ℥iij. utatur frequent ex cochleari sensu labendo

Alterans Magistralis constat Deco alicujus, vel Sacci alteratis & Sacchari vel Mellis in coligore dissoluti ℞ .ss. aq; (℥iij ad iij) Sin Sacci acidi, Sacchari dosi duplicis. Si Syrupus etiam officinalis in liquoribus dissolvatur, Sacchari dosi minime ad q. s.

℞ Agricata ac

CAP: VII.

de SYRUPDO PURGANTE magistrali.

Syrupus Magistralis eodem modo componitur, quo Apocema purgans, et ex ead:

ex eadem materia, pariq[ue] simplicius
alterantium dosi; purgantia vero
dupla ferè Apozematis q[ua]ntitate prescri-
buntur cum suis correctivis dupla etiã
dosi.

Intcedum efficacissimi componentib[us]
Syrupi ex succis Herbarum & Feruntium
depuratis, in quibus purgantia insun-
dunt & decoquant, & illi succi ad t[ri]ss[is]
vel vj prescribi solent, propterea quod
decoctione & infusione Cathartico[rum]
plurimum absunt. Decoctio fieri
solet ad t[ri]ss[is] vel t[ri]ss[is]. & in ea dissolvit[ur]
sacchari quantitate circiter Deccto pari.

Ut recte decoctum prescribatur, tot
esse debent doses purgantium, quot sunt
Decocti ℥^{ss}. Et Deccto tantum additur
Sacchari, quot sunt Deccto ℥^{ss}. Postea
hæc ad consistentiam Syrupi coquantur,
& usû observatum est, ut vj. pars in
decoquendo evanescat. Ita ut ℞. ex
Decocti ℥^{ss}, & tantundem Sacchari,
restent ℥^{xx}. & cum tot sint doses
purgantium, quot erant decocti. Re-
quiritur quod Syrupi ℥^{ss} pro dosi sit
prescribenda.

Intcedum Syrupi dissolvunt pur-
gantes vel alterantes ad ℥^v. vel vj.
& tunc Sacchari q[ua]ntas minuitur ad
q[ua]ntitatem Syrupi proportionata, quia
Syrupus pro Saccharo habetur dissoluto.

Aliquando succi dissolvuntur ad ℥^{vj}.
vel vj. quando in Agi Simplici facta
fuit decoctio, & tunc nulli Syrupi
dissolvi debent, sed solum Saccharum,

Nonnunquam in affectib[us] Pulmonum

frig:

frigidis, Mellis aliqua portio cum Saccharo conjungitur, sed valde raro; postea coquitur in Syriacum, qui in hunc asseruatur.

Dosis est ab ℥iij ad ℥v. pro majori aut minore efficacia Syriaci, idq; semel aut bis in mense.

Sumitur tandem cum jussulo cum herbis convenientibus alterato. Vel in melancholicis cum Sero lactis aut dicto flosum & fructuum cordialium.

Ina omnia hac formula prescribi solent. ℞. ℞. si. decoctio ad ℥ij. in qua dissolvat Sacchari albis: ℥ij. si. Syriacus pectus colatus, clarificatus & aromatizatus cum ℥ij. (v. g. Cinnamon), qui servetur in vase vitreo, de quo cap. ℥iij. vel ℥iv. bis in mense, cum jussulo (v. g. Fol: Borag: Agglo: Capill: ventr: & Scabiops) alterato.

Si ex sacris si. Syriacus, hac formula prescribitur. ℞. Saccoz: diphazator: etc. In quibus decoque Fol: Senna. etc.

vel ℥v. prout fuerit purgatorius, & habita. ratione aetatis, sexus, etc. cum Sero lactis, vel jussulo pelli cum fol: Acetosa, Borag: etc. alterato.

Utilitas, in morbis Acrio-
nicis, etc. 440.
et Morbi:

CAP: VIII.
de VOMITORYS.

Vomitoriozum compositio tam varia et multiplex est, ut quæ certas eorum componendorum regulas proponere valiamus, sed varia eorum formula ex varijs authoribus erant mutanda. Principia tamen sequentes esse solent, quæ ex triplici vomitoriozum genere, scilicet altiorum, mediocrium, & vehementiorum desumuntur.

Mitiora

Vitiosa fieri solent ex Aq: tepida
 Ervii cum Mii, vel Butyri ℥ij. vel
 ex Aq: Hord: tepida, aut jussu valde
 pinguis bene hausti. Vel ex
 Rad: Peponis ℥j. contusa et infusa in
 Ervii Aq: Hord: vel Hydromelitis. Vel
 ex Decoctione Sem: Atriplicis ℥β. Floe
 Anethi ℥j. ad Ervii dissolvendo Oxy mel
 Simplicia, vel Syr: acetos: ℥ij.

Ufus horum omnium hac scribitur
 formula. ℥. et. Si vomitorium, qd
 sumatur tepide, deinde post ambula-
 tionem paucam indatur digitis in fimo,
 aut perna oleo intincta Vomitus proicitur.

Mediocria fieri possunt, ex Rad:
 Raphani ℥j. Agacii ℥β. coctis in Ex
 Aq: Hord: addendo Oxy melit: Scillitic:
 ℥ij. Si crassa Pituita luxuriat. vel
 Syr: acetos: simpl: si Bilis exsiccatur.
 Vel ex Rad: Asari ℥ij. Sem: Urticae ℥β.
 Fl: Genista ℥β. coctis in Ervii Hydro
 melitis. Vel ex Rad: Asari ℥β.
 ℥β. in Aq: Hysopi aut mentha dispo-
 nita.

Vehementiora fiunt ex Vitrioli albi
 preparat: ℥β. aut ℥ij. in sicculo dissolu-
 Vel ex Coaco Metalloz: alias Hepaz
 Antimony appellat a ℥j. ad ℥β. infuso
 in vini albi vel Aq: Cardii Benedicti
 ℥ij. cum poco Cinnamono.

CAP. IX.
 de EMULSIONE.

NO.

Emulsio est medicamentum consistens,
 ex materia fluidissima et tenuissima quae
 cumdam solidiorum contusa, aqua
 affusione iuxta lactis emulsioem;
 huius nomen.

Emulsio

82^a
Petrius, quoniam ciuitas affatim danda, et
tepidula asphalmenica sunt.

— 82^a —

fiunt emulsiōes hoc modo,
 Contunduntur semina in Mortario aëreo,
 deinde in mortario q̄. gussiferae, antipis
 affunditur liquor cephalicus, seu Dictam. seu
 Aqua Stib. et colantur, ~~per~~ vinū dulcorant.

Op. Sem. Tr. fig. major. @ ʒiʒ.
 Portulacae,
 Lactucar, @ ʒi.
 causticis: confusa fi. Emulsiō cum Aq. Capill. P, Portul.
 contunduntur ~~in~~ ferro modo, et colantur
 cum emulsiōe gussifera in mortario, deinde
 in membranā

tried-gestutet in des wijfel, dair natu in
 des mortiere gietet dair op ʒet doctum rii
 q̄stüm, vortende onder machoude, daer
 door des Feemyn ḡvoocht, ḡexpri
 onsedt, serra isst dūccandū.

Emulsio fit ex Amygd. dulc. decoctis
 tucatis ad ℥j. ℥jss. ℥j. Sem: frigidior:
 major ℥ss, vel ℥j. Sem: lactica &
 Papav: albi, ubi adsint vigilia, ℥ss.
 Contunduntur omnia et dissolvuntur
 cum Aq: Hordei tris. pro ℥℥ dosibus.
 Et dulcorantur vel Saccharo solo, ad
 ℥℥℥ vel ℥℥℥℥. vel Syr: gratioribus, ut
 Violas, et Capill: Venenis. ℥ss. d.

* Sacchar: album, vel
 Rosatum.
 aliquando sed rarius
 Dulce, vel Manis
 Christi perlatum a
 ℥ss ad ℥℥.

Formula .a. prescribendi talis est.
 Et ex. Contundant in mortario maru
 moreo sensim affundendo Aq: Hordei tris.
 in colatura distillat Syr: violacei
 Capill: Venen: ℥m ℥℥. si. Emulsio
 pro ℥℥ dosibus manu et sero sumendis
 Interdum Nucles Pinci pinctis addunt
 in affectibus Thoracicis.

Aliquando Deco Hordei additis Aq:
 Rosacea ℥j. a qua suaviorum reddit emul
 sionem.

Utilitas. 1491.
 Morcell:

* Fructus sunt Amygdalas dulces oscentis
 excorticatas, Sacchyli, Pistacia,
 Nucles Pinorum mundati (et manu
 lavati in Aq: Violas: etc) ab ℥j
 ad ℥℥.

Semina ut in textu. ad ℥ss.
 Decoctum, vel est Hordei tantum,
 vel Rad: Liquiritia, vel Ptiliano.
 vel Decoctum Hordei, Symplicium,
 Passular: Glyceribizae, Rad: et
 Sem: Althaeae, Malva (in omnium
 et vesica affectibus) ab ℥m ad ℥ss
 Syrupi Violaceus, Xanthoxarinus,
 de Althaea, de Symplicis, vel
 aliis q: Scopolium destinatis attingat.
 Saccharum. ab ℥ss ad ℥℥℥.

vel dicitur
 si. Emulsio, de qua cap: ℥℥℥ cum
 decocto aut infuso pulli, bona idonea
 ad Scopolium. — sed tunc solum
 ℥℥℥℥ decocti pleribant, aliq: facile
 corrumpet ac situm traheret. — NO.

CAP: X.
 de LACTE.

Lac exhibetur Potbificis et Febr
 hecticis consumptis. Reliquis praestat Albu
 minum, ubi refrigerandum et detergendum:
 Caprillum vero ubi nutriendum et refi
 ciendum.

Praescribitur illius usus per mensem
 integrum. Mense mase praesertim,
 corpori prius purgato: et exhibentis die
 prima ℥℥℥ cum Sacchari Rosae, ℥j. au
 gendo singulis diebus ℥j. donec ad ℥℥℥℥
 pervenerit

peruenit, Sacchari quantitatē propor-
tionaliter augendo ad ℥ij. In eadem quan-
tate postmodum persistendo.

Horā assumenda oportet matutina,
iv horis ante cibum, quibus neq̄ dormiat,
neq̄ vehementius sese commoveat.

Formula .a. quā prescribit talis
esse potest. Utatur lacte Asinino ven-
centē ab ubere extracto, per mensem
integrum sumendo, prima die ℥iij. &
Sacch: rosati ℥j. augendo singulis diebus
Lactis quantitatē ℥j. Sacchari ℥ij. donec
peruenit ad Lactis ℥viij. Sacch: ℥ij.
Ubi postmodum subsistat, eandemq̄
quantitatē assumat quotidie, iv
horis mane ante pastum, quibus
neq̄ dormiat, neq̄ sese vehementius
commoveat.

CAP: XII.

De SERO LACTIS.

Serum Lactis etiam prescribitur Verso
tempore per xv dies, aut mense integro.

In eo macerantur per noctē herba
refrigerantes, ut: Fumaria, Cichoria,
Acetosæ, ad mss. vel frequenter Epi-
thymum in Melancholicis ad ℥β. In
quo casu dissolvitur etiam Succus Pom-
redolentium ad ℥j. Dosis est ℥viij. vel
℥vj. mane iv horis ante pastum.

Tali .a. forma prescribitur, et Sero
lactis q. s. bulliat leviter et colatur, et in
ejus ℥j. macerentur per noctem foli: et.
colatur mane, addendo Sacchari albi ℥j.
Capiat mane iv horis ante pastum, sin-
gulis diebus continuando per mensem integro.

CAP: XII.
de DECOCTIS SUDORIFERIS.

Decocta Sudorifica vilgo componi solent ex IV præcipuis Sudorificis, Ligno Guajaco, Sa-sa-frax, Rad: China, et Sal-saparilla: ex quibus dicta tam Sudorifica quam Simpliciter instituentia.

Quantitas Sudorificor: Prescribitur ad ℥iij vel vj. eaq̃ unius tantum vel duorum pro varia ægrotantis dispositione; hac perpetuo observatione, ut Guajacum in frigidioribus naturalis, Rad: China in calidioribus magis conveniat.

Postea infunduntur in ea Aq: fontis quantitate, ut pro singulis ℥ij Sudorificis sint totidem Aqua tb. Infusio. a. fit per xxiv horas supra cineres calidas, Ac tandem decoquantur ad medietatis consumptionem.

Dosis decocti est ℥viij, mane corpus tegendo plus solito, ut facilius sudores eliciantur.

Formula. v. prescribendi talis esse solet.
℥ v. 6. Cassia ligni Guajaci ℥iij. Corticis ejusdem ℥ij. infundantur per xxiv horas in ℥viij Aq: fontis, supra cineres calidas coquantur in vase duplici, lento igne, et sine fumo ad medietatis consumptionem, colentur per manicam Hippocratis; Cola-tura servetur in vase vitæo, de qua Cap: ℥viij singulis diebus, mane corpus tegendo plus solito, ut excitentur sudores, corticem utando per xx aut xxx dierum spatium.

Aliquando pro delicatioribus decoctis Daleo

ad sudores movendos Primum, ℥ij. Sudoriferi Decortici, ℥viij. aquæ aut magis provocabit sudores quam Capis. Bizar. D. 31. videtur et 1323. 1303.

dilcozatiæ Sacchari ℥ij, vel ℥iij &
Cinnamomi ℥ij.

Totum illud tempus, quo ager dēcto
illo sudorifico utitur, Diata appellatur,
propterea quod virtus obstruens valde
exquisita, attenuans & exsiccans, &
pro potu ordinario præscribitur decoctum
secundarium, ex præcis residentia paratur,
quod & Bochetum appellatur.

Illa. a. residentia vel sumitur sola,
vel ut efficacior decoctio evadat, additur
sudorifici recentis ℥j. infunditur per horas
viij in ℥xx Aq: Fontis, coquitur ad
iv. partis consumptionem, dilcozati &
aromatizatur hac formula. ℥ Residentiam
prædictæ decoctionis, infundatur in
℥xx Aq: fontis, supra cineres calidos,
per horas viij coquitur ad iv. partis con-
sumptionem: Coletur per manicam Hippoc:
addendo Sacchari & Cinnamomi q. s. ad
Saporis gratiam. Si Bochetum. Quo
utatur pro potu ordinario, toto diæte
tempore, utendo interea Panis bis cocto
& anisato, Carnibus assis & n̄ elixis,
hericulis montanis, Caryophyllis aut
Cinnamom: transfixis Passulis, Amyg-
dalis tocofactis, nucleis Pinis, &c.

Si diata simplex instituenda sit, in
qua pones sudorifica n̄ exhibentis, sed
virtus tantum exsiccans cum usq̄
Bocheti præscribitur: tunc temporis
componitur Bochetum ex ℥j sudorifici
infusi & decocti in ℥xx Aq: Fontis,
& reliqua eodem modo præstendo, ut
in decocto ex residentia. Hac formula.
℥. V. g. Radicis China in taleosas di-
visa ℥j, infundantur per horas xviij,

in ℥.

¶ xij. etc. si. Rochetum, Quo utatur
pro potu ordinario per spatium xxx
aut xxx diebus, utendo intus Pau
biscocto. etc.

Interdum & bestium secundarium
eodem modo paratur ex recent. Sidorii
ficti ℥ij. rejecta residentia prioris de
coctionis, eius virtus est fere depurata.

In omni diata Sidorifica hoc ob
servandum, alvum fere perpetuo esse
astrictam, quae laxanda est iv. quosq
die injecto Clystera Emollienti: Ac
propterea quia per Sidoris tenuior tan
tum maas vacuatur, coarsior v. remanet,
ideo consuetissimum est viii. die prius
quans medicament. exhibere, abstinendo
tunc temporis ab usu pomis Sidorifica.

CAP. XIII.

de DECOCTO GALLI VETERIS.

Uti patet non raro ejusmodi deco
ctum in morbis chronicis, ut Melan
cholia hypochondriaca, Asthmate, &
Obstructionibus diuturnis. & paratur
duplex, Alterans sc. & Purgans.

Alterans componitur ex eadem maas,
quae fuit proposita in Apozem: alter
& pterea addunt Sidorifica ad ℥ij.

Maxime tamen differunt Prescribendi
modo, nam in hoc decocto Sidorifica se
mina & Feructis prius praescribuntur,
postea ventres Galli Veteris impletur:
postea vero Radices, Folia, & Flores
decocto adduntur Hac formula.

℥ Rad. (China v. G.) ℥ij. Semin: etc.

Contur

80.
Gallus Anserodoni Gallus ueteris & quoniam siccissimus
inducitur. Soli Senae, Epithymo, Caps. Q. Sem. Carthami.
Rad. Polygody, Uguirita, S. Anisi: Form accipiant
semel & iterum, experimentis suis.
Specifica Gallis ueteribus inuget eis carumdi siccissimas,
Pisum si eiusmodi forte addant quoniam peccoralia. H.

contundenda contundant, & miscerant
ant, oia simul, usque impleat ventre
Galli ueteris uiscerati, & antiquam
singulethe chusu & uerberibus fatigati
fl. decoctio in q. s. Aq. Fontis (uel
quando sunt obstructionis, in tribus
partibus Aqua, & una uini albi.)
addendo Radic: Sc. Fel: Sc. Fl: Sc.
Cognantur donec Galli caro ab ossibus
separatur, Colatur dectum & for-
titer exprimatur, serueturq; in uase
uitae, in loco frigido, omni pinguedine
delecta, de quo cap. 2. viii omni
mori per multos dies.

Purgans eodem modo prescribitur,
addendo praedictis purgantia simplicia
eadem dosi, qua in Apozemate pur-
ganti, & illa miscerentur cum his, quibus
ventre Galli ueteris impletur.

Uulgo. a. in hoc Deco. prescribi
solent, Senna, Polypodium, Rhabar-
barum, Cartbarum, Epithymus,
Agaricus, Thobith.

Formula huius decocti talis est.
℞. Sc. Cognantur, donec Galli caro
ab ossibus separatur, de Colatura capi-
tur ℥. qua seruetur in uase uitae,
in loco frigido, omni pinguedine
delecta, de quibus Cap. 2. B. Mani
per quateiduum, singulis mensibus
repetendo.

CAP: xiv.
de Iusculis.

Iuscula duplicia sunt, Alterantia
et u.

et Restaurantia.

Altreantia fiunt ex Herbis con-
venientibus, cum Pullo gallinaceo,
vel jusculo cor, ita ut Herbarum
sint ℞℥. vel ℥℥.

Omnium vulgatissima sunt ju-
scula in febribus biliosis et frigiditate,
et calidis Hepatis intempiebus. Hac
formula. ℞ Fol: Fe. Coquantur
cum Pullo Gallinaceo, et si. Jusculum.
q. Cap. et manū continuando per octo
vel novem dies.

Fiunt etiam interdum in Affectibus
calidis Pectoris ex Thoracis simplicibus
cum Pullo decoctis, quarta tñ parte
Thoracis apozematis, quibus additur
Radix China ad ℥j. ante alia simpli-
cia p̄scribenda.

Sapē etiam usūpantur juscula a-
perientia ex Radicib: Herb: et Seminib:
aperientibus. dicta q̄ntate cum jusculo
communi semi-confecto decoctis.

Restaurantia juscula componuntur
ex Capone pingui excoctato, et
in fistula conciso, qui quidem ponitur
sine ullo liquore in olla vitreata, ac-
curate clausa et obturata, ne quid
exiret; coquantur in B. M. ad p̄tri-
laginem, exprimatur succus, a quo pin-
quedo separatur; servaturque in vase
vitreo et loco frigido ad usum.

Nominquam in jusculis et singulis
adduntur Succo Cardiaci ℥ij. vel ℥iij.
Sacchari tantundem. Et utitur ager vel
per se, vel cum jusculo.

Jusc

In sculo hujus restantatis formula
peculiaris non proponitur, propterea
quod ab his, qui aegro ministrant, pra-
parari solet; & Medici illius componendi
modum recubentis tunc docere solent.

CAP: XV.
de Bolo.

Bolus duplex est, Purgans &
Corroborans.

Purgans fit interdum ex Cassia
sola ad ℥j. qui lenitior tantum est:
vel ex Cassia ℥ss, cum alterius optata
purgantis ℥ij, iii, vel ℥ss. Vel ex
optatis purgantibus, una vel pluribus,
ad ℥ss. ℥ij. vel ℥j. Vex ex optatis
& Electuariis purgantibus ea propor-
tione, ut per se sit major optata
quantitas quam Electuarii, et omnia
simul quantitas ℥j, non excedant.

Formula omnium horum talis E,
& Cv. g. Cassia recenter extracta) etc
cum Saccharo, si Bolus, quem Cap.
mand cum Syr: Capill: & vel alio
convenienti & palato gauto.

Interdum fiunt boli ex Scrobintina
ad ℥ss. ℥ij. vel ℥j. ad hunc dete-
gendos, quae abluuntur vino albo, aut aqua
aliqua aperiente. Quor: formula talis
& Scrobint: Veneta lota, &c. si Boli
qui nebulis involvantur, et ex Cochlenti
cum Syr: Capill: & de recentibus Mone
iv aut v hociis aut prandium, conti-
nuando per triduum.

Bolus

Bolus & Saccharo, quae
vixit una vix capere
magnam ℥ij excedit
p. 110.

Nebulas, h. 25 de 21
aut Obelia, at p. 110
Bela. Omnes, h. 110
m. p. 110.
p. 110.

Bolus corroborans fit ex Confectione alicuius ℥ij vel ℥β. Confectionis ℥β, vel ℥ij. Pulveris ℥i. Hac formula. ℥ et c. cum Sacchari q.s. fi. Bolus, quem cap. manū dū abū horis ante pastum.

Prescribi solet passim Bolus corroborans postmodū purgationis; ad ventriculū aliasq̄ partes corroborandas, quā purgatione molestiam subierunt.

CAP: XVI.

de OPIATA.

Opiata duplex est, Purgans et Corroborans.

Purgans composita ex Opiatis purgantibus Officialibus, Electuariis purgantibus, Pulveribus simplicium purgantium, et Symplo purgante idoneo, hac proportione, ut pro singulis Opiatis ℥ij sint Electuarij ℥ij vel ℥ij. Pulver: Simpl: purgant: ℥i. Interdum fit tantum ex Opiatis et Electuariis, omisis Pulv: simplicibus. Alias ex Opiatis et Pulv: simplicibus tantum, omisis Electuariis. Alias ex solis Opiatis.

Frequenter etiam, ubi benignior facienda est Opiata, Cassia postea Opiatis permiscetur, vel sola, vel et cum Electuariis et Pulveribus purgantibus.

Quantitas vero totius Opiatae ℥ij non excedat.

Electuarium molle generaliter Opiata nominatur, si q̄ Opio constat (cum Sicuti Theriaca et Nitridat: etc) sed quod Opio consistentiam habeat. R. w. b.

Dose:

Electuarium quod fit ex Pulveribus et Melle despumato ℥o. Pulverum partes unam, Mellis partes tres.

Dosis .v. ab ℥β, ad ℥j. per se in
forma boli, vel cum Deco Herbarum
appropriatam, semel in hebdomade
vel bis in mense.

Formula .a. prescribendi talis est.
℥ etc. cum Syr: (Solut: Solutivis. v. g.)
fi. Opiata de qua cap. ℥β. (v. g. per
se). vel dissolvendo in Deco Bora-
ginis, Fumariae, & Cicorij, semel
in septimana, cum custodia & regimine
artis.

Roborans Opiata componitur ex Con-
servis ad ℥j, ℥β, vel ℥ij. Condituris
ad ℥β, ℥j. Confectionibus ad ℥ij, ℥β.
Pulveribus ad ℥ij, ℥β, ℥ij. cum
Syrupo idoneo.

Interdum ad ornatum permiscetur
foliola auræ N.º ij vel iij, & post
pulveris prescribuntur.

Dosis ℥ij vel iij, aut quod for-
quentius ad magnitudinem Castanea,
superbibendo liquorem convenientem.
sc. Aq: Sticti appropriatam, vel Vinus
abbum, vel vinum chabum dilatum.

Quia omnia hac formula prescribi
solent, ℥ etc. cum Syr: etc. fi. Opi-
ata: de qua cap. magnitudo: Castanea
singulis diebus mane & vespere horis ante
prandium, superhabito vini diluti
momento, vel superbibendo parum Aq:
Boraginis. v. g.

Interdum prescribi solet assumenda
ii horis ante cenam: si matutinis horis
aliquid aliud remedium sit assumendum.

92a

CONSERVA.

In Conseruis summissis nullus praescriptus est modus;
assus hodie seruat, ut mani & vesperi micis iuglandis
quantitate exhibentur.

Nimingham cum his miscens Pulveres Aromatici,
& ut cum Saccharo vel Symplo appropriato fit
Mixture, q̄ etiam Conditum dicitur.

922

CAP. XVII.
de CONDITIS.

Conditum eodem modo fit, quo Opiata corroborans, eadem sc: Conseruans, Confection: & Pulverum q̄nto, addendo Sacchari albi, vel Rasacei ad pondus omnium. Hac formula. ℞. Sacch: colat: ad pondus om̄is. Si Conditum auro cooperitum. Quo utatur frequenter p̄ se ex Cochleari, vel dissolvendo in iussulis, vel cum Aq: potabili sitis temporē, extra pastum.

In hoc tantū differt Conditum ab Opiata, quod hæc ad tres partes p̄cipuas corroborandas, vel etiam alterandas prescribitur: Quod vero ad Cordis & Pulmonum affectus tantum usupet.

CAP. XVIII.
de ECLEGMATE seu LOCH.

Eclegmata solis affectibz Thoracis conveniunt, ad hūmorem in Pulmone contentum expectorandum, asperitatis leniendas, Hæmoptysin compescendam &c.

Fiunt passim ex pulveribus Bechicis ad ℞ij vel ℞℞. Sacchari candi, vel p̄nidiati, vel Rasati taberi ad ℞ij. ℞j. Syr: convenientis q. s.

Vel prædictis addi solent frequenter p̄lpa fructuum, sc. Passularum, Ficuum, Jujubarum ad ℞℞.

Multis

Tabellae corroborantes Trinitatem sunt ex Oleis Spigeliae cum Saccharo. sic sit Tabellatum Anisi, Eucalypti, Masis, etc. Milti. etc. in compositione et per Gum. Sacchari Aq: appropriata dissoluiti, ead Tabulati compositionem ead Junctis Olei gum: xv aut xvi ad Si. cum gum: i. tunc per granu balneat. matm ad Gum Sacchari, et Mli.

Tabellae, ut sunt
Rotulae, quae rotundam habent formam.
Morselli (al: Lozengia) quorum enim lingua est forma.

Tabellae Spigeliae Gum: matm vel suspensio in aqua in hunc modum est ad usum.

Multis etiam alijs modis Elegata parari solent, sed minj usitate, quae tamen apud aut heros varios videri possunt.

Sequenti vero formula praescribuntur. ʒ. et. Cum Syr: Et. fi. Loeb. quo utatur sequenti cum baculo Liquiritia sensim lambendo.

habetur in elegmata anni quavis hora: pro Loeb. de Papaveris, quod solum hunc post canit

CAP: XIX.
de TABELLIS.

Tabellae duplices sunt, Purgantes et Corroborantes,

Purgantes in Officinis habent, et nunquam aut rarissime Magistralis praescribuntur.

Roborantes fiunt ex Pulv: Simpl: vel Compositi Et. ʒ. Sacchari, in Aq: appropriata dissoluti Et. ʒ. ʒ. ʒ.

Hae formula praescribuntur.

ʒ. et. H. tabellae ponderis ʒ. ʒ. quae cum unam caput singulis dieb: in horis ante pastum, superbibendo. et. eodem modo ac in Opiata corroborante.

Fiunt etiam frequentes tabellae ad affectus Pulmonum ex Pulverib: appropriatis, eadem methodo.

Foros. ii. Obs. 31. / ad Si Spicieri, Sacchari Et. sic ut ad Et. Pulv: Sacchari velle Et. Sacchari

CAP: XX.
de PILLULIS.

Pillulae duplices sunt, Officinales et Magistralis.

Officinales passim praescribuntur in affectibus feigidis praesertim, et Hyemis temp.

Tabularium

Pandaleon est chestuazij solidi corpus integrum, qd si

- | | | |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| dividat in partib[us] | quadratas, sicut | Tabella. |
| | rotundas, --- | Rotula, seu
Cubicu[m]. |
| | triangulas, --- | Lozenga. |
| | oblongas, --- | Mozelli,
ali[is] manus-
bristi. |

Constant. a. Pulvere, Sacchari
 et liquoris apto: ita qd
 sit ad ℞j. Pulveris ad ℞ij.
 Sacchari ℞ij. liquoris q. s. ad p[re]sentem consistentiam.
 vel etiam Sacchari ℞ij, cum alia plus alia minus Sacchari
 adhibitam.

℞. ij. c.
 (plurim[us] qd quidem ad ℞ij; Roborant: ℞ij,
 aut ℞iij. Pulgant: ℞ij, addit Sacchari ℞i.)

246

tempore, ad partes a ventriculo co-
motas vacuandas.

Basis eorum in Materia medica
fuit proposita.

Formula eas prescribendi talis e-
st. Massa Pitt. etc. malaxata cum
etc. (Aq. vel Sympo Veneto) formata
Pitt. vi vel vii deaurata, quas capiat
post primum somnum.

Si Pitt. infirmiores videant, ad-
dunt Diagridy vel Trochis: de Albā,
dal: gr: iiii, vel v.

Magistralis, qua a Medicis ad
varias indicationes frequentiter com-
poni solent, Usuales etiam vulgo
nuncupant, quia eorum usus fre-
quens esse debet, sc. semel in sept.
vel bis in mensi.

Componuntur ex variis purgan-
tibus, Aloē, Agarico, Turbitis, Her-
mod. Bhabarb: Diagrid: Trochis:
de Albandal. cum coctiovis, omnib;
in pulverem redactis, et Sympo con-
venienti exceptis.

Omnium harum Pitt. basis ferē
Aloē esse solet, et prescribitur stat ad
ʒij vel ʒss. Reliqua vero purgantia
simul sumpta ʒss quātem n̄ excedant.
Correctiva v. ad ʒi. ʒiij. Sympo
quātas non definitur, sed pro tertia
parte totius massae habenda est.

Interdum ad Obstructiones purgan-
tibus admiscet Gummi Ammoniac
vel Bdellium in aceto dissoluta
ad ʒij vel ʒiij.

Dosis

≠ hemorrhoids aquam praefert. succis
et Sympis: quae bis auget. motus, atque
molestia. R. hoc verum esse in
remouenda massa coepta; n̄ vero
in conpunctura. L. W. A.

Dosis pilul. metiendā est pro
purgantium efficacia, ita ut admodum
vehementer purgent, & ʒʒ vel ʒij
non excedant.

Hac. a. formula praescribi solent.
ʒ. Aloes Hepatic. etc. si omnium
pulvis, & cum Syr: (v. g. Rosat: solut)
si. massa pilul. de cuius ʒi formet
pilul. vi. deaurata. Cap. N.º iii
vel iii manu duabus horis ante pra
dium semel in septimana.

CAP: XXI.
de TROCHISCIS.

Trochisci raro praescribuntur a Medi
cis, qui officinalibus sunt contenti,
si quis tamen componere voluerit, id
facile praestabit sumendo pulvres
sua intentioni aptos, ad ʒj vel ii.
et excipiendo liquore conveniente,
aut mucilagine, ex quibus premixti
fi. pasta, et ex illa orbiculi in
umbra exsiccandi.

CAP: XXII,
de PULVERIBUS.

Pulveres ad purgandum, corrobor
andum, & alias intentiones praescribuntur.

Purgantes ex simplicibus gratio
ribus gustu cum correctivis, & sac
charo in delicatioribus. Quorum
Dosis erit metiendā pro purgantium
efficacia.

Sunt

Trochisci, cum his presentat, triti ex Aqua aut Vno, aut alio
 quavis liquore bibendi exhibentur. Nonnunquam autem
 duntaxat, Saccharo, Pichis, Clysteribus, Unguentis, alijsq; hismodi,
 modi commiscents.

Trochiscorum, quae sunt aliorum medicamentorum mixtionem stimulant,
 Dosis est a ℥i ad ℥ii. At si insit Opium, Dosis a ℥j ad ℥ss.

Æly Vestij Trochisci Bechici.

Nota, Moris esse
 apud Pharmacopos
 ut ad ℥i pulveris
 sumant ℥j. Sacchari,
 et sic in his Trochiscis
 sumantur Sacchari ℥ii,
 vel ad minimum ℥ss.

℥. Spec: Diarrios
 Fl: Sulphuris,
 Pulv: Helenij sicut C. ℥ii.
 # Sacchari ℥j.
 Mucilaginis Tragacanthæ q.s.
 forments Trochisci parvi, et
 signentur.

SUPPOSITORIA: 3^a genera. Rhadam. n.

- 1. Levia, q̄ fiunt ex Rad: Bete, Cactis, vel Mercuriali
Lardo, Casto, Styracis h̄m. ex Mellis
// Mellis perunctis.
Sūillo adipis sate consupto.
Flech inversa et Silyzo, adposito Sate
vel ex Mellis et Sate.
- 2. Mediocria, q̄ fiunt, e Vitello Bos, Ceco, Sate et Mellis
vel ex Mellis et Sate.
- 3. Vehementiora, q̄ accipiunt. Scamoniū, Euphorbiū
Elleborū, et ejusmodi pilulotū

SUPPOSITORIA utriusq; acuminata Prescribere solet
Heucrius sūm patre, tūm filius, ut mellis a
Mynctorys sūgēris, et r̄q̄m̄ excludētis
q̄ excedentia quantitas minimi digiti, onq; uti multo
causa. // debet. a. argri v̄s̄is s̄ingua d̄est, ne ad latera
quare hoc in Apocryxa. // illud.

2^a Spec: Huxa Giss, Troch: Alband: et Drage: Co
fi. cūm mellis mercurialato et Sate Gēntue
poria N.º 4. utriusq; acuminata, parva
digiti magnitudinē. [340.]

mel mēm̄. i. albatū. 152
 mel d̄estis. sūm sūm
 Mercurialis.

Serviuntur .a. illi pulveres cum
jusculo vel alio liquore dissoluti,
manu cum custodia & regimine actis.

Inter pulveres roborantes sequen-
tissimi sunt Stomachici, qui vulgo
digestivi appellantur, fiuntque ex Sto-
machicis suavioribus, ut Coriandae,
Aniso, Feniculo, Cinnamomo, etc.
ad ℥ij cum Saccharo aequali, vel du-
pla quantitate. Hac formula. ℥. et.
Sacchari albi ad pondus omnium (vel
omnium duplum) m. fi. Pulvis,
de quo Cap. 4. Coctear j. post singulos
partus, nihil insuper bibendo vel edendo.

II. PARTIS SECTIO Secunda.

de Compositione Medicam: Medicinis.

de CAP: 1. ^{scilicet} SUPPOSITORYS. Glandibj.

Suppositoria ad alvum laxandam
vulgo usuepant: Interdum .v. licet ad
modicum casu, ad quosdam Ani & In-
testini recti affectus.

Alvum laxantia componi solent
ex Melle ad ℥j cocto & indurato, additis
pulveribus idoneis ad ℥j. vel dim.

Pulveres .a. illi sunt, Sal. Eoe, Hiera pic-
cea; vel ubi fortius est agendum, Sal.
Gemmemm, Ammoniac, Hiera, Diacolo-
cynth; Helleborus pulverizatus.

Formula eor: talis ℥. et. fi. Sup-
positoria; quorum unum Oleo vel Butyro
illitum imittat in anum, quoties opus erit.

vel coctis ad spiritum thalictum in coctis ut
digitis attractis, tunc admiscens pulvere.
Hinc Pyramides minimi digiti magnitudinis
fiant, & Oleo scilicet Butyro recentis illintur.
Sensat: tunc: 1292.

CAP: II.
de CLYSTERE.

Clysters alij sunt mollientes & laxantes, alij detergentes, alij abstergentes, alij anodynj & ad alias intentionis parati.

Mollientes & laxantes fiunt ex decocto Herbar: emollientium, sc. Malva, Althea, Parietaria, Chamameli, Arthemisia. ad ℥j. vel ℥ss. Opiatis laxantibus ad ℥j. ℥ss (intendim Melle Mercuriali, Rosaceo, aut Violaceo ad ℥ij) ℞: filior: cois, aut Violacei ad ℥ij. Salis cois, aut Gemmei ad ℥j.

Quia vero decoctum emolliens in Officinis paratum heret solet, ideo nunquam prescribitur, sed enunciatur ad solutio.

Hujus ergo Clysteris formula talis est. ℞: decocti cois emollientis Clysteris ℥ss, in qua dissolvat. et. ℞: si. Clyster, qui injiciatur hora commoda.

Detergens Clyster componitur ex decocto Hordei, fuscis: macri, & Rosae: rubr: an P. j. Si simul leniendum sit, ℞: Chamemill: & pliculoti prescribuntur ad P. j. vel ij. Si vero Lumbriici sint eliciendi in Pueris, adduntur Parsula & Ligustia, singul: ad ℥j.

Quantas Decoctionis Clysteris detergentis non excedat ℥j. & in ea dissolvatur Saccharum rubr: ad ℥ij.

vel eius

visu in regionibus non accipiunt alter
~~℥ss~~ ℥j, et Salis ℥ss. v. Neien:
 ℞: x:

Clysters purgantes sicut oleis fieri non
 vult, & sicut cum pinguis retundunt
 anm purgantem.

V. Col. & Cap

Clyster omnis tu requirit.

1. fiquosum. ut Decotum Piscozum, Cicerum, Phelli,
2. Medic: Purgans: quod dant Gallina, Capi, vel aliorum
dum duple doli 2i secundam morbi exigentiam.
adhaerentis.
3. Olea & Pinguedinis. q̄ etiam pro morbi diatesi: anisunt,
4. Salis gummy, ut facultatis excretorias excitent,
ac potest aliquando Mel, Saccharum, aut Bityrium,
aut Vitelli ova: pro exigentia adijcitur.

Coss Clyster: regula. // Iris vel Decot. ℥ij.
Olea: vel Ting: ℥ij vel ℥ij.
Mellis aut Sacchari ℥ij, aut ℥ij.
Vitelli Ova: N^o 4 aut 4.
Salis ℥j.

In Apoplexia cum vis rotatoria admodum debilitata sit, non excedat Clyster, ℥ss, ad ℥v.

2^o Schaevel: etiam ad ℥viii.

at certe Pernam: ℥ss. nimio plus hanc desine supergredis, cum etiam ad ℥ij prescribat.

L. 19. b. Quantitatem Clysteris statuit

- 1^o augendam, si quando etiam alius venire voluit ut in atecrib: ten: intestinor: & renib: dolere.
- 2^o augendam & acendum, cum virtus sopita sit in Apoplexia, coma, letargo.
- 3^o Minuendam, quando Clysteris distinctis ad- huceri volumus.

≠ e
h.

Clyster
ad
ven
quam
cana
pist
non
Clyster
F. 20

vel cum eo mel rosaceum diminuta
Sacchari dosi, dissolvatur etiam Ovi
vitellus x.ºj. pro pueris. ij. vero pro
adultis.

Pueris etiam decocti quantitas minuitur,
ad tñ. vel quart. ij.

Adstringentes Clysters fiunt ex
decoctione Simpl: adstringentium, dosi
Apozematis paullo minori, et in decocti
tñ. dissolvitur Saccharum, Mel Rosat:
et vitelli Ovorum dosi predicta.

practica Symp. Succi, vel Olio ad
stringentia, ut: Myrtin: Citonios: & .19.º.

Anodynus Clysters fiunt ex lacte
Caprillo, aut Ovillo, vel decocto Capitis
et Intestinos: vervecis, ad tñ. dis-
soluendo Sacchar: et vitellos Ovorum
dicta qnto.

Interdum in gravissimis doloribus
intestinarum aut partium adjacentium,
(Acum v.º.) dissolvitur, Philonium
Romanum ad ʒj vel ʒij, aut Laudan-
ium Opiaticum ad gr: viij vel ʒß.

¶ Fiunt etiam interdum Clysters
nutrientes ex jusculo, saccharo, et vitellis
ovorum, quibus aliquando ad corroboran-
dum dissolvitur Confection: Alchemis,
et de Hyacinthide ʒij.

Ad Colicum dolorum praescribuntur
Clysters carminantes ex decoct: simplic:
Flatibus discentientium, quibus sunt ea,
qua Pittuitam attenuant, eodem modo,
ut diximus in adstringente, dissolvendo
in decocto Ol: Rutaceum, Laurinum,
Anethinum, &c. ad ʒij.

Decocto Clysteris carminativa. ¶. 62.

¶. ¶. 299.
et Ol: Hedera. ¶. 6.
Cari no oleum nimis calidum immittas,
se. n. nova febris attracto.

¶ Vel fiunt Clysters ad eundem scopum,
ex vini generosi et Ol: Nucum,
utraque ʒß.

Ad Cal

¶. ¶. 300.
Clysterem ex Voina pueri et Olio.
¶. ¶. 301.
magnopere extollit

Clysteris injeci possunt saporis tñ, modo
diabulis, talibus, aut v.º. ab eis a cibo abstinet.

illic
v.
lin

olium
ovis
piti

¶ Ceterum istis probatur
¶. 19. l. c. ¶. 345.

Clysmata nimis diu retenta
ad decoctionem pro more
debet, si Syringa, per
quam clysmata injiciuntur,
canalis pedici videtur,
pistillo tum attigato
non modo ab se, et
Clysmata haerentur.
F. Plat: ii. p: 507.

Terebinthina cum difficillime admodum
 decocto Clysteris admiscetur, Vitellum
 addere solent, et liquorem Rulim
 affundunt, quemodo Caduorim Stru-
 bintinae fides dicitur D. 22.
 alioq. sapissimum pharmacopola Vati
 compotis fieri nequeunt.

Ad Calculum Renum expellendum
 fiant Clysteres ex decocto apertentium,
 dissolvendo Olea aperientia ad ℥ij. ℥iij.
 Quorum praecipuum est Ol. Scorpionum,
 additur etiam Terebinthina Vitello
 Ovi dissoluta ad ℥j.

CAP. III.

de INJECTIONIBUS.

Injections in partes varias fieri
 solent, Uterum, Vesicam, Anus, & alia
 as partium cavitatis natura, vel
 morbo factas, et fistulas.

In Uterum fiunt injectiones ad
 mensis movendas, Sordis detergendas,
 Dolorem et inflammationis sedandas,
 et ad multas alias intentiones.

Fiunt. a. huiusmodi injectiones ex
 decocto simplicium idoneorum doxi
 Apozematis paullo minore, fit decocto
 ad ℥j. quae frequenter in Uterum
 injicienda per Syringam, quam Me-
 tricbyten vulgo appellant.

Vel fiunt tales injectiones ex succis
 Herbarum depuratis, vel ex Aquis stantibus.

Et non raro in praedictis liquoribus
 quaedam dissolvunt, ut Symplicia, Eleuthera,
 azia, Trochisci, Pulveres, et similia.

Reliqua vero injectiones eadem
 fere modo praescribuntur, quia tantis
 sicut et praedictae, quia sunt particula-
 ria remedia, ex Praxi particulari
 sunt mutanda.

CAP: IV.
de PESSARIIS.

Pessaria ad varios uteri affectus in illius Cervicem immittuntur, & in Crassioris longiorisq; digiti figuram efformantur, nonnunquam tñ instar globuli effinguntur pro Virginitatibus, ut facilius ab eis admittantur, & vasalia appellantur.

Fiunt. a. Pessaria primo vel ex Unguentis vel Opiatis solis ad ℥j. ℥ij. Stupis mollioribus exceptis, & Panno serico vel linco involutis.

Secundo vel ex Pulveribus idoneis ad ℥j. ℥ij. Mellis cocto exceptis, instar suppositoꝝ, unde pessarium efformatur.

Tertio, vel ex succis Herbar: cotoneæ exceptis ad ℥ij. Quibus pulveris pro arbitrio possunt admisceri, ad ℥β, ℥vj.

Hæc deniq; formula præscribi solent.
℥i. de. fi. Pessarium magnitudinẽ digiti crassioris, quod parvo serico involutum & filo alligatum in Uteri cervicem admittatur.

CAP: V.
de ERHIXIS.

Erhixum est medicamentum liquidum, quod Natibus attractum hinc in mores & cerebro, Pituitam potissimum evacuât, & ad multos etiam narium affectus usurpatur.

figuram habet priores quib; apud Paracelm. xxiii. cap. posttriciis. 91.

aut infusum: expirat quidem pituitam, sed non tam quã in usu tricientis cerebri consistet (ut Apoc. phlegmatis usi) sed quã circa cerebri substantiam, et circum meningis collas quib; et fluitat. Peen: p. 298.

Compo

Compositiue ex Succis Heobachy
 Erubinarum, qui extrahuntur ex Fol:
 contrasoz: m. iij. Cum Vini albi ℥ iij.
 vi. viij. His ad correctionis, Fol: Cepha-
 licor: m. j. Aq: vitæ nonnunquam ad
 penetrandum ℥ j.

Vel ex decocto Simplic: Noncorus,
 desi dimidia Apozematis ad ℥ iij. in
 quo dissoluntur interdum succi ad
 ℥ ij. ℥ iij. Mel compos: vel Syr: ad ℥ j.
 ℥ ij. Pulveris ad ℥ ss. ℥ j.

Hac vero formula prescribi solet,

℥. etc. si. Erubinum, quo utatur
 tepide mane in horis ante pastum,
 ore prius, Aqua repleto: & capite in eam
 vicem reclinato.

Inspirando tam Atroboli

CAP: VI.

de STERNUTATORIS.

Fit etiam Sternutatorium ad Pi-
 nitam e Cerebro eliciendam, & Ce-
 rebrī sopitam facultatem expultrices
 irritandam in Affectibus Comatosi.

Componitur ex Pulveribus recentibus
 acrim, quales sunt, Piper, Pyritibus
 Sem: Straphi, Sem: Staphys agrice,
 Rad: Hellebori albi, Euphorbium.

Quantas horum omnium ℥ ij. non excedat
 quibus addere potes ad Cerebrī defensionem
 Maseram sicca ℥ j.

Adverte Euphorbium esse vehementis-
 simum, nec ultra q: ℥ ij. vel iij. prescribi.

Formula prescribendi talis est.
 ℥. etc. m. si. Pulvis subtilissimus,
 qui pennula insuffletur in naris.

Cap.

Liquorum est una vice infundere
 Sufficit: precedente purgatione univisa.

Estque horum usus in longis Capitis
 morbis, Isertim Epilepsia, Odoratus diffi-
 cultate, nasum obstructione, & sceleris
 vilij autij.

Fi
a

Inspirando, E. Attentis uti tu¹⁰
 zanda immittit.
 ita tu ut prono capite gaudiat,
 pro accipit per B. a. novissis fides,
 orle in fauces accipiat. Plan: 393.
 Serbina minor } si agnat.
 Stenitatoria major }
 v. d. P. P. P. P. P.

1026

VIII.

In APOPHYSEMATIS OILS.

Plini 399. mansi Martini
 Brazim nastazim ciliant
 sicatium, Baccatum Oxia
 acantides, Pyethzi, Staffidi
 agria.

CAP. VII.
de GARGARISMA.

Gargarisma fit ad varios oris & partium adiacentium affectus, com-
ponitur ex becto simpl: dosi Apozematis ad ℥j. In qua dissolvuntur Syr:
convenientes, ad ℥ij. ℥ij.

Quia vero frequentissimè paratur
Gargarisma adstringent: ad fluxiones
expellendas, ideo usitatissimè in his
dissolvuntur, Diamorçm, Dianicm,
Syr: myrtin: et de Ros: siccis. Non
raro et Mel Rosaceum, ubi detergendum.

Fit etiam interdum ex Aq: Stilt:
ad ℥j. dissolvendo Symplos prædictas.

Hac deniq; Formula præscribitur.
¶ Et. si Gargarisma, quo utatur, omni
hora.

CAP. VIII.
de MASTICATORYS. 104
APPLICACIONES.

Masticatorys etiam Pituita
copiose e Cerebro attrahitur: fiunt. a.
vel ex Rad: Pyretici sola in fistula
concreta, et in Aceto macecata.

vel ex multorum simpl: pulverib;
cera exceptis, ut inde Globuli confici-
antur. Illa. a. Simplicia usitatiora.
Rad: Pyretici, Iridis, Rinziber, Sem:
Synapi, Staphys agraria, Piper longum,
Mastix; quibus addunt Cephalica,
Gariophylli, Nux mesobata.

Pulveris. quantas non excedat ℥ß.

Cera

Fit et Gargarisma
ad pituitam e Capite et
alendam ex simplicibus
(q; in masticatorys usitatior)
solatis in Aqua quapiam
capitali
Musticatus in cum
ceram.

quod talia
Gargarisma e Apo-
phtomatibus vitanda-
Catarrhus Throatis,
et Pulmonis affectibus
¶ Gen: 344.

* mand' J' dico, respizate corpus acrib' q'nti excrescentibus, ac postea ab his vnde os est aqua, vel melizato, vel stitima.

Cera quantitas non definitur.

Formula praescribendi talis est.
 ℞ etc. ℞. omnium pulvis, qui cera alba excipiatur, fiant q' plures globuli, quorum unus masticeatur mano primo corpore, sequentibus spicando.

CAP. IX.
 de COLLYRIIS.

Collyria pluribus formis componi solent. sc. vel liquoris forma, vel nimenti, vel Cataplasmatibus.

Usitatissima tamen sunt liquida, quae vero & proprie Collyria appellantur. ~~Cogitatio~~

Componentes ex Aq: Stit' ad ℥ij vel ℥iij. Cui admiscetur pulvis conveniens. v. g. Tithia preparata, Trochisci albi Rhasis, Antimonium lotum, Sarcocolla in Lacte Muliebri mixta ad ℥i. vel ℥iij.

Formula horum praescribendorum talis est. ℞ etc. ℞. Collyrium, q' instilletur in Oculos manu & sero.

Reliqua Collyriorum formulae ex praxi peculiari sunt desumenda, propterea quod exquisitam Aemodionum delictum, & exactam preparationem ac dosin desiderant ob extenuatam partem sensum.

ODORAMENTA.

CALIDA.

FRIGIDA.

Cinnam. Aloes.
Cinnamom.
Macis.
Masticb.
Mylbns.
Nigella.
Panicpvrus.
Gomista.
Majorana.
Garioophylli.
Sadanum.
Lavendula.
Tbis.

Kempbar.
Resa.
Viola.
Santali.
Campbora.
Mandaagosa.

Ol: Violanum.
de Papaver.

Ung: Populeonis.

Melissa.
Coste Citri.

SUFFUMIGIA.

Salvia.
Resuazin.
Macis.
Cinnamom.
Tbis.
Majorana.
Basilicon.
Garioophylli.
Lignum Aloes.
Myrrba.
Masticb.

Trita illa excipiantur liquo-
re, succidantur, aut ignitis
carbonibus insistentur.

Nullo accedente igne Cere-
brum suo dore alterant.

Oleo vel liquor aliquo debita
dijformantur ad liquorem
vel angustia, vel spuma:
si tunc excipiantur liquor.

Ubi horum est ad phlegmum odoris facitundum
perillentia contagia arcenda, tum de
stillationis a capite ad pedes cobibendas,
si nempe naribus admoveantur.

// Item tota cum
odoramentis commo- — vapor per os receptus
Atq; ab eis conserui

Qui gratiora Boma odorifera voluit,
 nec Camphoram, nec alia graviter obstita
 admittant, sed potius Moschum cum
 dimidia Sirethas quantitate. quale Re. 70. b.

Caryodium etiam cum Stybaciis liquida,
 aut olei spica minimum addata, aut
 una enim gutta totam massam corrumpet.

Ponderari etiam plerumque solet Communi
 odoriferum Ziss.

11.^a PARTIS SECTIO Tertia.
de Compositione Medicam: Externar:

CAP: 1.
de EPITHIMATE.

Epithema Cordi & Hepati potissimum admovei solet, ad partes illas alterandas & corroborandas. Et est duplex, Liquidum & Solidum.

Liquidum fit ex Aq: Stitb ad ℥viij vel ℥vj. Succis Lemnium (v. G. Limonium, Granatorum, Pomorum & dolentium) ad ℥ij vel ℥iij. Aceti Rosi ad ℥j. ℞iβ. Pulveris Cardiaci ad ℥ij, vel ℥iij.

Nota, quando prescribuntur Succis Limonium, vel Granatorum, non esse opus Aceto.

Nota etiam, in Epithemate Cordis, si Pulmonis peculiariter sint affecti, acida non esse prescribenda, quia sint Pectori noxia.

Item in Epithemate Hepatis majorem partem Succorum acidorum vel aceti esse prescribendam, quam in Epithemate Cordis.

Interdum prater Pulveris Cardiacos permiscuntur Confectiones Cardiacae, Aloeticas vel de Hyacinto ad ℥j vel ℥ij. & Trochisci de Capryra in Epithemate refrigerante ad ℞β. Crocus in calefaciente. ad gr: v.

Formula prescribendi talis est.
℞. etc. fi. Epithema liquidum applicandum

cordis

cardium regioni Cordis tepide, frequenter cum pannis Scazlatinis hoc liquore imbuitis & expressis.

Solidum Cordi tantum admoveatur, et componitur ex Conseruis Cardiacis ad ℥ij. Confectionibus ad ℥β. Pulveribus ad ℥iβ. ℥ij. Cum Aq: Cardiaca convenienti.

Formula illius talis est, ℥. &c. cum Aq: (Rosaz: v. &c.) fi. Epithema solidum applicandum regioni Cordis, cum pannis scazlatinis.

Solidum hoc Epithema solum non raro prescribitur, ubi major roborandi quam alterandi necessitas apparet. At vero liquidum nunquam usurpatur, quin post usum illius statim solidum admoveatur; ita solent Medici in illo casu liquidum & solidum consequenter prescribere, & in fine formulæ addere. Fi: Epithema solid: applicand: regioni Cordis statim post liquidum.

Ad Epithemata referuntur juniora Animalia per mediam secta, pulvere cardiaco conspersa, & Cordis regioni admota; illa. a. Animalia sunt pullus Columbinus, aut Catellus.

Horum v. prescribendor: formula talis Admoveatur regioni Cordis pullus Columbinus per mediam sectus, & pulvere Electuar: Cv. &c. Diamarg: frig: sinapisals. vel - ℥ Pulv: Diamarg: frig: ℥ij. Sinapisets pullus Columbinus per mediam sectus, Regioni cordis Applicandus.

Interdum eadem animalia sicuti citi raso admoventur, pulvere Cephalice

conspersa ad cerebrum corroboran-
dum.

CAP: II.
de FOMENTO.

Fotus fit in varijs partibus, sed
sequentius in latero ad Dolores Pleu-
riticos, in Ventriculo ad corroborandos,
in Hypochondrijs ad obstructions sol-
vendas.

Pro latero fiunt ex decoctis sim-
plicibus emollientibus, additis anodynis
et resolventibus, quæ omnia dosi Apo-
zomatis hæc præscribunt, hæc formula
¶. Et. fi. omnium decoctio, qua fo-
veatur latus dolens calidè frequenter,
cum vesica scilla hoc decocto semiplena.

Pro Ventriculo præscribunt, sim-
plicia Stomachica dosi Apozomatis mi-
nori: quibus addunt aromata, Gari-
ophylli, Rix moschata, Spica Nardi,
satis magna dosi, sc. singul: ℥ij, ℥ij,
vel ℥β. fi. decoctio in aq: partibus
Aq: fontis, et vini rubri adstringentis
sub finem additi, vel ubi magis ad-
stringendum loco Aq: Fontis, Aqua feti-
rata præscribenda.

Hujus Formula talis est. ¶. Et.
fi. decoctio in aq: partibus. etc. qua
foveatur regio ventriculi calidè, longè
a pastu, duobus sacculis prædictis
simplicibus semiplenis.

Pro Hypochondrijs fit decoctio ex
simplic: aperientibus dosi prædicta,
admixt

admixtis quibusdam emollientibus,
in æq: partibus Aq: Fontis & Vini
albi sub finem additi, dummodo
calida intemperies non impediatur.

Talis est hujus Formulæ. ʒ. ʒ.
ʒi. dectio. etc. quæ fovens Hypo-
chondria calidè sequenter, cum filtris
imbatis & expressis.

Si alterum tantum Hypochondrii
laborat, præscribendum est ut fovens
regio Hepatis, vel Lienis: prout hæc
vel illa pars fuerit affecta, admixtis
in decoct: ʒs simplicibus, quæ partes
illas peculiariter respiciant.

CAP: III.

de BALNEO.

Balnea parari solent ad multas
intentiones, sc. ad refrigerandum &
humectandum, mensis movendos,
conceptum juvandam, & ad externos
affectus, Scabiem & Elephantiasis.

Composita ex Rad: iii. iv. vel v.
an lbj. lbjß. Herbis v. vi. vel vii.
Singular: sc. j. Sem: a lbß ad lbj.
Fruct: a lbj. ad lbjß. Florib: Mij. iijj.

Formulæ præscribendi talis est:
ʒ. ʒ. ʒi. dectio pro Balneo, quod
ingrediatur tepide sine sudore, bis in
die, per biduum aut triduum.

CAP: IV.

de SEMICUPIO.

Semicu

Semicapitum nihil aliud est, q̄
dimidium Balneum, quo immergitur
ager umbilico tenus.

Componitur ex iisdem Balni
simplicibus; sed dimidia tantum dosi,
& sequenti formula prescribitur,
¶. etc. si. Decoctio pro Semicapito,
cui ager insideat a Genibus usq̄ ad
Umbilicum, mane & vespere longo
a partu, p̄t̄ biduum aut triduum,
vel urgente necessitate, si ad dolores
sedandos prescribat̄.

CAP. V.
de OLEIS.

Olea rarissime componuntur a
Medicis, quia in officinis ad oēs ferè
intentiones parata habent, si quis tantis
artificialem Olea componendi rationis
desiderat, ita procediat. Primo
prescribat̄ Olei cor̄ vel officinalis
unius vel plurium (lib. v. G.) Simol.
pulverizat: q̄. Succo, vini, vel alterius
liquoris ad Scopum facientis q̄. q̄.
Coquantur ad succorum consumptionem,
fortiter exprimantur, fiatq̄ Oleum
usui reservandum.

Si Olea officinalia sola, ut ferè
quenter fit, prescribentur: sive a Medico
seorsim componantur talis erit formula.
¶. etc. m. Inungatur talis pars ca
lida vel tepida, admotis linteis tepis
dissensilis. Vel ¶. etc. m. si. Em
brochiatio, supra talis partis admotis, etc.

CAP: VI.
de LINIMENTIS.

Linimenta vulgo fiunt ex Oleis
Officinalibus cum Axungijs, Butyro,
Medullis aut Mucilaginis, ea pro
portione, ut sit Oleo: q̄ntas reliquorum
dupla, unde Linimenti consistentia
emergit, quia est media inter Oleum
et Unguentum.

Vel loco Butyri aut axungiarum
cera prescribitur ea q̄nto: ut pro Olei ℥j.
sit cera ℥j. Partem tantus Cera
q̄ntas non definitur, sed prescribitur
in fine Cera q. s.

Interdum Pulveres admissentur ad ℥j.
pro Olei ℥j.

Vel deniq̄ fit Linimentum ex Un-
guentis Officinalibus, cum Oleis dupla
q̄nto, additis etiam pulveribus si habet
proportione dicta.

Q̄ntas Linimenti prescribitur, pro parti-
tis affecta magnitudine, passim tantus
ad ℥ij vel ℥j.

Formula illius talis est. ℥. etc.
fi. Linimentum: quo illinatur pars
affecta calido, admotis lintis cali-
disculis.

CAP: VII.
de UNGUENTIS.

Componuntur vulgo Unguenta ex
Oleis, Pulveribus, et Cera, ea q̄nto
et proportione, ut pro Olei ℥j. sint
Pulv.

Pulver: ℞. ℥ss. - Cera ℥ij. Ut plū-
rimūm tamen Cera q̄ntas non defi-
nitur, sed dicitur. q. s.

Quantitas totius Massa pro
partis inungenda magnitudine &
temporis duritate praescribenda est
ad ℥v. ℥vj. viij.

Formūla vero talis est. ℥. et.
fi. Unguentūm, quō inungats pars
affecta.

Frequentē etiam fiunt Unguenta
efficacissima ex Oleis ad ℥iij, v, ℥ss.
Pulveribus ad ℥ss, vel ℥vj. Succis
dimidia Olee: q̄ntē, vel paulo major
et, ita ut bulliant ad Succorum
consumptionē, addendo postea Cera q. s.
vel aliquando Unguenti Officialis,
ad ℥ss. ℥ij. Cera q. s.

Hujus formūla talis est. ℥. et.
bulliant ad Succorum consumptionē,
expressione facta dissolvat Cera q. s.
fi. Unguentūm.

Nota in praedictis Unguentis sae-
pissimū misceri Pinguēdines, Medūllas,
Butyrūm & Mūcilagine, q̄ pro Olee
sunt habenda: Gummata vera, ut
Ammoniācūm, Bdelliūm et. Cera
locūm obtineat.

Fiunt et Unguenta ex Ung. Officiali
ad ℥ij. Oleis eadem plus minus q̄ntē,
Pulveribus ad ℥ij. ℥ij. Cera q. s.

Vel interdū Unguentūm Officialē
solūm sine ulla additionē praescribitur.

CAP. VIII.
de ENCLASTRIS.

Emplastra vulgo componuntur ex
Oleo, Pulveribus, & Cera: aut ipsa quae
Olei consistentiam ferre habent, ut
Axungia, Medulla, Butyrum, Macei-
lagines; aut ipsa quae Cerae naturam
referunt, ut Gummata, Pix, Resina.

Horum talis est proportio, ut pro
olei ℥j sint Pulveris ℥vj. Cerae ℥jss.

Quantitas totius massa eadem,
quae Unguenti.

Fiunt etiam Emplastra ex Em-
plastris officinalibus ad ℥j. ℥jss. Pul-
veribus ad ℥ss. vel ℥vj. Olea ad ℥j.
Cera q:s. addendo Terebintina parum.

Vel ex solis Emplastris officinalibus
quae parti affectae proportionata.

Formula prescribendi talis est.

℥. etc. fi. Emplastrum, quod extēdat
super alutam & tali parti applicetur.

Nota figuram Emplastri in multis
partibus designari, ut in Sincipite ad
formam litterae T, vel etiam qualis
figura; in ventriculi regione ad for-
mam scuti; Uteri, ad formam lingua
Bovis; uteri rotundum; Remitti
quadratum; In alijs partibus non
definitur, sed dicitur fi. Emplastr:
magnitud: debita.

Emplastra & Unguenta cum Unguentis
distinguitur si differant in se invicem
componant possunt, ita ex Emplastro
Diapalma, seu Diacalcit: Unguentis
faciunt potius, addendo li. Rosae: et simili
dispositio. Contra ex Unguento Dia-
pompolygos (ex Unguenti consistuntia
debet, cum minima coctione in
vase ferulis additis) formant potius Em-
plastrum addendo plus Ceræ, vel olii
si visum, Specierum, et simili liquori
et sic miscendo apto coctione: nisi
ut dicitur adst. In n. regis et
adst.

Diapalm: ^{112a} ?
Diapompol: ? ^{112a} ?

1126

CAP: IX.
de CATAPLASMATE.

Cataplasma vulgo fit ex Radicib⁹,
Folij, & Seminib⁹, & Fructib⁹, doli
Folis, quia decoquunt in liquore ido-
neo, postea contundunt & trajiciunt
per setaceum, addendo Pulv: vel Farin
naz: ℥ij. iij. vel iiii. Oleoz: vel Axun⁹,
giazum ℥ij. ℥iij.

Hac. a. formula prescribi solet,
℥. &c. decoquantur omnia, pistentur
in mortario marmoreo, & per setaceum
trajiciunt, addendo &c. fi. Cataplasma
applicandum parti affecta.

Sapissimum post usum fomenti Ca-
taplasma admoveatur, & ex illius resin-
dentia paratur, quando sc. intentio est
emolliendi, resolvendi, &c. Hac for-
mula. ℥. Residentiam predicti fomenti,
contundatur in mortario, &c.

Interdum fit ex Fructib⁹ sub cine-
ribus coctis, ut in Alvi fluxu & Dy-
sentria ex Cydonijs coctis sub Cine-
ribus, ℞. iij. vel iiii. pro eorum ma-
gitudine, vel coctis ad ℥j. ℥iij.
contusis & trajectis, addendo Pulveris
adstringentis doli dicta, & tantillum
vini Rubri, si lubet.

Fit etiam in alvi fluxu ex cocta
Panis, in vino macezata ad ℥ss. vel
quart: iij. cui addunt Pulveris corro-
borantes & adstringentes ad ℥j. ℥iij.

Vel

at in inflāmati oculū. cum albūm. Ovi.
 & Aq. Rosac. oleū. n. oculū. n. ferr.

Vel ad dolorē sedandū in in-
 flammationibūs fit Cataplasma de
 Mica panis vulgo dictū, ex mica
 Panis albi in lacte macerata ad lb.
 Vitellis Ovi n.º ij. Cerei zj. Non
 nunquam Ol. Rosac: q. s.

al: vide apud Foetus T. 6.

CAP: X.
 de VESICATORIO.

Vesicatoriū duplex est, Officinale
 & Magistrale.

In Officinis habetur Emplastrū
 Vesicatoriū, quod frequentissimū præ-
 scribitur a Medicis hac formula.

¶ Massa Emplastro: Vesicatorij ℥j. Zib.
 extendatur supra alūtam. si Emplastro
 Magnitud: volæ manūs applicand: postea
 vtrū parti cervicis, vel alteri parti,
 si opus fuerit.

Magistrale præscribitur ex fermenti
 acioris ℥j. Cantarid: pulverizat. ℥ij.
 cum aceto Rosaceo fit Cataplasma ve-
 sicatoriū.

Interdū ad affectūs oculorū vel
 dentium applicants Vesicatoria ponū-
 aūt in formam semilūna, hac formula
 ¶ Massa Emplastro Vesicatorij ℥j. fer-
 mentū dno Emplastro ad formam se-
 milūna, applicanda ponū utraq; alūtam.

CAP: XI.
 de SACCULIS.

Sacculi duobus potissimū interu-
 tionibūs præscribi solent, vel sc. ad
 hūmorū

hūmorem frigidū, crassū & impu-
rū in aliqua parte resolvendū,
ūt in Capite frequenter per diatas
sudorificas tales sacculi adhibentur
post assumptam sudorificam potionē.
vel ad roborandū Cor præsertim &
ventriculū.

Resolventes sacculi fiunt utrius-
q; vim ex Mellis ad ℥j. Salē cori,
ad ℥ss. Sem: discutientibus, ut Anisi,
Feniculi, Fenugraci, Baccis Laici ad
℥ss, ℥viii.

Illi autem hac formula præscribun-
tur, &c. Torrefiant in Sartagine
sensim affundendo vini generosi q. s.
inclūdantur duobus sacculis, qui vi u-
cissim calentes applicentur, Aq. Vita
prius iezorati.

Roborantes fiunt ex Pulver: Rad:
Liq: Cortic: & Aromat: ad ℥ij. ℥ss.
quibus aliquando Pulv: Cyperi aut
Violaceus adiungitur ad ℥ss. Moschō,
Ambrā, ad q̄: ℥ij. vj. ℥ss.

Hac autem formula præscribi solent
&c. si. omnium pulvis, q̄ exipiat
Cotonē moschato, & cum panno serico
eubo interposito si. Sacculus, qui
collo appensus supra regionem Cordis
vel Stomachi.

CAP: XII.

de CUCURBITA.

Sacculos roborantes amulatū
Cucurbita cerebro roborando & calidū
faciendo dicata. Fit ex Cephalicis,
magis

magis odoratis: Nemp^o Radicibz ad
℥i. Folyis ad ℥iij. Floribz ad
℥ij. ℥ij. Aromatib: ad ℥℞. Quibus
addi possunt Pulvis Violac: aut Cyn
prius ad ℥℞. Storax, Benjūm, ad
℥j. ℥ij. Moschus ad ℥℞.

Formūla autem talis est. ℥. et
℥i. Pulvis, qui excipiat^r cotone Masu
chato, & cum panno serico int^rspūdo,
℥i. Cūcupha supra caput gestanda, vel
pīlto assūenda.

Aliquando duā prescribunt^r Cū
cupha, una interdū altera de nocte
gestanda, & tūc Pulver^r q̄tas est duā
plicanda; atq̄ ita prescribunt^r.
Fi. duā cūcupha, quarū una pīlto
assūatur, altera de nocte gestet^r.

CAD: XIII.
de FRONTALI.

Admōvet^r sēq̄nter frontale ad
Capitis dolorem sedandū & somnū
conciandū, ex Sem: iv frigid: major:
Lactū: & Papaver: alid ℥℞. vel ℥vij.
Floribz Rosarū, violarū, & Nymphae
ad ℥ij. Addunt^r sepe ad robū
Grana Obaces ad ℥℞. vel Pulvis tūis
Santal: ad ℥i. Interdū Florū
Camamelī & Meliloti an P. B. Quī
dolorem sedant, nec valde calefaciunt.

Formūla horū talis est. ℥.
et. ℥i. si omnium Pulvis crassior, qui
includat^r duobus pannis lincis, &
vapore aceti innotatis fronti applicet^r.
hora

† quia tantis pulveribus
℥ij includere non poterit,
℥. ℞. d.

hora somni.

Fit etiam frontale forma hūmida,
quā ad Oxycodini naturam accedit,
& intentius refrigerat ac somnū
conciat in Phreniticis & Febribꝯ
ardentibus, aut diuturnis Vigilijs.

Componitur ex Unguento Populeo
ad ℥j. Oleo Rosaceo ad ℥β. Parti
dimidia albuminis unius Ovi, adu-
dendo parūm Aceti Rosacei. Hac
formula. ℥ ℞. Agitans omnia
simul & excipians Scapis Cannæ
binis, ac Fronti applicens duobꝯ
linteris inclusa.

Adduntur aliquando Conserua
Rosarūm, Violarūm ad ℥β, vel ℥vj.

FINIS.

viii^o Cal: April.

1627.

The first part of the book is devoted to a history of the
 country, and a description of the various parts of it.
 The second part contains a list of the principal
 towns, and a description of the manners and customs
 of the people. The third part is a collection of
 the most remarkable events which have happened
 in the country, and a description of the
 various parts of it. The fourth part is a
 collection of the most remarkable events which
 have happened in the country, and a description
 of the various parts of it. The fifth part is
 a collection of the most remarkable events which
 have happened in the country, and a description
 of the various parts of it.

118

Alterantium

- Temperatorum dosis, a ℥i ad ℥ii.
- Intemperatorum, in gradū primo, dosis, a ℥β ad ℥ij.
- Secundo, dosis, a ℥j ad ℥β.
- Tertio, dosis, a ℥β ad ℥ii.
- quarto, dosis, a gr:ij ad ℥i, // ℥β.


Purgantium

Gravis sunt terti & quarti gradus magis coedunt a nra nra adeoq̄ minus dosi exhibenda, & peccata exalio nitatur adiunctum habent (at Opus) minus

- | | | | | |
|------------------|---|----------------------------------|------------------------------|----------------------|
| Primi mansione | { | 1. — ab ℥i. ad ℥ii. // ℥m. | — Syr: Rosar: Solit: ma | |
| | | 2. — ab ℥ij. ad ℥iij. | — Sac: Ros: — Mel: Ros: Sol: | |
| | | 3. — ab ℥iij. ad ℥iij. // ℥iijβ. | — Manna. | |
| Secundi mansione | { | 1. — ab ℥β. ad ℥iβ. | // ℥ii. | — cassia, Tamacindi. |
| | | 2. — ab ℥β. ad ℥iβ. | | |
| | | 3. — ab ℥β. ad ℥i. | | |
| Terti mansione | { | 1. — a ℥i. ad ℥β. | — Myrob: Citri, Rhabarbari | |
| | | 2. — a ℥ii. ad ℥ij. | — Agaricus, Mebeacis. | |
| | | 3. — a ℥β. ad ℥i. | — Aloe, Senna, Polypos: | |
| Quarti mansione | { | 1. — a gr: x. ad ℥β. | — Trinit: Hermodact: | |
| | | 2. — a gr: v. ad xv. | — Lapi: Aemen: Sazali | |
| | | 3. — a gr: ii. ad x. | — Opoponax, Sagapin: | |

Elleborus niger.

- Colocynth:
- Scammon:
- Euphorb: Esula.



Fecoprotica.

120a

Malva. mercenialis.

Pota. Brassica. Blitum.

Atroplex. Asparagus. Parsifla.

Peena dulcia. Sebasten.

Cassia. Manna. Tamazindi.

Ol: Amygd: dule: Ficus ping: recta:

Mala pinguis. Iuxa pinguis. {galli } impotens.

Serum lactis, imp: Caprinum.

INDURANTIA Gal: F. de simpl: med: facult: co. p. ut

Sicca, & Humida (ac frigida)

qualia Sempervivum, Gortilaca, Psyllium,
Lenticula palustris Solanum.

LAXANTIA, calida. i. aut o. humectantia 2. abeg:

062 & leptomercia.

qualia. | Liliūm. Semibulmi, Farnigraei,
Adipes. Butyrum, Ol: Chamamel:
Celyphus, & similia.

RAREFACIENTIA

moderate calida, leptomercia, & minime siccantia.

Althaea, mercenialis, pntibum.

Ol: Chamamelis, Meliloti, Sumbaci,

Sem: Farnigraei, Lini.

Ficus asine.

Ol: vetustius. Butyrum.

CONDENSANTIA.

Aqua lustrar frigida, sed omnino astringentia

Aqua frigida.

Gortilaca, Sempervivum, Psyllium, Myosotis,

Tribulus asinis, Lenticula palustris.

Serum majus
minus.

Myzobalana w.

Cebula	Pittitay	} erat clat.
Citaina	Pittem	
Juda scariqua	— onelanchol	
Emblia		

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

First main paragraph of faint, illegible text.

Second main paragraph of faint, illegible text.

Third main paragraph of faint, illegible text.

Final paragraph of faint, illegible text at the bottom of the page.

Oleum cum Praelo exprimendi modis.

Jos. Bapt. Porta. in Oleorum pretiosorum expressio-
nis hanc (quibus sunt Moschi, Ambaris, Zibetis) hoc
utiliter organo.

Fiat aenea colummilla altitudinis semipedalis, intus
inanis, palmaris diametri, crebris circumcirca foras
minutis perforata, cili lata fidelia supponitur labris cir-
cum cum auidiq; crectis etidem aenea, cum suo canaliculo.

Repletur turriculis rerum exprimendarum, supra im-
ponitur ligneus modiolus, nix robusto torculo ꝑ fortissimam
manu constringitur, e foraminulis Oleum effluet in fidelias,
& per canalem elicitur. Sed prius turricula
& lamina ferrea calefiant, donec digitorum tactum
vix ferant: ut liberius Oleum eliciatur.


Mesues in Oleo Laticio, meminit Torcularis plani et
cavi. Utroq; tamen torculari commodius est praelum
Bibliopegorum: atq; adeo jam in usu frequentissimum:

Amygdalas igitur probe tritas cilio ex seta equina
contexto involutas, assicla etiam calefacta utrimq;
q; minuit, post dicto praelo tradunt, contrahunt
praelum et firmant, exprimuntq; Oleum in Vas sub-
jectum.

N. Worm.

Confectiones Aromaticae Ambaris, Moschum, Gallias,
vel etiam Camphoram accipientes, etiam sine his odoratis
in usum mulierum hystericarum fragrantemq; horum
odorem non ferentium, commode parari possunt: Sicq;
in Pharmacopoeis et cum his, et sine his duplici modo
acquiescunt. Rügistan:

Liquores destituti mitia commixtionis in
suis seri lactis turbidi reddunt; sed lact
sunt affuso oleo ¶.



Handwritten text in a cursive script, possibly a signature or a date, located in the lower right quadrant of the page. The text is written in dark ink and is somewhat faded and difficult to decipher. It appears to consist of several lines of cursive handwriting.

125

Lapis Dūmex admodū aptus ad detergendū
et pelliculā pergamentū, coriū,
adū ut quidam inscripta pergamentū hoc ipso
lapide delcant: nonnulli etiam barbā
inordinato loco prædicatū tradant
als. Fr. in m. in. z. b. in. by. 12. 100. mastichs.

Terrebinthinam si lares, uoli confusim Aquam
requisitam affundere, sed sensim & inter
ualla palliūm, assidue spatula agitanda.

Masticos & Bdellium cū a quibusdam
pillulis (v. G. Cochys) abesse dicit Galen.
v. Ret. 624.

Muccilagines ut ex Sem. Cycloniorum,
et Sira: Pylly extrahant, hoc in
tegnū maniat, illud uero contundat.
Namq; Pyllyū in intima subst. nūc
calat: adhuc difficulte admodū contū
ditur, qūo fit ut in compositione Requiri
Nicolai hoc solum, & separatim a ceteris
speciebus contūdi debeat.

Lac ubi Cataplasmatibus additū ad sedandas
doloris, coqui non uult. Fuchs: exerc. p. 43.

Clarificatio fit hoc modo. Præm. vel

Ovi albumen seorsim conquisitum, hinc in spiritum
abcat, affundit sensim (agitando) Decoctio aut Symplicia
clarificandis; simul bulliant, et despinunt; vel
potius calidi & parum in angulis firmationem con-
lent. Contingit tamen, ut herba alia
cujus natura, aut alia accidens clarificationem
impediat: quomodo vix inquam id visum est
si aliqua acidula, ut Siccus Limonium, aut illi
affundunt, hinc n. partes Bettoogines magis sequuntur
la Cœlæ.

Ab. Pulvisdem partibus clarificatio per digestio-
nem in S. M. tepido & hocas xxv. v.
Sennæ: int: 1/2. Sic succi depu-
rati optimo fitur. U. 1204.
& p. omnium haurant.

Infusio si fiat, affundit liquor (Sed p. scilicet p. p.
Sena. Sennæ, seu decoctum eligios) parum succi
Limonium. sic multo melius ex Sena, Rhubarb.
baro, &c. extrahit eis purgens.

Non. la Cœlæ. plurimam infusio in factas
hoc modo. Sp. Fil: Sena, & S. Sena:
Anisi parum, bulliant simul in liquoris alicujus
S. q. () colatura & in infundit Rhubarb:
Zib. Cennam. aut Scamantibi parum ()
stent in infusione (ep. & conf. & totas noctes
si a. infusio liquor non sufficit, affundit
diis man. aut vesp. aliqd. ped. de Senna.

Gammata na, Arabic: Tragacanth: &c.
si gando pulverisanda esset, in Hyeme expellat
solent.


At vtro multo melius etiam vitatis pulverem
optimo rediges in Mortario calido (q. sic f.
factum in eo existimatis) cum pistillo vitanti,
& p. a cinibus bene expurgatis cum sine
& Cannibus. la Cœlæ.

Nota quod Apozinata accipientia Be-
tonicum siccam semp nigra sint

Vix pro Emplastis satis bene liquari
non potest, nisi aliqd. Aqua ad miscetur.
l. H. ad morb. part. p. 40. v.



122
ad retrah: Hepar. For: 11. 115. 27/210.

ad  figuram fiat.

q̄m̄ n̄ alio t̄tus est̄, ac p̄v̄id̄
alīam sub̄iungit, per Coad̄.

Sacculus, ad resorpi: Hepar. Fos: II. No. 27 ^{152a} / 150.

ad  figuram fiat,

q^uia in alio tubu est^o sicut, ac primum
altum subiungit, pro Cordi.

1326

97. Suppositoria] officin: Balani,
Glandes, Bella, Stoeck-pills,
& suppositoria.

98. Masticatoria] Apopblegmatismi.
Commansa lat.

99. Clyster] officin: Enema, influxa,
Ibi in Ægyptia inventum. id qd
Clysteris injicit. H. J. J.

100. Clyster, Clysterium, instrumentum
ipsium, quo alvus cluitur. B. Custerio,
G. Clistere.

Clyster Urethralis Celso. G. Corporeis,
coespitibus. G. Syringis.

101. Collyria] qm proprie liquida sunt,
easq; instatissima. B. Colly-
riis dici possunt.

102. Pessarium] officin: Pessus Celso
dicuntur. B. Pessarin.

103. Rebinum] ῥεβινον, H. J. J. qd metu
forma nasibus indit.
Nasali Barbaris ῥεβινον.

94. Pilula] a rotunda specie pila
imitat, zozfona, stipp.
Catapotiūm Plini qd Scribonius
describit, medicamentūm qd non
diluitur sed ita, ut est, assumit.
G. Piliis, B. Pillelis, Pillis.

490. 492.

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800


1800

1800

1800











1800


1800



[Faint, illegible text or markings, possibly bleed-through from the reverse side of the page.]

FIGURÆ EMPLEASTRORUM Usualium





p. 110. LINIMENTA] quae Linimenta imponuntur { Renti altiori — minora — }
 { respirati — — media — } te debent.
 { ventriculo, & }
 { ventri obliquo — latiora — }

Præn. p. 03. c.

In qua capiti affunduntur Olea, non cohaerent, quia rotundum est probo
 Sphaericum est, ob id ex alto per mediocrem lancem modum Syncephiti affunduntur.
 Præn. p. 03. c. & Sylvi de medi. univ. int. p. 72. Aqua, succi, Olea, si ex alto
 torrens in modum illidenda sint Syncephiti, unde ad ipsam utile erit, si non sit
 satis rariū, & lanca seu pumca eorum cingere, ne humores illi prompto
 diffundant, reliquosq; corpori moliti sint.

[Clysteris] Ratio varietatem locorum ut attingerent a medicis, varias modis
 dicamentorum formas excogitand fecit. Unde [Pulsi collo utri] —
 Perunim: p. 82. [Baloni recto] } intestinis } inventa sunt.
 [Clysteris crassis] }

In partibus capitis ut aures, nates, os, utrum, &c medicamenta vel impellunt.

Alas, adiacentibus Clysteris, infundunt.

Nares { flati per tubum impellunt.
 { inspizanda attrahunt.
 { trahenda immittunt.

Os imposita, minus { gargarizantia.
 { per foramina palati exspirant propelluntur.
 { devorant.
 { pullatim deglutiant.

Facibus retenta sensim spirant trahunt in pulmones,
 nec retinent, ut ventriculum vel cerebrum roborent.
 Fluxiones acris attingunt, cogant, ac reprimant.

In Os et Facies recepta communia sunt foraminibus

Palati. in quod efflati
 Gutturis. in quod inspirata
 Gula. in quod deglutitione } ferunt.

qua eorum sunt } ventriculo.
 { Tenuibus Intestis
 { ventis mesentericis.
 { Hepati.
 { Lienis.
 { Toti denique Corpori
 & Unas et spiritus

46. Rad. Peponis ad Zi. vlt ¹⁶⁴⁹ Zi.

76. Ex infusum et dissolutione.

1456

