



# Collectanea medica

<https://hdl.handle.net/1874/349117>

F  
H.

*Medic:*

1.  
2.  
3.  
4.  
Reliquia quæ in hoc tomo desiderantur proximo sequentia  
J: Walarts, tunc finitum M<sup>o</sup>. Henr: Henrici habet.  
Quæc si maris universa Bogardus Delpensis loc.  
vel Quirinus a Medio M. D. qui & ejusdem Henrici  
Florentij dictata 22 Febribus sibi habet.


J: Henricus de nobis Capitis omnium  
optimus scripsit.


Aevum recens.  
Scripta variis arg.  
N° 401


Var 401 = 8  
Act. VII, pl. 2  
AP 29.


Hs.  
7 E 29


Cor: Bootſſer. Cat: Jan: st. v.  
cts. 12. c. xxvii.























## de DOLORE CAPITIS.

Dolor: Capitis

etymologia.

Dolor Capitis generaliter Graeci dicitur ρεγραχαγια: generaliter dico, nam hac voce quemvis capitis dolorem designant, sive ab interna, sive ab externa seu procatbaritudo procedat. caloja: teste Galeno II de cōfī medicam: seci loc. 1. vocē a ρεγραχαγια επειγον derivata, unde Galen. II metr. 2. hūic affectū a parte affecta nomen tristitia esse asserit. Interdū tamen hac vox summis fractiūlariter, pro eo dolorū capitis qui nec rebentis nec diutennus sit, nec cum magna capitis imbecillitate conjunctus, ut patet ex Gal. III de loc. affect. 9. Latinis dicitur dolor capitis, hoc est, earum partium capitis, quae sensū sunt prædicta.

Definitio.

Dolor gd.

Argenterij  
Opinio.

Op. 1.<sup>a</sup>

Definitur ρεγραχαγια, tristis sensus, sive depravatio tactus cum tristitia in capitis partibus sentientibus, propter solitudinem continuitatis aut intemperitum prædictus. Gal. II. de loc. affect. 2. dolorem de finitur. Dolor, inquit, tristis sensus est, scit voluptas blandus sensus est: gracio vocat διοδοντος αναρεγη, hoc est, non sensum aut sensationem tristem, hoc est, perceptiōnem objecti cum tristitia conjunctam.

Scio Argenterij contendere dolorem tristem sensum non esse, sed tristitiam quā sensum comitatur. Ceterum Galeno sufficit docuisse dolorē fieri, cum obiectum sentitur affatim ac repente corrumpens natūram: nec necessarium iudicavit scire utrum tristitia sensus differat ab ipso

et affectū ipso: caput vero a sola affectu parte renominata.



ab ipso sensu tristis, nec nō: et si differe  
rant, in quoniam doloris essentia consti-  
tuenda sit, cū ad dolorum curationem id  
nihil faciat. Aut dicimus depravati-  
onem tactus esse cū tristitia: Symptoma-  
tum enim actionis laesa, aut imminutæ, aut  
abolitæ, aut depravatae sunt: cū n. a. sensus  
tactus neq; abolitus, neq; diminutus dici  
possit in hoc affectu, restat uti ad deprav-  
atum referatur.

Et vero, inquit quis, neq; sensus tactus  
in hoc affectu depravatus dici potest, cù  
objectum tale p̄cipiatis, taliq; modo, quale  
debet p̄cipi; ut id ipsum satis patet ex  
II App: Hipp: G. Qui parte aliqua corpo  
ris dolentes dolorem non sentiant, yis mens  
ageantur. Verum qd, tūm non tan  
tūm depravatam dici sensationem, Gal:  
et Medicis, cūm depravato objectū p̄cipiatis,  
sed cūm depravatus objectū p̄cipiatis.

Hærtmūs in explicatione definitionis  
Doloris capitū, quēm diximūs est tristēm  
sēu laboriosissimū sensūm, aut deparationem  
tactūs cūm tristitia consūntam, partitūm  
capitis sentientiūm, præpter continuū solutiōnē  
quēm alt intemperitiā productam

Depravationem itaq; dicimus esto sensus tactus, non quod alijs sensib; suis non contingat dolor, sed quod sic sit dolor, de quo loquimur, capit. 16

Dicimus partium capitum sentientium,  
quia ipsa cerebri substantia, osq[ue] cerebrus  
cogitativa. C[on]tra e[st] religia omnia totius cor-  
poris, exceptis dentibus, ut nonnulli vo-  
lunt. Sensus omnis experientia sunt.

Addimus propter Continui solutionem, aut  
intemperiem productam; nullum enim  
Symptoma a causa morbifica productum, nisi  
interventu morbi, qui in doloris productione  
aut continui solutio, aut intemperies est.

Object:

6.

Est igitur  
Cephalalgia.

## degradatio sensu latiss.

partim capi  
tis sentent:

Propter Con-  
tini solut:  
auct intemp:

Scio

Object. <sup>3</sup> Scio quidem non deesse, qui doloris causam  
semper voluerint esse continuū solūtionem, sed  
idem eam aut manifestam aut occultam  
Aj. statūunt: at vero cùm nūdici sensibiles sint  
artifices, et credant quod rident, eam solū-  
tionem continuū, quia occulta est, sensusq;  
effugit, præ solūtionē continuū habendā alij  
vix pūtant, ac proinde ab intemperie dolor  
quicq;  
excitari non incepto statūunt.  
propter cùm videant ab occultā vocatā  
continū solūtione videntur, quā a  
manifesta dolores excitari, cùm fabula ī  
tzarīm fieri deberet, si utraq; continuū  
solūtio dicenda esset: quo enim major ac  
manifestior continuū est solūtio, eo major  
ac manifestior deberet esse dolor.

### DIFFERENTIA.

Differentiae regaariae a veteribus tra-  
ditæ ha sūnt: regaaria, regaria,  
et regaria.

Cephalalg: Quid per regaariae vocem speciali-  
ter sūmptam designent veteres, jam antu-  
dictum est, dolorem nūmp; capitis, qđi nec  
vehemens, nec diuturnus sit, nec cùm ma-  
jor capitis imbecillitatē confundetur.

Cephalaea. regaaria, autem est, dolor capitis con-  
fictus, vehemens, solūtū difficilis, inveteratq;  
frequenter & levi occasione vel propter ca-  
pitis maximam imbecillitatem, vel propter  
ejus sensum exquisitum hominem adorans.  
de hac eleganter Gal: de compus. med. sec.  
loc. 2. regaaria inveteratū est, et agit  
cedens capitis dolor appellata, qđi ex facin-  
lioni occasione maximas exacerbationes  
habet, adeo ut neq; strēpitū, ntq; vocem  
vehementiorem, ntq; lūmen splendidūm,  
neq; vini potū, ntq; odoramenta capū  
replentia

9

a repletia tolerari possunt, neq; item  
a motum, sed in quiete et tenebris ob dolorum  
u magnitudinem decumber velint: tangas  
u enim a malo perturbati sibi videntur.  
u Quidam enim volunt contundantur aut  
u distendunt ea, quae circa caput sunt, sensu  
u timent; non patet vero usq; ad oculorum  
u radices dolor progrederis.

Habet quidem hac affectio aliquando  
continuos dolores, aliquando vero exacerbationes  
et intervallo sive ordinata, sive  
inordinata. Intermittit enim quandoq;  
ejusmodi exacerbationes, velut in comitiali  
morbo apprehensis, interceditq; tempus aliquod  
et omnino accessu non potest.

Manifestum igitur hanc affectionem  
habere consimilem capitis aptitudinem,  
ut facile latens, volat in cephalalgias,  
id est, capitis dolore vexatis: verum ad  
majorem debilitatem deveniunt in hac af-  
fectu capitum partes.

Huic erga testa doloris capitum species Hemicrania.  
est, de qua Gal: lib. d. Q. Huic erga,  
affectio dolorosa circa dimidiem capitum par-  
tem, aliquando extram, aliquid altera contingit,  
qua juxta suturam secundum longitudinem  
ejus extensam terminatur: et ut plurimum per  
circulum exacerbatur, influxu vaporum,  
aut humorum, sive multorum, sive calidorum,  
sive frigidorum causam doleri suggestentur.  
Est quibus postremis verbis id satis patet  
huic erga sive sacer praeordiorum, et subjectar-  
um capitum partium sympathia emergere.

Traduntur et alias differentiae doloris capi- Differentiae,  
tibus ab auctoribus, quae nempe ab ipsis  
partibus definitionis desumuntur; nimirum  
vel a depravatione tactus, vel a partibus  
capitis,

5. capitis, vel a causis.

A doloris  
qualitate  
vigilante  
tempore

A causis.

A parte affect:

percussum in  
calva minime, et  
pericranium tuis  
supplet locum.

Causae,  
proxima,

Actuosa.

Externa

agit: immediate  
per 1<sup>as</sup> qualit:

Ab ipsa tactus deprivatiōē desūmuntur,  
quae a doloris qualitate, vehementia, et  
tempore desūmuntur. Sed haec species, ut  
et quae a parte affecta, et causis desūmuntur,  
satis intelligentes ex explicatiōē  
partis affecta, causarum et signorūnt.

Pars affecta in dolore capitis sunt membra  
branii, ut pia mater, dura mater, peri-  
osium, pericranium, aut vena arteriaq; q;  
quæ sensu prædicta sunt obscurior; cùm cūn-  
tem membranarum aliae intra calvam, an-  
lia extra continentur; sit ut aliis capitis  
dolor medicis dicat exterrit, aliis interficit.

CAUSSÆ.

Causa doloris proxima statuta fuit in  
definitione, continuo solutio et intemps.  
At utro intraq; haec causa cùm morbus sit,  
isq; interiore agnoscat causam, altius  
huius utriusq; morbi causæ investiganda  
sunt.

Sciendum itaq; primo, caput aut affecti  
primario aut secundario: quod ideo moni-  
tum velim, quia ex vaporibus ex in-  
ferioribus pretibibus ascendentibus Capitis  
dolorem non semel enatum audiens.

Per consensum si doleat caput, intenditur  
id a toto sit corporis, ut in febribus; intenditur  
ab hinc aliqua parte, potissimum ven-  
triculo, jecori, lienc, utero, mesenterio.

Hic premonitus, causa doloris capitis  
remota statuenda est, aut externa aut  
interna.

Externa aut immediate intemperiem,  
continuo solutionem inducit, aut moni-  
diatur.

Immediata, aut per primas qualita-  
tes, ut aer ambiens nimio suo calore,  
sive eam a Sole, sive aliunde contraxerit,  
aut

aūt etiam nimio suo frigore : aūt per  
secundas qualitates & per materiam,  
pungendo nimirum, incidendo, erodendo,  
disrumpendo, distendendo, & contendendo.

G.  
per 2<sup>o</sup> qual:  
& mām.

Pledato, cūm externæ sēc̄ evidentes  
aūt primū internas sīnt, aūt internas  
merent: E. G. Lac, virūm potens & vaporis  
vōfūm facilius: non tam tū efficiunt, nisi  
prius asūmpta, ac in ventriculo alterata,  
indeq; vapores siccissim ac versus caput elati  
fuerint: ita immodi ci tūm animi, tūm coru  
posis motus non primū & per se, sed  
aūt humorūm commotionē dolorem excitat,  
aūt abſūmendo humiditatem intemperiem  
caūsant calidam siccām, doloris effectu  
cem.

Interna sūnt humores aūt qualitates,  
aūt quantitate peccantes, at preindō aūt  
intemperiem, aūt solutionēm continent in  
dentes.

Sed qualitatū utrūm quāvis qualitas inten  
sitate (prima nēmpe) dolorem caſſare posuit:  
Gal. art. medie: Do. quāmenq; primam  
qualitatē dolorem caſſare statim siſec  
verbis. Dolor. a. quāmenq; obſeruit locūm  
aūt continuitatis solutionēm, aūt ſubitam  
alterationēm ostendit. Solvitūr. a. con  
tinuitas inciſione, exēſione, fractione,  
tensione. Alterat. n. ſubſtitia caliditatē,  
frigiditatē, humiditatē, ſiccitatē. Ita de  
nat: hum: 1. ad text. 6. Calidūm, frigideūm,  
humidūm, ſiccūm. Si fuerint ſimilē mode  
rate contemperata, ſanūm eſit animal.  
Ubi vero ſe multū calefecerint, frigescen  
cerint, exſiccarent, & humidetarent, do  
lores ſuapē mātē excitant; q; nū ūnica deinde  
ratē cūrānt: Eorum etenim nonnulli re  
frigeratis particulis dolentibus, alijs illis  
calefa n

Interna.

Doloris car  
omnis quādem  
IV qualitatē

7 calefactis, aut hūmectatis, aut exsiccatis  
tolluntur. Ita et de inaq: intemp: 3.  
Dum alterasit ac coquimperatur natura don  
tiores sicut. Alteratur. a. ac coquimperatur  
natura eiusq; cum vel calefit, vel fri  
gescit, vel siccatur, vel hūmeficit vel ejus  
unitàs disolbitur: in qdē inttempora  
mentis, quā in aqua sunt excalefaciendo  
vel frigescendo potissimum; cum efficacio  
simae ha qualitates sint: secunde loco e  
siccando vel hūmectando. Contra. a.

evidenter. a. XII. meth. med. 2. Si capisso, inquit, ab evi  
dentib; conveniet, evidenter videns eosq;  
qua corporib; nostris propinquant, hac sola  
esse dolorifica, et quā vehementer calefiant,  
vel refregerent, et quā substantia continet  
statem dividant. Et paulo post. Pilenian  
id quicquid, quemadmodum in moxis dor  
sorū affligimur, ubi nihil nobis tristis ex  
tinctus appropinquat, necesse est talere  
aliquam causam in corpore quicquid, quā  
scilicet vehementer excalefaciens vel effi  
gerans, vel dividens substantiam sensibilis  
alieniū corporis nos exercitet. Ita quin  
dem ut nunc a gravis intempore, nunc  
a solē calida frigidiare dolorem causari  
posse statuisse videat Galenus.

Sed quid ad hoc loca Gal: dicendum?  
dicat quis. Solutionem ipso dat Gal:  
cum enim ultimo hoc loco evidentes don  
tiorum recenseat causas, aliam quam  
calidam frigidamq; intempore non  
agnoscit; Quia ab lib: de inaq. intemp: 3  
dixerat, ha efficacissima qualitates sunt,  
ac profundè potissimum dolores causant.

Antequam a causis abeamus, etiam  
ea controversia agitanda videntur, utrum  
hūmida

humida intempesies q̄ia intempesies dolorem  
capitis cauſare posſit? Galenū loc. sive  
anti citatis aſſeruit manifestissimū quām  
libet intemperiem dolorem cauſare posſe,  
calidam quidem frigidamq; quia activa eſt  
efficacissime qualitates ſunt vſcementissime,  
ſecundū a. loco ſiccā eſt humidam: II. autē  
de comp. medie. ſee. loc. 1. ab humida intem-  
perie dolorem non excitari aſserit his verbis  
manifestis: Vehementissimi, inquit,

capitis dolores ſunt ſorta caliditatem &  
ſeoliditatem, maximū cūm ineqtales exi-  
ſtant: moderati vero juxta ſicitatem:  
ad humiditates autem nullus conſequitur dolor.  
& pote post, cūm de redundantibus legitur  
humectantibus. Humectantes vero, inquit, pen-  
nitis nullum dolorem inducunt, quantum  
ad qualitatem ipsorum attinet. Et ex  
hoc. Galeni cap: Aricemba lib. III. Tract. 2  
ſen. 1. cap. 2. Complexio quidem humida, in-  
quit, ſecundū q̄ est complexio humida  
non efficit dolorem, niſi illis ſit materia  
humida faciens dolorem ex parte evapora-  
tionis, aut eventus vortositatis factioſis  
ſolutionem continuitatib;. Et ſancti si  
humida intemperie natūra bene conſilietz,  
ea potius ſenſum partis obtundet, quam do-  
lorem inducit, ac proinde Galeno potius  
fides adhibenda eſt hoc loco. (II. de compoſi-  
tis agit, quam alijs locis, ubi per occasio-  
nem ſenſis aditum nullus.) sed obtundit  
ſenſum.

Quid. a. humida intemperies potius partis  
ſenſum obtundat, quam dolorem iniiciat,  
oculma ſatis docet, in qđo quamvis pars  
ſenſibilis in timorem attollat, doloris ta-  
men ſenſis aditum nullus.

SIGNA.

SIGNA.

Signa  
diagnosēi:

Explicata negravias definitionē, dif-  
fidentijs, partē affecta, causis; religiūm ē  
ut ad signa p̄ergamus diagnostica, quib⁹  
tam pars affecta, quam cause investigari  
possunt.

part. aff:

Pars affecta aut̄ int̄a calvam, aut̄  
extra eam hæret.

int̄a calvā

Int̄a calvam si hæret, Gal: Sac rationē  
cognosci astirrit, in de loc: affect. 9. Quod  
tum ad oculorūm usq; funda menta dolere exi-  
tendat̄, eo quod & a cerebro & ab intraq; membrana,  
atq; a ratis, quæ in iphis contin-  
nent, veluti ḡermina quādām dēducantur.

Nupt.

At vero Fern. v Datol. 1. Falsū est, inquit,  
& a veritāte proslis alienū, int̄iores solē  
dolores ad oculorūm usq; radices p̄tinuerit:  
nam et externi eodem sapo p̄tingunt, &  
& p̄tericranium, cūt insident oculorum  
carūm succingat. # At, quid sic dicen-  
dūm? dicat quis.

Aj.

Querim id quidem esse p̄  
sitionē. Sive p̄tericranium oculorum carūm  
succingat, ac p̄cīndat ibi quodq; dolorem  
contingere posse; at cum p̄sitionē ossi  
externi acetē admodūm adhæret, sive  
esse quod mattra p̄ccans facile quidem  
ad superficia usq; sed diffīllime ad ocul-  
orum frats cavitatēm; idq; quia figura  
ipsorum ossium tali rationē ibi mutat̄,  
ut id ipsum quasi impedit vidat̄; dūra  
autem metinx ab ipsa calvā int̄eis spatio  
vacuo discernit, ut facillime mattra p̄c-  
cans interius ad oculorum radices dissem-  
inari posse. Unde hoc manet, si non  
necessarij, saltē ut plurimum verū ē,  
quod Galen. astirrit, dolorem nimicūm  
ad oculorum funda menta p̄tingentem  
internūm existet?

Rondellus. T. 8. p̄metat extēre dol-  
ores ad oculos radices p̄tingere, addit̄q;  
hanc actionē & p̄tericranium secu-  
tingus oculorum cavitatēs injūrias  
externas, diphth. feigort, calcis, &  
siccitatis, nū admittat: a qualibet eius  
externi dolens oculum p̄tinens habebit,  
maximo. a feigore, diphth. & simili, &  
cum p̄tericranium ligida sit nū.

Secundo

Secundo. Capitis dolor internus, p[ro]p[ri]o  
capitis mitescit, aut saltet non exar-  
cerbat[ur]: cum enim pars laboreas non  
tangat; dolore[rum] alteriorum non afficitur.

Dolor externus cognoscitur, quod capillo,  
cum radice inverti non sinat, idque glia  
ex ipsam partem affectam tangunt.

Tertio quod pressu[rum] capitis exacerbet; idque  
glia parti affectata nova addit[us] afflictio.

Examinatis signis, quibus utrum in-  
ternus an vero externus capitis dolor sit,  
investigari debet: proximus ad ea signa,  
quibus innotescit, utrum primario, an vero  
secundario caput laboret. Hoc utri innoscatur,  
ingens[er]endum Medico est, soluum  
caput, an vero totum corpus, an vero  
sua simpliciter pars simul cum capite laboret.

Solum caput si labore[rum] n[on]minim dubius  
est, quin primario sive proprio affectatus

externa calva.

11.<sup>m</sup>

Afectus. Totum si affectatur corpus, aut una  
simpliciter pars cum capite labore[rum] pars; vi-  
tendum num ab ipsius reportis, humoribus ad  
caput ferantur, diligenterque omnia sympto-  
mata examinanda; ac imprimis obser-  
vandum num pro exacerbatione re-  
missione affectus, partis infirmitatis in-  
tendat remittatque dolor; quod in ipsum  
per sympathiam laborare partem certo  
indice est.

Id secundum Gal: u[er]o d[icitur]  
loc. aff. 8. ad fruct. Ch[risti] pars, inguit,  
aliqua simul cum alia sic affectis, ut  
irritatio quidam una. altera reffertur  
molestias, remissa vix irritationem pri-  
sciat: eam per consensum affici putauis est.

Miopathi-  
pathognom:

Sympath:

primario et proprio affectu idem non est;  
sicuti mego secundario & per consensum. A:  
plastari. i. pecc. 7. ex Gal: 7. de lac. aff: 2.  
pertinet. u. duo morbi dissimilati, ut E. G. Lin-  
g[er] amputatio, & Dysuria inum hominis  
excere, quorum affectum quicquid graviter han-  
abitur, paucariq[ue] qui utro levius, secundu-  
m dicitur dies sit. Altero sensu voces  
has accipit[ur] non licet: si in ordinis vocabula  
velit, primum, secundum, tertiu[m] postrem  
minim notare licet.

Sed & singulorum peccantium humorum  
signa diligenter erunt perpendiculariter, ipsaq[ue]  
symptomata examinanda, iti constet  
an non

ext: dolor: { Si dixit pista cito dolor & acerbior.  
Si pilis crevit.  
Si oculorum radicis } molistiaq; n sentitur  
l partis internae

alij dorjan restituit caput Sympathia siccitatem  
av affecto stomacho, aut secretis invenitibus, ~~pe~~  
terris refrigeris, puta vel infusis vel aere,  
stomachum pro desipragin abducens, vel  
patridus, ex altero ~~et~~ in unam caran, ast  
ipsum dorsi. Vaporumque man utrūcunq;

Sympath: et simil.

11. - annon simūl proprio affectū et per con-  
sensum doleat caput: Hoc n. ipsum posse  
contingere auctor est Gal: i de loc: aff: 3  
Sed numero, inquit, contingere potest ut  
aliquis simūl et per consensum, et pro  
pria affectione laboreat, cum in affectu  
per consensum particula permanens in sit  
dispositio: ipsam tamen affici dicemus. "

Ubi constat medico per consensum dolere can-  
git, jam tamen ex his symptomatis agnum  
fatigantibus, reliquisque signis apparentibus  
inquirendum erit, et quae sit illa pars, q  
primario affectitur, et quo laboreat affectu,  
ut commoda remedijs adhibitione et pri-  
marius affectus, et dolor per consensum  
natūs tolli possit.

4. Sed singularem partium affectus, quos  
negrazia Symptomatica comitari pos-  
test, examinari, eorumque signa tradere  
nunc nostris non est instituti: id ipsum  
commodijs fiet in examinu morborum  
singulas partes inspectantibus.

Caput priuato si laboreat affectu:  
causae procatarractae; si vero illa mediata;  
severo immediate intemperie continuo  
inducant solutionem; facili negotio plen-  
cipiuntur, et ex his agri relatū simūl  
multa ambagijs innotescunt. E: G:  
In aere num admodum diu haesit, ven-  
timentor calido seigidore, vino num  
assumperit vaporosum admodumque potens,  
et similia, quae omnia referu non ē necesse.

interior:

Pergimus itaq; ad signa causarum in-  
teriorum, quae si intemperiem produxiint  
erit ea simūl aut cum mattreia. Non  
omnes, inquit Galen. de comp. med. f. l. 1., "

ob unam affectionem caput dolent, sed  
cum ipso affectionis placet simūl, tamen cu  
ratio ipsi" "

1. Quae nulla pars sit corporis nostri, q  
cerebro non habet consensum pp nervos:  
ramen sciendū, id est partis hoc in re pīn n  
cipem locum obtinere ventriculus et Uterus;  
q; qd. die partes sicut validissim ad cerebrum  
alligantur, id illud frequentissime in consensum  
trahant: Vnde cephalgia maxime obnoxia  
quæ ventriculus habent debilitas, quib; vel  
mentes vel lochia detinentur. Massar:  
1. pear. 7.

12.  
"ratio ipsorum singulorum propria existit,  
una n. affectio est juxta intemperiem sim-  
plicem citra humorum complexum.

At vero quibus signis haec intemperie  
cognoscet; Quatuor traduntur signa, quae  
in genere doceant dolere caput ab intem-  
perie sine materia

I. Quod nimicū nulla tūn adsit capitū  
gravitas.

II. Quod nulla adsit tensio.

III. Quod dolor sit stabilis.

IV. Quod siccitas adsit nazūm.  
quorum signorum causas, si examinare ven-  
timus, facile percipiemus.

At vero, cūm tres intemperies, calida-  
nimicū frigidaq; efficacissimū, secca. a.  
minus efficaciter ex Gal. d.l. dolorem  
causent: scire non sufficit ab intemperie  
sine materia ostēm dolorem, nisi quoque  
constet, a qua is intemperie productus sit.

Calida itaq; intemperie (quemadmodūm  
& reliquarū) signa ex tribus potissimum  
fontibus erunt hauienda, nempe ex sympto-  
matibus praesentibus, ex causis process-  
dentibus, et effectis subsequentibus.

Quod ad Symptoma praesentia attinet, cūm in nuda intemperie excūntia locūm  
non habeant, necesse ut configanis ad  
actionem lasam, et qualitatem mutatam.

Actione lasa dolor sic est mordacitatis.

Qualitas mutata ad tactū et visum  
affertur potissimum. Ad tactū, quia  
adest sensus excessivi caloris, faciesq; <sup>q</sup>  
arida existit. Ad visum, quia apparet  
rubor oculorū, et facili, quā etiam  
collapse esse solet.

Causa præterita fuit calfacionis.  
Effecta

Intemperi-  
sine ma-

I.

II.

III.

IV.

calida

1. ex Symp:

actione lasa,  
qualit:mutat:

2. ex caus ateci

ex effectis  
subsequent:

13.  
Effecta subsequentia sunt, quod frigidis delectentur, ab ipsis juvent, a calidis autem laudentur.

Signa calidæ intempitri sive materia regazazziar causantia examinavimus ante: Nam ex tribus deducta sentibus, symptomatis presentibus, causis precedentibus et effectis subsequentibus.

Frigida.

Frigida. a. cognoscitur, quod in hac sensu adsit frigiditatis, facies plena et pallida, præcesserint caueæ refrigerantæ, delectentur et juventur regni calidis. Signa n. dolentium " caput ob frigiditatem contraaria sunt eis, " quæ ex ardore carentur. uti loquitur Gal. d. l. Quæ signa si examinantur, ex ipsis sentibus habita videbimur.

Sicca

Sicca intempitris cognoscitur, quod dolor sit asper et moderatus, quod vigilia et insomnia cum comitentur. Teste n. Gal: com. t. ad. t. proz. text. 5. Siccas ita vigilia cum est, et conspicuitatis somniorum. Probatur id ipsum d. l. tali ratione: Sic sane, inquit, et melancholicis ob siccatatem præsens conus spicula videntur in somnis phantasmata. Atque ex saniorum genio, his quidem qui juncunt partiusque sunt cibati, somnia conspicua fiunt: repletis vero temulentisq; profunda et obscura somnia, ita ut visus vidui destitutiq; videantur, phantasmib; propter obnoscitatem parvitatemq; ita effluentibus, ut ne reliquias quidem vestigia in memoria relinquant: sic et affectiones, quæ cum exorbitate summittate fiunt comatosæ sunt, somnicu, soja et visus destituta. Adhuc signis fam dictis, quod capitis cutis aridior apparet, circa tamen caliditatis sensum, præcessent causæ exsiccantes, laudentur siccis, juventur humidis.

Hac de signis intemperierum sive maa dicta

19.  
Intemps:  
cum maa.

dicta sufficient. Intemps cūm matrīa  
aut iuxta hūmorūm qualitatē est, aut  
juxta quantitatē ed qualitatē simūl,  
aut interdūm hūmores peccant sola quan-  
titatē, tūmq; aut distendendo dolorem  
caūsant, aut transitū vaporū ac li-  
quorū obstruēndo, aut quatenū ex yis hū-  
moribūs flatuosus spiritus enasit. Adui-  
Gal: II de comp. med. f. l. 1. Una, inquit,  
affection est juxta intempsim simplicem,  
etra hūmorūm complexum: alia juxta  
hūmorūm qualitatē; velūt etiam tertia  
quādam alia juxta multitudinem tantum  
iipsozūm hūmorūm contingit. Quibūs accen-  
dit ea, quæ sit, cūm hūmores transitū li-  
quorū ac vaporū obturazint. Ad hac  
ed alia est, cūm in quibūdam capitū partibū  
propter imbecillitatē flatuosus spiritus in-  
nascit. De singularūm hūmorū signis  
actri jam simūl.

Quo pacto itaq; dicat quis, intempsis  
cūm matrīa, quæ juxta hūmorūm qualitatē  
est, cognoscet? Si peccantūm quidēr hū-  
morūm signa (in sequentib; examinanda)  
appareant, nulla tamen adsit aut tensio, aut  
gravitas, dolorq; appareat pro qualitatē hū-  
moris.

At quo pacto cognoscet, si matrīa sola  
peccans quantitatē dolorem caūsēt? Quod  
tūm dolor sit extensivus cūm gravitate,  
etra moxim, stuporem, aut asperitatem.

Si a. utraq; signa appareant simūl, et  
rehtmentisimūs sit dolor, jam tūm ed quan-  
titatē ed qualitatē matrīa dolorem caūsāi  
certo satis est iudicio.

Si matrīa sit vaporosa, dolor quidēr  
est extensivus, sed turgidus, modo hanc  
modo illam occupans capitū partem, inter-  
dūm pungens, et ut plurimum cūriūm  
sonitus,

ob qualitatē

ob quantitatē

- utramq;

vapor:

15. sonitus, dumque augeatur vapor, v&ehementis pulsatio & est capitis & arteriarum circa frontem: utero, oculi locum hallucinatio, causasque flatus gentantes praecessit, maximeque juvant flatus discentientia.

Hac enim in examinu signorum, quibus causa doloris capitis investigantur, eadem ad ea signa pertinimus, quae, quis humor praeceps, dolor enimque excitet, indicare possant.

Sanguinem, sanguinem igit in vizio esse, ex his signis cognoscimus.

- i. Ex tensione venarum vel arteriarum, vel cæterarum partium dolentium.
- ii. Ex gravitate & pigritia ad motum, ut aegri capito libenter quietescant.
- iii. Ex caliditate manifesta ad tactum, non solim ab ipso aegro, sed etiam a Medico percipiatur.
- iv. Ex rubore in facie & oculis.
- v. Ex pulsu magno.

Duo prima sic relata signa symptomata sunt spectantia actiones animalis: cum non tensio & gravitas sic absint, necesse est dolorum tensivum & gravantem esse. Tertium & quartum qualitatem spectant nitiditatem; tertium quidem sensu tactus percipitur, quartum visus. Quintum actionem spectat vitalen. Horum omnium signorum facile est certam rationem reddere, & unumquodque in se habere causam, ne tempore Sanguinis plenitudinem referre.

- vi. Si exenitia spectare velitis, urina crassa rubraque est.
- vii. Si causas precedentes, praecessere causas Sanguinem gentantis & colligentes, uti suppressa evacuationis, vita otiosa, cibi copiosi & multum nutrientes, &c.
- viii. Si affecta subsequentia, evanescuntib;

cuantibus, & minuentibus Sanguinem maxime  
mo juvantur. Notandum. a. Signa  
haec relata non aquam singula obtinet  
certitudinem: sed quia certissima, quae min-  
nus certa sunt, videant apud Gal: lib.  
de plenit: ad finem.

Si eadem ratione examinare velitis, Bi-  
lisne dolorem causat, Symptoma spectan-  
te primum: Bilis. n. cum acris est mordax  
sit omniumque saemorum calidissima, 1.  
Dolores causat mordacantes ac rethmico-  
tissimos, 2, pulsus velocem. Et quia  
secca est, 3, vigiliae excitat & somnia riu-  
xarum & contentionis plena. 4, siti  
cibi fastidium, ventriculi moxsum. Si  
spectetis qualitatem mutatam, adest, 5,  
totius capitis calor immodicus, 6. Ovis  
amaritudo, 7, faciei color citrinus, vel  
pallidus. Si cunctia sive ex naribus,  
sive ex ore prouident, 8. ea flavedint  
ostendunt. Si causas frigescas, 9, pra-  
cesserunt causa bilem producentis. Si effor-  
cta subsequentia, 10, juvantur ab his, quae  
Bilis copiam immutant, ejusque accionem  
am obtundunt.

Pituita num poccet, eadem examinan-  
tibus ratione; in hac, 1. dolor remissior  
est, sed cum gravitate, & persistens seu  
dintus, 2, sensus sunt hebetes, mentis  
adest pigeritia & torpor, 3, somnas pro-  
fundis, nisi forte pituita salsa sit, quae  
hic poccans est. Ad qualitates matra-  
tas, 4. Color faciei pallidus est, & ad alter-  
dinem vergens, 5, frigilitas ad tactum pro-  
sentitur. 6. Excubita alba sunt & cauda,  
& pro pituita natura aut insipida, aut  
acida, aut salsa, 7. Causae frigescas trau-  
les fuerint, quae pituitam coacervarent.

8. Fervor

16.

Bilis,

1.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

Pituita.

1.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

vii. Si iuvantur ab īs, quae sitiuita copiam  
imminuant.

viii. Melanocholia si peccet, dolor est rem  
miseric, sed pertinax et cum asperitate.  
ix. ad sunt vigilia, et si dormiant, somni  
sunt turbulentia et insomnia Melanocho-  
lica, quibus interdum 3<sup>o</sup> ipsa melan-  
cholia moebus succedit, 4<sup>o</sup> color facies  
ad livorem, vel nigredinem uterget. 5<sup>o</sup>  
Causes Melancholicam multiplicantes per-  
cesserit, 6<sup>o</sup> hanc imminuentibus optimo  
juvants.

Prognostica  
Prognostica in hoc affectu non unig  
gentris consideranda; Alia n. eam im-  
minere; Alia curationis facilitatem;  
difficultatem, impossibilitatemq; Alia  
secuturam saltem aut mortem; Alia de-  
nig<sup>o</sup> affectum hunc quae consequuntur,  
aut in genere transmittari soleat mala, per-  
sagiant.

imminentis  
dolori capi:  
i. Primi gentes haec recensentes praecipia.  
1. Quibus acuta sunt capita, in quibus  
dentium positus immutatus videtur, ita  
ut inferiores superiores etea non et non  
spondeant, sed veluti revulsum atque di-  
stortum os apparcat; in cibro dolore can-  
gitis vexantur. Id est secundum Gal: com:  
i. in vi Epid. Hipp: ad text. 3. Ratio  
a. haec est (ut eodem loco docet Galen<sup>o</sup>)  
quia imbecillia membra copiosim excre-  
mentum colligerunt consueverunt.

ii. Quibus caput facile vaporibus replete,  
dolori capitum facile sunt obviri. Porro  
ea corpora sanguis natura identa sunt, ut  
ipsis caput impletatur, in quibus vaporos  
sunt calidissim spiculis generatis, aut quibus  
viliosa excrementa cumulantur in ore  
ventriculi. testo Gal: iii. de loc: off: g.

iii. Facili

III. Facile capitis dolorē corrīpiunt, quin  
hūs sensiles admodūm sūt certai membra.

III.

IV. Quābās febricitantibās urinā sūnt  
turbida, quāles jumentorum, iūs dolorem  
capitis vel adesō vel innūta, testis  
est Hipp. Tr. ap. 70. 1093, quia talis  
urina sūnt a materia crassa & dura,  
a calorē agitata & in spiritū resolūta,  
spiritus autem flatnojūs una cū calorē  
prompte fertur ad caput; testis Gal.  
coment. ad d. Apb.

IV.

Prognostica secundi generis, quāc  
nēmp̄ facilitatem difficultatemq̄b cū  
eandi hūjūs mali p̄sagiant, desūmunt  
a diversitate loci affecti & causarū.

facilitatis  
cūzandi

I. Partes affectas si spectemus, facilis tollitur dolor, qui nēp̄ior aut p̄tercam  
niūm; quām qui duram piamv̄ occupat  
matrem! quēd nēmp̄ medicamentūm ex  
trīscēs applicatorūm ris & efficacia ino  
ternas minus quām extēnas partes altēr.

V.

II. Casas si spectemus, facilis tollitur  
dolor, ceteris partibās, qđi ab extēna quām  
qui ab interna critur causa.

VI.

III. Ita & dolor a calida frigidare in tempore  
minorī molestia profligatur, quām qui a  
secca est.

VI.

IV. Si hūmores dolorem causent, quo con  
p̄ficior, frigidior, viscidior, crassior fūcit  
materia, tanto difficultius tollitur malum.

V.

V. Dolor a flatibās facilis, quām qui ab  
hūmoriibās est discentitur.

Tertij genēcis prognostica, quāc nēmp̄  
salūtem aut mortem seculūram prædicunt,  
hac sūt.

salūtis aut  
mortis.

I. Ob capitis dolorem vehementem, nō me  
unquam animi deliquio comprehensis mortis  
est, neq̄b se ipsum occidit, quemadmodūm  
quidam

V.

19. coli dolorē vexati quidam fecerunt, teste  
Gal: de compōsi medicis s. l. i. In quo tam  
men loco notanda dūo: prīmo, quod Galenū  
logīts de capitīs dolorē, qāt cītra ullū aliū  
affēctū contingit: secundo, p̄dicat neniū  
ūnqām ob eūm dolorem anīmū deliquio com  
probēsum obyssū.

II. Alioquī, teste Hipp. vi Ap̄. 51. quin  
cīnq̄ sani dolorē Capitis cōpēntē capiūnt̄ et  
statim mūti fiant et stertant̄, in septēm dībō  
pertinent̄; nisi feb̄is appreßendērit.

III. Et lib: iii. p̄rog: text. ii. Uterū gerentib⁹  
si capitīs dolores sp̄eciesq̄ cūm gravitatē fiant,  
vitiosi sūnt.

IV. Et in p̄rog: text. ii. Capitis dolores ven  
hementes continū cūm feb̄e, si quod ex  
indīcīs extiterit exitiosis, lethali⁹.

V. Ubi ingentem Capitis dolorē distentio  
nervorū comitat̄, vel inflammatio jūcta  
oculūs, aliamq̄ corporis defixa partem,  
vel deniq̄ oculorū inflatio, aut subversio,  
flammūm periculūm ostendit̄.

consequēnt:  
dolorē Cap:

Interdūm tamen dolor Capitis crisi⁹  
fūtūram indicat, unde Hipp. iii. p̄ogn. t. ii.  
Cīm Si vero sini⁹ talib⁹ indīcīs dolor vīn  
gesimūm transeat diem, et feb̄is detinet,  
expectat̄ oportet sanguinis e nazib⁹ erup  
tientem aut alium qāmpīam abscessū ad  
infernas sedes. Sed quoad dolor fierit  
ocul⁹, expectat̄ oportet sanguinis eruptiōnēs  
e nazib⁹, aut supp̄ciationēm, si dolor aliqui  
circa tempora ac frontem est.

Interdūm exēta sp̄eciālēta exītēt̄  
dolorē solūtām iūi p̄adīcūnt: unde Hipp:  
vi Ap̄. 10. Capūt dolenti sēcū vīhementer  
laboranti, p̄is vel aquā vel sanguis p̄e os,  
nazis, aut aere effluens dolorē solvit.

Ita hīna tārbida, p̄asētūm in p̄ieris,  
capitis dolorē n̄ raro solvit.

Ultimo

Ultimo loco in prognosticis considerandis  
est, in quos affectus definere aut mutari soleat  
hic dolor.

20.  
In qua transi-  
cat dolor.

I. In dolore capitis omni periculum veletur,  
qui continenter exercitat et somnum tollit.  
Quodsi vomitus etiam accedit aruginosis, et  
sorditas, in proximo est insaniam significat.

1°

II. Id quoque observationem est, vehementem capi-  
tis dolorem, qui curatione non sanescit, sed  
magis exacerbatur, assidueque tenet, periculum  
insania per febrem minari; sine febre autem,  
cum hanc quoque insaniam, tum magis coen-  
tatem preannunciat.

II.

III. Per acutos Capitis dolores, si sonitus inci-  
dat aures, sine febre, et vertigo et impeditus  
laudusque sermo, et manum torpor, vel moro-  
rum expectari intentionem vel Comitiale vel  
Lethargum alienum non est.

III.

Quae hactenus de dolore capitis dicta  
sunt, eo spectant omnia, ut methodice huius  
mali curationem Medicus aggredi posse, quam  
tuto ut suscipiant, certis utrisque indicationibus,  
quarum alias indicantes, alias evindicantes,  
alias contraindicantes. Inter has indican-  
tes, quid fieri debeat, docent: quas ob id  
hic tantam considerationi sumus.

Indicationes itaque curative, quia doloris  
presentem respiciunt, desinunt vel ab ipso  
dolore, vel ab eius causa. Ad hanc Galeni:  
xii metu: 7. Si causam, inquit, ipsam, aut  
dolor excitatus, admittit posse, ita si quis con-  
tra symptoma non pulgaverit, sed agerit in-  
dinem curavit: sed si quia occasione habet  
bitum, affectus submovendo intentum esse  
non licet, vehementiam doloris mitigabis.  
Hoc est, Symptomati nempa quia Symptoma-  
ti non aliam debet curationem, quam quae  
per affectus, unde oritur, ablationem instituit.

Verum

21 verum id ipsum interdum tam vehementer est,  
ut seposita ad tempus methodica curatione,  
universam curantis consilium ad se trahat,  
et pro tempore mitigatione postulet.

Ita et interdum contingit, ut tam vehementer  
mens regaaxayia existat, ut continua  
vigilias vires omnino posternentis indicat.  
quo casu sepositis, unde ortur causis, dolor  
sui mitigationem indicat aut per Anodynem,  
aut per Narcotica, aut utraq[ue] inter se mista,  
eaq[ue] exterius sint exhibenda; aut in simma  
necessitate Narcotica interdum assumenda.

Anodyna humida sunt et moderata calida,  
corporisq[ue] nostro consimilia, vel ordinis primo  
calida, tenuisq[ue] substantiae, ac propiore dono  
soris causam temperant, demulcent, corpori  
eisq[ue] substantiam fovent.

Narcotica partis sensum obtundunt fornici  
pedumq[ue] reddunt, ut doloris urgentem causas  
ea minime percipiat.

Unde satis patet, si anodynem dolor seniri,  
ac tantisper ejus vehementia sedari possit,  
donec per causam ablationem omnino tollatur,  
ad narcotica devenerendum non esse.

Anodyna extails et solvi, et mixtis nar-  
coticis et flos et linimenti et cataplasmatis  
forma adhiberi possunt.

Si flos forma adhibentur anodyna, non  
inconveniens est (si in partibus interiorib[us]  
habet malum) acetum parvum admiseret.  
Descriptionum formularis apud auctores vir-  
deret licebit, inter alios consulendg. Torn:  
ri metz. mod. q.

Si assumenda sunt Narcotica, aut Philoni-  
num Roman: aut Requisits Nicolai, aut  
p[ro]p[ter]o. de Arroglossa ad eis aut eis exhibentur,  
aut etiam Laetoni rite preparati griff.

Quemadmodum Cephalalgia nitens vehe-  
menter

menter urgenti occurrendum sit interdum,  
dictum est. Quo tempore et hoc monitum,  
ad Narcotica non nisi summa necessitate  
deveniendum est; quod iterum mentio  
ob necessitatem. Nunquam n. satis di-  
citur, quod nunquam satis discessit. Atu-  
diats Gal: II 12<sup>o</sup> compos: mtd: s.l. i. de  
opiatis in hoc affectu contra Apolloniem  
iudicium. Porro et in fine sermonis ipsius  
scriptum est, primum neque ab illo in Iesum  
Iesum exprimendi gratia consulerem, n.  
dum sapere. Raro enim cogimur pharmaco-  
cis ex Opio uti; cum uidelicet praedoloris  
vehementia homo de vita periclitatur:  
quoniam et tunc solidæ partes ex Iesu  
offendantur, adeo ut post haec curatione  
opus habeant. Sic et ex Opio Collyria  
detremento fierint, adeo ut debilem ochi-  
lam addidissent, et visus habebundentur,  
aut avariorum Gracis appellatam induixerint;  
velut etiam auditus gravitatem inducent,  
quocunq; ad vehementem accidit dolorum  
ex Dapartu siccо composita sunt.  
At vero ob Capitis dolorum vehementem  
nemo inquam animi deliquio compunctionis  
mortuus est, neque se ipsum occidit, quem  
admodum quidem coli dolori utrati fecer-  
unt: Ut enim doleant, longe minor  
ipsorum dolor est, quam eorum, qui coli  
qui auris, qui oculi, aut qui dentis dolor  
extinxant. Mitigant illi ipsi perfici-  
onibus et illationibus, cataplasmatum  
impositione.

Hicce de Narcoticis iis iterationis,  
praeceps ad curationem hujus doloris modo  
tibi dicam, quoniam fit per ablationem ipsius  
causar.

Canis

Narcoticor:  
iis peri-  
culosas.

Causam doloris diximus in precedentiis aut continui solutionem esse aut in temperiem: intemperiem aut esse cum materia, aut sine materia: utriusque continui solutionis et intemperiei aut causas esse externas aut internas: Cum a causa ex tera facile removereantur, intemperiesque sine materia sint corrigenda alterantibus; Ihs doloris causis methodicam curationem tantum trademus, qui ab humoribus continuum solventibus, aut intemperiem causantibus producitur.

Ita tamen prius excusiam, utrum intemperies sine materia solis alterantibus sit corrigenda, ac evanescantia in ea locum habent nullum.

Certum id est unumquemque affectum per causam suam ablationem auferri: unde et hoc monit, humoribus non peccantibus, eorum ablatione malum neque minimi, neque tolli posse. Præterea, qui integræ sunt corporis valetudine, medicamenta agere noluntur et quod ferre scribit Hipp. n. Aph. 37. sed ut addit Gal: quia purgans medicamentum familiarem propriumque humorum, E.G. silem alterantem, est Pittitam, aut aquæam superfluitatem nitens affra heteros; sed eo vestitum sanguinem liquet et carnes, ut proinde ex ipsis sibi sequuntur proprium familiareque est, attrahat. Quæ si vera sint, quo pacto ruda intemperies sine materia alia quam alteratio admittit medicamenta? Et tamen Avicen. III, sen. 7. tract. II. cap. II. in cephalalgia a Solis adustione gentia evanescantia admittit interdum. Verum id quidem est, sed in tali casu, ubi hunc mores quietos Solis ardor commovit, aut

ubi

abi flaccis nescis partem dolentem metuas.  
 Audiat ipse Avicenna. d.l. loquens. Et  
 multoties quidam ex Solis ardore sola  
 accidit: non ex hoc, quod calefacit tann  
 tum, sed ex hoc, quod elevat vapores, et  
 moveat humoris quietos. Cum huiusmodi  
 itaq; non est exhalatio ab evanescib; q;  
 secundum modos predictos. Et quandoq;  
 etiam in ea, in qua vapores non elev  
 entur, neq; humoris moventes, est no  
 cessitas evacuationis: et illud quidam cum  
 sentitur repletio, et timet in ipsa man  
 teriti attractio ad locum dolorosum.

Hac iam quæstione explicata peregrinis  
 ad Dolorem capitis orthum a Sanguine, cuius  
 in capite plenitudo esse via potest, nisi  
 quoq; adsit totius corporis.

Si itaq; siue velim, quid haec causa  
 indicet, videamus Gal: art. mod. 95.  
 Supponat, inquit, cibiam particulas in u  
 flentem multitudinem sanguinis adeo, ut  
 distendantur, quæ in ea sunt vasa, non  
 majora tantum, sed etiam parva, quæ prius  
 sensim effugiebant: nunc vero, quæ plena  
 sunt, vissi comprehenduntur, scutis plerisque  
 in oculis ob tunica albedinem manifesti  
 sinu patet: par siquidem est, quod et alia  
 vasa, quæ latent sensim, iam plena disten  
 dantur, non tam et ipsa ob parvitudinem  
 adhuc vissi manifesta. Et iam periculum  
 imminet, ne quod ex rasis exudat, ad spati  
 vacua, quæ in medio sunt, effundatur: aut  
 ne iam parvum aliquod sit effusum.  
 Hujus quidem affectus sanatio intentionis  
 habebit evacuationem, aut ut manifesti  
 vocabulo utamur, abvacuationem: Si u  
 dem moribus erat immoderata partis repletio.

Necessaria

Necessarium igitur est, ut aut sanguinis  
tas retrocedens evacuet, aut per ipsam  
patientem particulam. Retrocedit. a.  
vel impulsa, vel attracta, vel transmissa,  
vel hecum sine aliquo moderum, vel tibi.  
Per locum vero patientem evadatur, par-  
tim quidem manifeste et sensibiliter, partim  
vero in capores tenuata. Si igitur unius  
utriusque corporis plus aequo plethora cum ficerit  
per patientem locum minime evanescat.  
Nam si scarificationibus aut sectionibus stu-  
sibiliter vacuabimus, plus ratione doloris  
excitati attrahemus. Si vero calcantibus  
dispaginibus tentabimus, plus erit id, qd vi  
caloris ad partem attrahens, quam dispersus.  
Quod si in eo elabortemus, ut qd influxit non  
trockendat; corpus plenum non admittat. Ad  
hec igitur ambo totum corporis evacuare  
oportet, aut omnino ad alia loca attrahens  
quod patienti particula influit: quo profecto  
operi prius a parte repellendum, quem dis-  
pergendum. Quanto n. per majora loca sit,  
tanto expeditior est evacuatio. Huius  
Galnus. Ex quo loco clara patet omnium  
primam indicationem se offere vacuatio  
univerti corporis: secundam revulsionem  
ejus, quod parti laboranti influit; et  
ejus quod influit derivationem, tertiam  
repellendi quod influit, quartam dissolvi.  
Si quid in capite religum fierit.

Plethora pteccanti, capitisqz dolorem  
inducente, prima qua se offert, indicatio  
postulat evacuationem totius corporis, eamqz  
(si viris ferre possint) per venæ sectionem.  
Hoc scilicet est, qd in omni plethora Hippo-  
monet. T. apb. 3, hanc cunctanter plenior  
em illam corporis habitudinem solven-  
dam est.

At qua

At quæ vena in hoc affectu secunda? ut non tantum plenitudo totius corporis miniat, sed etiam sanguis in capite in fluiens revellatur, non incommodum seculitz vena hæmorrharia sive cephalica vocata: ita Gal. revelli a capite sanguinem venia sectione in cubito instituta, docet.

Ita dō compōs: medic: s. l. 2. At vero

Avicennam obssident alijs laudantem in hoc casu phlebotomiam saphena, et crurium ventosationem. Veram quidem Avicennay lib. m. sen. i. tract. ii. cap. n. statuerat, q̄ plurimum interdum confrat in Capitis do-  
loz phlebotomia saphena; sed non simplicior ad totius evacuationem eam praescibit.

Audiat ipse Avicenna. In ea sola, quæ facta est a materia calida sanguinea, oī portet ut incipiatis a phlebotomia venarum brachij: quodsi eam illa, quæ vis, n̄ cor-  
sequuntur, et remant modis tuis cū dis-  
positione sita, et vena exuberant universan-  
liter, et vides in capite, et in facie et oculis  
ablationem manifestam: oportet ut phleboton-  
mentur vena, quarum minutiō cerebris  
evacuatur: Sicut phlebotomia in narī et  
fusq̄ latris, et minutio vena in fronte,  
ipsa namq̄ est vena, ejus phlebotomia  
plurimum et gritudines capitū extirpat.

Et deinde subiungit. — Et quandoq̄ etiam confitit plurimum in hac specie sola, et quæ hoc modo currunt, phlebotomia saphena,  
et crurium ventosatio. Ita quidem  
ut universalis ista totius corporis evacuatio  
ex venis brachij secundum Avicennam, sed  
ad reuulsione in saphena interdū instituenda  
sit.

Quantitas edicendi sanguinis ea sit, q̄ ad minuentam pletoriam sufficiat, quamq̄  
vires ferre possint: hocq̄ pro morti vescu-  
menta

27. mentia, viciisq; ægi, aut unica vice-simil  
ad semel, aut partitis vicibus.

At si aut abhorrentibus ægis, aut propter  
atatem, aliav; de causa phlebotomia in o  
stium non possit, quid tam agendum? quod  
quis. Respondet Gal: ut de compo. med:

s.l.1. Quodsi quipiam horum, sive etas, n  
sive vicium debilitas, aut etiam ambo sin  
mūl sanguinis detractionem fieri præpediu  
ant, alvum per cystrem evacuabimur, n  
tum ut superflua in ipso recumenta ex u  
trahamur, tum ut humoris, qui ad affectas  
partes inde ferri consuevit, revellamus:  
atq; inde auxilijs ad inflammationis com  
mocis itemur. Nemodmodum n. tantu  
plenitudo, sed etiam citra plenitudinem  
morbi magnitudo virtutisq; robore venae secti  
onem indicant; ita pugnationem n. tantu  
eacochymia, sed etiam morbi magnitudo:  
virtutisq; indicat robust. Testo Gal: IV. m<sup>th</sup>  
med. 6.

Prima indicationi ubi satisfecerit sic  
dicit, seqūitur secunda, q; sic nmp; humoris  
influxi, sive plenitudinis in ipso capitu  
hacentis revulsionem, derivationemq; in  
dicat: nam post totius corporis evacuationem,  
jam capit evacuantibus uteris, inquit Gal: in  
locū statim citando.

Revulsionem, simul dūm instituit evacu  
atio, pragi diximus, instituta vena sectio  
nū in biachio: eadem etiam, testo Gal:  
II de comp. med. s.l.2. cystribus, liga  
tis extremitatum, et pluribus inferius  
partium confrictionibus: Quodsi amplius  
sanguis redundant vidatis, etiam ex narib;  
aperta vena, et quantum sufficeret videt  
sanguinem evacuato. Avicennas addit  
sectionem vena frontis, sed cum hac  
cautione

cautione, si dolor fuerit latris posterioris,<sup>20.</sup>  
vena, quae est lateris anterioris, ministrat;  
Et si fuerit lateris anterioris, vena, quae  
in parte eius opposita debeat vena, ventosa loco  
phlebotomia adhibeantur. Et si illud non  
sufficiat ventosus sanguis spatulas ponantur,  
et sanguis multus inde extravatur. Sed  
uti monit Gal: xiiii misc. med. 19. vacu-  
ari prius totum corpus expedit: nam si  
referuntur sanguinis sit corpus, in quincunq; partib; capitis cūcubitalam defixeris, totum  
ipsum impletabis.

Similiter autem dum hūic indicacioni satis  
facit medicus, medicamenta repellentia extremitatē  
capiti adhibenda, sanguinisq; influxus prohibi-  
bendus, uti tertio satisfaciat indicacioni.  
Quālia et quā illa sint, videat apud Gal:  
4.1. Familiard practicis hodie est sequens  
oxyrhodinum.

et Ag. Rosac.

Ol. Rosac. an 3*ij*.

Aceti Rosac *ij*.

misi*ij*, si. Oxyrhodinum.

Tertia indicatio, quām examinari capi-  
onis, exposcit medicamenta repellentia,  
extremitatē capiti adhibenda. Deditur extremitati  
plūm oxyrhodini constantis ex refrigeratib; et  
et astringentib;, quod ipsum et penetra-  
vi possit propter acetum. Quodsi expre-  
titur oxyrhodinum magis refrigerans, licet  
oleo et Aceto permiscetur secundum Semperivii,  
Portulacæ, Lactucæ, et similiam: tamenq;  
ista accinaretur et diligenter agitanda et  
misienda sunt, q; oleum cum succis n̄ facile  
permisceatur.

Miki in usu non raro est succos expressos  
Lactucæ,

29 Lactucæ, Plantaginis, similesq; farina hor-  
dei inspissato, eaq; rato capiti appontr.

At cùs capitis parti applicanda ea ¶

Aequinta m. q. fronti ea applicat & tempou-  
cibus. Gal: autem n̄ de comp̄si: medicis. i.  
Regio, inquit, Capitis juxta Sincipit, pro-  
pter laxitatem coarticationis juxta coronam  
sem suturam, et ab ossium tenacitatem et ran-  
ritatem faciliter tum caliditatem, tum frigidi-  
tatem omnium, quæ adhibent pharmacorum  
intro distribuit. Quare si refrigerao eponu-  
teat ex caliditate ardorem, sive calfacto  
frigiditatem, aptissimus est Capitis juxta  
Sincipit locus. Et xiii. met. 22. Nisi sed  
tūcas in capitis osse natura ipsa fuisse  
molita, nihil estimandum efficere pharmaco-  
mum ullum extrinsecus impositionem. Sed  
quoniam sutura etiam, et in his precipuo  
coronaria non solum impositi medicamenti  
qualitates, sed etiam substantias, si tenuis  
est, facile intro transmittit, merito multa  
circa cerebrum vicia ab extrinsecus appli-  
cationum remediis facilitate juvantur.  
Ipso. n. in me ipso expertus memini, cum  
infundebat Rosacum frigidum, citissime  
elapsimq; sensisse me in Sincipitis loco  
eius intropenetationem. Et paulo post subi-  
 jungit. Merito igitur ad hanc maxima  
partem, applicant omnes medici capiti  
infusionis; videlicet accepta quasi per  
manus a primis inventoriis. Et sane  
prater coronarium suturam in Sincipite con-  
spicuum, verticis osse, ubi medianus sutura  
sagittalis coronariae singunt, bregma ostendit  
dūt, locum in primū natis apertum;  
sensu osse vacuum, quicq; palpantem alio  
quandiu in infantibus ostendit urticem:  
nude ossiculam, quia hanc hiaticam post  
modum

modum claudit natura, reliquis capitis os siq[ue] 30.  
nunquam similem induit crassitatem nec solida  
titatem: in se hinc objectam si intuearis  
calvam, transparentem hinc duplicitum  
cerne locum, ac proinde Gal: hic loco  
principio topica applicanda constat remedia.

Sed frigiditas an tepida ea adhibenda?  
Gal. i. ad Glaucon. 15. respondet attendum  
ipsis, in multitudine quidem crudiore, ac  
frigore, tepidis: in calidore. a. ac biliosis  
oris frigidis. Et hinc in capitis dolore ex  
ardore ii. id composi medicis. s. i. Rhapopta  
in principio, inquit Galen: melius est  
resarcere probe apparato, quam frigidissimo  
capit perfundere.

Ultima indicatio requirit discutientia  
et cerebrum refrigerantia: Ad quam rem  
conveniunt Oli: Chamomelin. Anethum,  
Lazarin. Lilio: Tofas ex decocto Betonica  
fl: Chamomelli, Melilotae, Stoechadi. etc.  
Intraq[ue] assumenda sunt Apozymata condita  
eisdem fini inservientia.

Victus ratio sit refrigerans, et pacificans  
nutrimenti.

Peccante filo, eadem, quæ peccante  
Sanguine oriuntur indicationes: evacuandi  
tempo, revellendi, repellendi et discutendi,  
cerebrumq[ue] refrigerandi: Sistimq[ue] ferre p[er]tra  
gants praesidys, nisi quod præter utra sectim  
enim, expugnatio in hoc casu necessaria sit; 1.  
eaq[ue] per illa, quæ Bilem ducunt expugnatq[ue].  
Statim illa leviora primâ, et deinde nos  
cessanter malo ad vestimentorum p[er]gatis.  
II. detinat quod repellentia, quæ adhibent,  
frigidiora requirant, & peccante Sanguine.  
III. Quod victus quodq[ue] ratio magis refici  
gerare, et humectari debeat.

Peccante Pittita eadem indicationes,  
quæ supra dicta, locum quoq[ue] habent.

Ac p[er]

Ac primum quidem totius evacatio per purgans medicamentum, si sita in toto paret corpori: tenax. a. et viscidus cum sit humor; <sup>1</sup> preparandus primus erit attenuatio tibis ac incidentibus, ut medicamenti trahentis vim faciliter sequatur; <sup>2</sup> corporis ductis extirandi, per quos traduci trahi debet sic humor. Hoc est quod monet Hipp. u. aph. g. Corpora cum quis repurgaro volet, meabilia faciat oportet.

Cum ad conveniendum ~~de~~ta Beeton. Salv. Majoran. Hyssop. fl. Stoechad. Similiq[ue]: q[ue]sque addetur Mel Rosat. Oxyne simplex. Syr: de Beetonica, &c.

Humore preparato, educeturis medicamentis pituitam peculiariter purgantibus, Similicibus quidem Agarico, Turbitis. Compositis, Diaphoenico, Specieb. Diacarb. q[ue]sque Mastichin. ad Agarico, Cochys.

Vena sectio quando bona  
De Vena sectione si queratur, ea raro sic locum habet: sed tamen interdum adhiberi potest.

i. Cum in ipsis venis pituita sanguinis copia abundat.

ii. Cum doloris id ipsum postulat vehementia Universali evacuatione adhibita, sequitur secunda indicatio, quae humoris prevalentis revulsione, derivationemque describit.

Revellit Pittita Clysticibus, acerobibus, quo Glandibus.

Derivatis institutis Resecatoribus, Counteris, tum et medicamentis precilianter ipsum caput evacuantibus; quae praescribi possunt forma Garganismatis, Apoplegmatismi, et Erbini.

Garganismata sicut ex illis, quae Pittitatem incendi attenuaudique vim obtinent: qualla ante relata.

Apoplegma

Apoplēgmatismi exemplūm hoc esto.

¶ Piperis longi,

Pyzetri

Staphidos agric. an 3j.

quæ Mastice excepta ore manducent.

Errhinūm si. tali ratione.

¶ Herb: Salvia,

Betonica,

Majorana, an 3l. j.

Rad: Iridis florentin. 2/3.

Agarici roobiscati 3j. +erantz.

affus viui albi 2/3.

expresjōn's succis accommodat's in Errhinūm,  
quæ naribus habitum sūrsum attrahatur.

Interdūm narcs illinuntz Ol: Nardino, is  
quo Etatry gr. ait q̄. permista fūtrint.

Interdūm Linamenta; oblonga e<sup>2</sup> cōtoeta  
mactfacta in succis caput exp̄egatibꝫ, naribꝫ  
induntz, interdūm ipse radices cōcise eo aptant.

Sed e<sup>2</sup> dūm hac institūntz, tertia indicatio  
locūm habet, q̄ docet ap̄pellentia esse adhibenda.  
tunc Oxyrodina applicabuntz, uterū t̄pīca.

Ultima indicatio docet rēsolvēndam disclu-  
tiendamq̄ materia m in capite restantem:  
idipsum Internū efficitur, as̄umptis Apozemari  
tibꝫ, condit is ; Exteri Linimentis, Fotibꝫ.

Melancholiā peccante eadē indicatio  
locūm habent : Sed hūmors p̄cipazandūs erit  
q̄, quæ Melancholico hūmori accommodata  
sunt, cūmq̄ trahtentibꝫ exp̄urgandūs.

Qualis rictūs ratio in singulis conveniat,  
ex iam dictis facile colligits.

## DE PHRENITIDE.

Phrenitidis

Etymolog:

Affectus, de quo nunc acturi sumus, <sup>1</sup>  
Grecis Φρενίτις vocata, a φρέν, q̄ mentis  
significat, derivata: Teste. n. Galeno. 1. proz.  
text. 1. Phrenitum mortalis omnis appellat  
lant eam affectionem, in qua φρένας  
mentem laxam esse videant. Ita ut non  
immerito Galen: II. meth. med. 2. hūc  
affectui a symptomate denominationem  
initiam velit. et Aricen. lib. III. s̄n. 1.  
tract. 3. cap. 1.

Si quia Phrenitis sit, quā creatur; aut  
diatūr Gal: Comm: I. in lib: proz. text. 1.  
Hippocratis, inquit, continuam eam, q̄cūz  
acuta febris est dementiam, Phrenitis  
appellare videtur: et II. de Sympt. cauſ. q̄.  
Déliria omnia, tām prari motus regentis  
facultatis sunt, tām vel ex vitiis cōtra  
succis, vel eorum, q̄ sunt in certro intem  
perio. Nominantur a. ex his, quā quidē  
cūm febri sunt, Phrenitides; quā sine  
febri sunt Insanit, grec. Mania. Ac  
religia quidē deliria ex moribundibz et  
calidis orisunt succis, quālis maximus  
flava est Bilia, s̄pē etiam ex calidiori  
cerebri intemperio. Sola vero illa, quā  
Melancholica vocant, frigidū succidam  
pro cauſā habent: Quāppō Phrenitis  
non simpliciter ex calidis oetūm habet  
succis; sed hoc addito, q̄ etiam p̄flegmone  
in cerebro et ejus involucris excitat.

Itaq̄b ex locis hiscō conjunctis definit  
Phrenitis, delirium continuū cūm acuta  
febris oetūm ex inflammatione cerebri,  
et ejus membranarum. Actiūs IV. 2.  
Φρενίτις, inquit, φρενον̄ est θύετη  
tun̄ οφειλειν οφειλειν, q̄dā πονεῖται οφειλειν  
μαραχον̄

1 Phrenitis, lat: alienatio mentis, modo  
phrenitis et Phrenitis, ab eodem inven  
tiām hinc. Arab: karabitis, alias  
Persic: nōs, persis calidum.

παρεγκονήρ καὶ παρεφοεῖς τῆς διάρρηας  
ἐπηγέρσα. Sed inquit quis, quō pasto  
Aetius, inflammationem membranarum  
Galenus. a. cerebri et ejus membranarum  
inflammationem Phrenitidem esse assertit?  
quia testis Galen. de p̄lag. exp̄l. iv. g. Rg.  
Subtilis membra, quae cerebrum amplectit,  
inflammari non posset sine cerebro, imo  
ne intemperie quidem corripi, nec cerebri  
vicius sine Meningl.

DIFFERENTIÆ:

Explicata Phrenitidis definitione, per  
gimis ad ejus differentias: quazum  
prima in iupte dissunt a vehementia  
ipsius affectus. ut: Hipp. vi. Aph. 53.  
petitia, qua cum sibi sunt tūtioris; q̄  
vero adibito studio periculosis.  
secundam adducem ex temperariam ejus  
speciem addit Gal: cōm̄t. ad hunc Aph.  
ut p̄to periculissimam.

Hacq̄b vehementia, pro causa diversitate  
in uno quam altero aut intensior, aut less  
misior est: docente id Gal. cōm. in d. aph.  
et iii de loc. aph. 7. Phrenitis, inq̄t, lo  
loco, non unquam mitior est, cum sedili u  
cet a pallida Bile ortum contraxit:  
intedim vehementior, cum flava Bilez  
eam peptat: atq̄b insuper alia dementia  
occurred scirra et melanobolia, flava  
Bile praesata. Ita quidem, ut etiam  
a causa Phrenitidis hanc differentia de  
sumpta dici non iupte posse.

Secunda differentia ea est: qua deſu  
mitur a partis ipsius laborantis, cerebri  
nempe, constitutione: Ioh̄b ex Gal: cōm. i.  
in i p̄oz. text. 33. qua videlicet Phrenitis  
si alia hectica, alia non hectica dicitur:  
eadem ratione, uti febres quādam hectica,  
quæ solidas corporis partes occupant, dicuntur.  
Auditatur ipso Gal: Hoc igitur arguit

vixitatem

35. horum languer<sup>o</sup>, atq<sup>z</sup>. hæticam quondam  
est<sup>o</sup> affectionem Phrenitidis, veluti febrin  
um earum, quas ob id & hæticas appella,  
mūs. Et paullo post. Phrenitid<sup>o</sup> igit<sup>z</sup> ipsa  
ex Bilio suo generationem habent, cum  
is in cerebrū decubuerit, principio qdē  
qualitatē ipsius, tam multosse sūnt desipien  
tia, nondū tamen toti cerebri corpori p̄c  
mista: procedente vero tempore simile qdē  
piam protrahitur lanis, quā a tinctoribus  
appellatis tincturam accipiunt: tempore  
vix clivib<sup>z</sup> dicuntz, non secūs, quam quā pro  
priū ab initio colorēm habent. Talis igit<sup>z</sup>  
cerebri tinctura quāsi, desipientiam hæticā  
habet.

Tertia Phrenitidis differentia desunt  
a functionū principiū imaginationis, &  
ratiocinationis lassione. Quā ad rem mī  
diatis Gal: v de loc: aff: 2. At similia  
quōq<sup>z</sup> suffissioni accidentia in quib<sup>z</sup>dam  
Phrenitidis speciebus, affecto scilicet cerebro  
Septuaginto eveniunt solent: nra refert, utrū  
species an differentias nominaveris, nam  
simplices quidem dūa inveniuntur, ex quib<sup>z</sup>  
deinde tertia componitur. Quippe sūnt Phren  
itidi quidam, qui de ys, quā oculis offen  
suntur, recte (quantum ad sensitivam notiu  
tiam attinet) iudicant, cogitando vero a  
naturā iudicio aberrant; alij rūs copi  
tatione quidem falluntur minimi, sensib<sup>z</sup>  
tamen deformiter moventur: sūnt præterea,  
qui & sensū simil & cogitationis vito  
laborent. Dūarū priorū specierū ex  
empla refert Gal: d.l. Prioris exemplū  
est is, qui astantibus applaudentib<sup>z</sup> perim  
vitrea vasa, deinceps & pārem ex fenestra  
proiec<sup>t</sup>. His exempli eti<sup>z</sup> minuit Gal:  
de Symp. diff. 3.

Posterior

Posterioris ipse Galenus, qui cum floccos  
e vestibulis auferre tentaret non apparerent:  
id ipsum tamen se facere tentavit, cum  
ex astantibus id intelligeret. Eadem prae-  
nitidis specie laboravit Theophilus, mo-  
dicus, cuius meminit Gal: de Symp. diff.  
3. qui et disputabat, et omnes exacte non  
erat, ceterum tibiens quosdam angulare  
dormus, ubi decumbebat, decubasse, astidereque  
sonare, tum pulsari patabant.

Quarta differentia ea est, qua alia  
Phrenitis exquisita, alia non exquisita dicuntur:

Exquisita ea est, ubi inflammatione ipsius,  
laborat cerebrum excitata a Bile flava.

testio. n. Gal. comment. in 1. pecor. text. 1.

" Phrenitis, qua exquisita est, et nulli alteri  
a morbo permisets, sit enim Bile flava locu-  
s in quo princeps animae pars residet, pro u-  
t henderit.

Non exquisita duplex est, aut ratione man-  
teria, aut ratione loci sive partis affecta.

Ratione materiae, ut si a salsa pituita  
inflammatio excidetur.

Ratione partis affecta, quippe delirium q  
proximum ad utram phrenitudinem accedit, ouitz  
septo transverso inflammatione laborante. testio  
Gal: V de loc: aff: q.

Hæ precipua sunt, qua recensent Phreniti-  
dis differentias.

### CAUSSÆ.

Cauſæ hæjus mali aut externæ sunt, aut  
internæ.

Externæ sunt omnes ea, quæ aut sanguinem  
inflammant, aut ejus iam inflammati  
fluxum versus cerebrum excitant.

Internæ cœußæ aut Sanguis aut Bile  
est, ut ex antedictis cuius facilius patet,  
quoniam pro humorum diversitate, aut vehe-  
mencie,

37. mentionem aut remissionem Phrenitidem  
excitari dicemus.

### SIGNA.

Signa Phrenitidis aut sunt diagnostica,  
aut prognostica.

Diagnostica, quia presentem Phrenitidem  
designant, duo sunt, i. delirium continuum  
et II. Febris acuta. Hisq signis tanquam  
pathognomonicis vera Phrenitis cognoscis,  
et reliquis deliryis distinguis, immo etiam  
ab eo, quod septo transverso inflammatione  
laborante evenire solet, quod quamvis proxim  
me continuitate ad Phrenitidem accedit,  
non tamen omnino continuum est: Hinc  
est, quod Gal. V. d<sup>o</sup> loc. aff. 4. Quae ob  
septi transversi inflammationem accident  
delicia non multum distant a Phrenitide.  
Et eod: cap. Ab aliis partium nulla  
perpetuum delirium procedit, tempore solo  
septo transverso: cuius virtus excitatam  
delirium parum a continuo distat: adeo  
ut veteres putaverint hac parte inflam  
matione affecta homines Phreniticos even  
deret.

Qd praecipua signa diagnostica Phreni  
tides esse diximus; Delirium continuum  
et febrem acutam, quibus et alia quedam  
adenda sunt, quia Phrenitidem veram ab  
aliis deliryis distinguant.

III. Qd respiratione phreniticis sit magna et  
zara; cuius symptomatis si queratur ratio  
respondent Neoteicci, ex Alexandro. n<sup>o</sup> probl. 1.  
tardam fieri respirationem, quod laeta fan  
cultas animalis, thoracem motu obliterat,  
magnum a. fieri, quod facultas vitalis cogat  
animalem tarditatem respirationis magnis  
tudine compensare. Quia ratio si vera sit,  
ene non in Lethargo, omnibusq; soporosis  
affectibus, in quibus libera et facilis respiratio  
est,

30.

est, tarda quoq; et magna ea existit? commodior responsio ita dari possit, duo primum supponenda evint. 1<sup>o</sup> Pneumatis et spiramis, cerebrum Systoles et pleistolis moveri motibus, eadem ratione, quemadmo dūm fulmo, cum respiramis, dilatata et constringitur. 2<sup>o</sup> Phrenitidem non tantum inflammationem esse cerebri, sed et membra craniorum ejus. Quibus ita constitutis, dicimus Phreniticis, quoniamcumque aerem at tractabunt, cerebrumq; distendetur, totis tendi lacerariq; propter tumortum piam materem, ac proximam dolorum incurvem vehementem, quem, dum quantum fieri potest, vitare con nant, id est respirationem diu suppressum, postmodum detectum aeru magnitudine respirationis coguntur compensare.

IV. Hic signis dictis accedunt Vigiliae et somni difficultes: quippe secundum Gal: tu de loc:  
aff. s. non medocci, inquit, argumenta sunt Capitis et ailor et refrigeratio. Si quidem aer vigilias, refrigeratio soporem inducit. Item biliosi, calidiosi morbi, vigilias, delicia, Phrenitidas: contra pituitosi frigidios Ignavia, Cataphorae officunt. Quippe quod ad Vigiliae soporesq; per morbos pertinet, calidae rau gidae intemperies primam sibi facultatem vendicat: altera vero ab hac, qua ad humiditatem ariditatemq; refertur.

V. Pulsus Phreniticorum paevius et celerrimus est.

VI. Urina alba, ob translationem bilis.

VII. Sanguis non raro et nazibus ipsis stillat.

VIII. Ex oculis aves lacrymarum erumpunt.

IX. Lingua ipsis est salivosa.

X. Calor circa faciem et caput vehementer est Phrenitis.

Hac signa omnia ea de causa recenti, ut tanto faciliter a reliquis deliris, quia proxime ad Phrenitidem accedunt, ipsa vita Phrenitis discerni posset: aliqui ex sola delirii continuo statu

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

3. itato febreq; ardenti dignossi posset hic af-  
fectus. Diaphragmata enim affecto, non  
tantum deliciūm hoc continūtatem eam n̄  
habet, quia in vtra Phrenitidē apparet,  
sc̄q; eā deliciūm testo Gal: de loc: aff. 5.  
quod hūjusmodi vitio accidit, a Phrenitidē  
distinguitur et oculori accidentib; et soni  
guinis e nazib; stillis, atq; spirationis sp̄ci;  
quippe Phreniticor: spiratio magna est, et ex  
longis semper intervallis: contra ubi a septo  
deliciūm oritur, iniqualis, ut modo exigua sit  
atq; fætida, modo magna & angustiosa:  
Nam incipiente septi transversi inflammatione,  
prius quam delirent laborantes, exiguū ac  
frequenter reddunt spiritū: contra ys, qui  
ob affectū cerebrū delirant, magna frödit,  
raraq; spiratio. Atq; ut summatis dicam,  
veluti eorum accidentiū, quā Phrenitidem  
antecedere diximus, aut nullūm apparet, aut si  
apparuerit aliud, id peregrinum est in ys,  
quib; septūm transversūm inflammatione la-  
borare incipit, ita r̄uisūs suesum revelli hy-  
pocondriūm, septi transversi illico ab initio  
affecti propriūm indicium est: id quod af-  
fecto cerebro posterioriū accidit, non incipi-  
enti videlicet affectū, sed cum factū jam  
fuerit: atq; calor quoq; circa caput vētētna-  
tior ut et circa faciem est ys, qui ob certbei  
vitium delirant.

Diximus inter differentias Phrenitidis  
eam cōsiderare, quā hecīa vocat Gal: I. proscript  
Hipp. commēt. I. t̄xt. 33. At quo pacto con-  
gnoscit? inquit quis. Docet id Gal: d. I.  
Fit & talis, inquit, quādam desipientia species  
non raro, ut ager quietus taceat, neq; solūm  
non tumultuose exclamat, exilitatq; ut antea  
(Itaq; antea tumultuose exclamarit exilitivq;) Sed neq; proscriptus loquatur, neq; figurare decū  
bitū permittet: sc̄p̄tisq; qui ita affecti sunt,  
familiarib; prabent opinionem, quod mox sint,  
cum fiat

cùm fiat silentium, dormituri. Clausis  
 itaq; fenestris conquisiunt custodes, temu-  
 pusq; interdum longum conterunt, dormi-  
 agrum, quod neq; loquatur, neq; moveatur,  
 arbitrati; aëgeo ipso non dormient, e man-  
 nus quiete movente, non secūs, quām qui  
 per levem contrectationem aliquid vel tan-  
 gen vel inventu volūnt. Deinde his ita-  
 se habentibus, quidam clausis palpebris hac  
 agunt: & si quis accedens cùm eis colloquat,  
 quidam neq; prossimū oculos aperint, aliq;  
 postea quām aptenerunt, aut postea claudunt, <sup>et paulo post</sup>  
 aut immotos servant: Aliq; neq; si q; eos  
 inclamaverit, palpebras aperiunt. Et paulo post  
 Omnesq; quos ita affectus videam, languor  
 dum ducimq; & angustiam ac exiguum ha-  
 buerint solum; ita ut quies fieri ipsi, fati-  
 gata virtute, consiciant, qui scilicet van-  
 uidiū moveri nequeant. Quidam hocūm  
 ut manus quiete pacateq; auocent, sic et  
 brevissime loquunt: id quicq; multos latet,  
 solisq; illis patet, qui propiores facti se  
 in illos inclinaverunt: sunt autem, qui adūq;  
 proprie faciem ipsorum ponere tentant, ut ma-  
 nifeste videntur. Praterea manus motio  
 his exigua & tremula existens etiam latet  
 multos, solis his, qui diligenter inspiciunt,  
 conspicua. Hoc itaq; arguit virtutem ipsorum  
 languore, atq; hec tamquam est affec-  
 tionem Phrenitidis. Quo pasto clarissima  
 hec tamquam Phrenitidis signa describi possunt?  
 Cūm autem ad felicem curationem causas  
 cognitio imprimit sit necessaria; a qua  
 causa in hoc illo modo subiecto Phrenitis orietur  
 diligenter inquirendum erit.

Sanguine igitur peccante, præter signa  
 plenioram in capitulo indicantia, sum ante a  
 nobis

41 cūm dō dolorū capitis ageremus, relata  
deliriūm sit cūm rīsū : Bile<sup>r</sup> pīccantē  
cūm stūdio : Bile<sup>r</sup> adūsta, tūmūltūosūm  
et ferinūm. Ferinā quī vocent̄ desin-  
pientia, docet Gal: in i. proo. comm. b. s.

text. 25. In quibūs nēmp̄ regri calcitrant,  
mordicūs impīttant, et excandescēnt, eos  
qui ingrediānt̄ tangūam Hostis existi-  
mantes.

Signa prognostica duplicita sic con-  
siderāndā sīnt, quā nēmp̄ aut immūnē  
Phrenitidem, aut quā, qualem exitū San-  
bitūra sit Phrenitis, ostendunt.

Quā Phrenitidem immīntē ostendunt,  
exacte describānt̄ a Gal: i. dō loc. aff. 4.  
eaq̄ omnia aut a lōsis actionibūs, aut a  
simplici (intēmperie seu) corporis affectū  
desīmūnt̄. Ac ejus constitūtōm, ingt̄  
Galen: præcedunt̄ accidentia non paucā,  
eaq̄ omnia phrenitica indicia vocant̄:  
quā ab ijs quoq̄ omnibūs, qui mē præcessō  
rūnt̄, conscripta sīnt. Nam intēdūm  
Vigilias præcedēnt̄, sive etiam somnūm  
manifestis imaginibūs turbatūm, ut &  
clament nonnulli et exiliant, videor̄ est.  
Intēdūm vero irrationalis accedit obliquo,  
ut laborantis aliqui, cūm matellam peti-  
visserint, meiere tamē neglexerint. Aut  
cūm lotūm immittērent, matellam ipsam  
prodere haudquāquam meminerint. Inter-  
dūm majori cūm tūmūltū aut temeritatē  
respondeat̄, præsertim ubi aliquis atea fūcit  
mansūctūs. Atq̄ si omnis exiguo utūnt̄  
potū, spiratio ip̄s rara ēst et magna:  
pulsus majoris magisq̄ nervosos habent:  
nonnūquām occipūt̄ dolor infestat. Cūm  
jam proximū ad Phrenitidem accedint,

oculi

"

Prognostica  
phrenitidis  
imminētis

42.

oculi eis vehementer evadunt squalidissimi,  
aut ex altero ipsorum acris lacryma effunditur, ac deinde lippitudo innatatur;  
et vena ipsorum sanguine plena videntur,  
et sanguis stillat e naribus: quo tempore  
nihil, quod exacto ad prudenteriam pertinet  
respondent: floccos avellunt et festicas  
carpunt: atque aridior febris, cui non ita  
magna in alterutram partem mutationes accedunt, torquentur: quemadmodum  
in alijs quibusdam febribus videtur est, quo  
per vigorem quidem gravissime infestant,  
inclinationes vero habent mitiores. Adhuc  
tingua salebrosa est; nonnulli interdum  
audient falli videntur, ac interdum masti  
jacent, virginesquam respondent, atque  
dispositione dolorifica affecti, vel acris pro  
mento aliquo, eum haudquam sentiunt.

Prognostica, quia Medico observanda  
sunt in egris iam Phrenitis laborantibus,  
non ora, sed praecipua recensentur statui.

Quorum primum esto: Quibus polluenda et  
alba sunt urina, malae, puerum si in Phreni  
mitis apparent. teste Hipp. IV. ap. 72.

Galen. in comment. addit. In nullum Phreniticum  
unguis servatum vidi, in quo talis apri  
parvusset urina: idque quia extrema crux  
ditatis sunt signa, ac profundi dejectis per  
ptr morbum, ac prostratis viribus sunt  
perniciose.

Quae paucis temporibus ferocias fiunt desipientes  
entis, ferina sunt. teste Hipp. I. p. 202. f. 25.  
Et ut explicat Gal: in comment. Cum vir  
deris quicquam cum ferocitate desipientis,  
et si paullo post sollets, cognoscet mentem ipsius  
non febris ratione laoram esse, sed quia  
Phrenitica subtilitas affectio, quae post  
adulta ferina tibi videbitur.

Ferquentur

93. Frequentes in Phreniticeis permutationes  
convulsionem inducent. Hipp. i. proz. text. 27. " "  
iii. Sed quas mutationes intelligit Hipp? " "  
Symptomat: nemp? aut mitigationem, aut  
exacerbationem. Sed unde ea subita? " "  
Symptomatum mutantio? dicat quis. Quod  
humor nonum stabilis, inquit Gal: modo  
ad hanc, modo ad illam cerebei ferat par-  
tem: Ratio. a. cur convolutionem minet? " "  
Symptomatum haec mutantio, ea est, teste  
Gal: in Com: quod ex alia cerebei parte  
in aliam defluens, qui contestat humor,  
ab oib? reponatur, ut enatis ab ipso retrahit  
aliquando obrepens convolutionem inficit,  
est verisimile. " "

14. Urina exercitio in non admonitis Phren-  
iticis pernicioса. teste Hipp. i. proz. text. 28. " "  
Quod. a. hi, inquit Gal: in Com: longo de- " "  
teriis habeant, quamq? nullo pasto, nisi  
admoniti uirinam excernunt, liquore arbitrio  
in his enim servat? naturalium intellectu  
functionum una, cum uirinam in lectum tra- " "  
cerunt? aversent? . in illis autem preft & ea. " "

v. Phreniticis alba dejectio, malum. i. " "  
proz. text. 13. ob materei nemp? translatio? " "

Phrenitica vehementer tremuntia finiuntur. " "  
Hipp: i. proz. text. 9. & vehementes Phrenitides  
in tremorem desinunt; uti id ipsum satis  
patet ex Gal: in comment. " "

vi. Si in Phreniticis cum frigitatione sit  
spuitatio nigra vomitans. Hipp. i. proz. 30.  
Causam addit? ex Gal: in comment: " "  
In Phreniticis tem? substantia spuitum  
maximus idoneus, ut vomitum indicet: " "  
non. n. alias in Phrenitide, q? sicc? morbus  
est, in qua et sapientia lingua siccissima  
est, superficies in ore ipso videtur ter- " "  
nis humidas. Frigoratio. a. hunc adveniens  
vomendi humoris qualitatem offendit. " "

Quod

Quod ergo ob sp̄itationem vomitus fiet,  
quodq; ob p̄tegerationem nigra revomunt,  
licet praeuocent.

P̄enititis febricā prava admodum est,  
idq; quia ut febris febricæ cūm incipiunt  
constitui, vix solvi possunt, exquisito utro  
constituta absoluteq; solvi non amplius posse  
sic quoq; hec P̄enititis tēk<sup>o</sup> Gal. cōm. i. p̄. 22. 33.

Qui in P̄enitide manus ob vultum fuit,  
aut seūtra venas m̄lescas, aut colligit  
fistulas, aut de veste evellit pilos, aut de pa-  
rietate stipulas carpit. Id omni malum  
exitialeq; est. Hipp. l. progn. text. 23.

Ad prognosticum hoc q; attinet, P̄enititis  
in generi affectus est periculosisimis, nos  
omnis tamen P̄enititis aquo periculosa;  
sed quo magis principes functiones sedunt,  
eo magis periculum intunditur, sūti et quo  
Symptomata sunt vobisnotioria: vidat  
eam ad rem ager ir lib. iii dō morib: vulg.  
comment. 3. qui tertio dīc intergit, quod  
rarisimum est monente Gal: inde quoq;  
propter Symptomata hanc apparentia in  
Prognost: exitialtem hanc dicit P̄enitidis  
Observatum tamen a Motoricis, interdum  
tales evasit. Videlz Mercurialis: prax.  
cap: dō P̄enitidis, v. nō. uenp.

Pro causarum diversitate aut periculositate  
aut minis periculosa P̄enititis est. Unde  
a Hipp. vii. ap̄. 53. Deliratio, quia cūm rissu  
fit, tūtior: quia vero studio adhibito p̄ori-  
culosior. At vero dictum anti, eam quia  
a Sanguine est, cūm rissu esto: quia cūm  
studio, a flava bili: temerariam & audacem  
ab adusta.

### CURA.

Tandem restat, ut ad cūratioēs Sūjūs malis  
accedamus,

45 accedamus. Hac methodice uti instituatur,  
consideranda nobis sunt indicationes, quae ab  
affecto ipso desumuntur: nec tamen remedia  
ab affectu iudicata exhibebit Medicus, sed  
etiam atq; etiam perpendet, reliquam oīa,  
a quib; indicationes pertinent, ad remedij  
ab affectu indicati exhibitionem consentiat.

Afectus teia sib; se comprehendit,  
morbū, morbi causam, et Symptoma.

Morbū non nisi per ablationem causar  
tollitur.

Causa aut est evidens, aut antecedens,  
aut continens.

De evidenti in rictū ratione institū  
enda dicendi erit locū.

Antecedens in hoc affectu p̄tuit, aut  
quantitate et motu, aut qualitate & motu,  
aut omnibus simul. Si p̄iori modo  
erit indicatio, et evacuandi et revellendi.  
Si secundo, alterandi, revellendi et repellendi.  
Si tertio, et evacuandi, et alterandi, et re  
velliendi et repellendiq.

Evacuatio et revulsio statim in principio,  
in magno hoc affectu per utra sectiones  
fieri debet: Ad extremitates. n. morbos extre  
ma exquisito comparata et media optima.  
ex. I. Ap̄p. 6.

Sed cuius venae? inquit quis. Id ut  
statuatur, etiam atq; etiam considerandum  
erit Medico, scilicet revellere, an vero  
revellere et evacuare ipsi sit animus.

Si scilicet revellere velit, Cephalica,  
aut Humanaria vocatae institutae sectio.

Si et revellere et evanire, mediana:  
nisi forte in farinis a mensibus obstructis  
orientur. Sanguinis versus partes superiores  
fixio; quo casu sectio venazum Pedis  
locum habet.

Sed quā

Vena sect:

Sed quia quantitate sanguis educendus?  
 Respondet Aegineta m. 6. Quodsi vires regi  
 patientur sanguis protinus exhibito mitti  
 debet, et copiosior. Alex: Teallianus. T. 13.  
 cum dixisset in omnibus propriis phrenitidis,  
 si vires robuste sunt, et nichil aliud prohibet,  
 sanguinis subtractio adhibenda est, tanquam  
 primum omnium et maximum futurum pre-  
 sidium. et paulo post Exemplo agri a se em-  
 rati proposito, subiungit: Quia vero bis  
 sanguinem detrahere molestum est visitum,  
 ideo tantum initio evacuavimus, quantum ei  
 satis erat fidelium, etiam si secunda vice  
 iterum emissemus. Avicen. lib. m. fca. 1.  
 tract. m. cap. 3. In cura phrenitidis zeti-  
 neatur, inquit, sanguis, cum Syncopis  
 adest propinquitas. Prudenter tamen mouet  
 Aetius m. 2. ex possessione temperantium  
 esto hoc remedium, et patens minorem paulo  
 quantitatem, quam oportet, pro morbi con-  
 ditione edescendam propter plurimam dissolu-  
 tionem et lassitudinem, qua ihsis ex velu-  
 menti motione contingit.

In vena sectionis. a. adhibitione hoc  
 diligenter mouent tam veteres, quam iu-  
 centiores; ut ministri validi adhinc, qui  
 agrum contintant, utrū tuto obstrugat venam  
 nam incidentem possit: Deinde ut foramen  
 sit medievit, ne majus vulnus tardius coa-  
 lescat, minus utru crassorem sanguinem  
 retineat. et Tertio, ut fideliter ligetur,  
 aut obducatur piec, seu linamento ex aloë,  
 pilis leporis et albuminæ ovi confecto;  
 ne temeritate phrenitici dissolvatur.

Nec tantum evacuat reverberitq; Vena  
 sectio, sed etiam refrigerat: itaq; preceps  
 pilis sola qualitat, non tantum ad reuel-  
 lendum

97. lendum, sed etiam ut alteret, adhibetur:  
quo casu quoq; ad refigrantia interioris  
sumenda, si ager admittere velit, configio  
endum est.

Neq; tantum revellit fluentem sanu  
guinem vena sectio, sed etiam Clyster,  
Cucurbitula cum & sine scarificatione,  
Extremeam dolorificas Frictiones, ligatura,  
similag;

Ad Clysteris usum quod ahtinet, is non  
tantum vena sectione adhibita, sed etiam  
si qua causa eam impedit, circa venae  
sectionem tuto adhiberi potest. Andratz  
Gal: II de comp: med: s. I. i. Quodsi, inquit, "  
quippam horum, sive artas, sive virium  
imbecillitas, aut etiam ambo sumi san  
guinis detractionem fieri præpediant,  
alorum per Clysterem evacuabundis, tam ut  
superflua in ea recrementa extrahamus,  
tum ut humoris, qui ad affectas partes  
inde fieri consueverint, revellamus. Itaq;  
si nullas causas impeditant, primo statim  
tempore Enema injiciendum.

Instituta Vena sectione in brachio, in  
curatione prægens Medicus cucurbitulas cum  
aut sine scarificatione adhibet. Nam teste  
Gal: IV myth: med: 7. Cucurbita instru-  
mentum est ad violentum attractum a  
Medicis excoitationem.

Sed licet in cucurbitulis uti vena sectione  
non præmissa? Respondet Piso. Siq;  
autem Vena sectionem prohibeat, ejus  
loco cucurbitulæ cervicibus, omoplatis, tibis  
sub genâ, corris & natibus affigant scar  
ificationem. Alex: Mastaxas — cœdro  
bitulas morbi principio non convenient,  
idq; se alias ex Galeno decisissime assertit.  
Locus Galeni paulo diligentius perpenditur  
est, ut quid de hac re statuendum sit statuat.

Est. a.

Est . a. xiii. milt. med. 19. Hac ratione, in  
 quā Gal: et cūcūbitūla; strūnūm planū  
 axilium, est inventa, tām ut foras even-  
 cents, quā sūnt in alto, tām ut eximātū  
 atq; erantur, quā jam in scyrbūz abeunt  
 perūm nūdūm cūcūbitūla in ipsa partē,  
 quā Plegmonū ligetūr, inter initia n̄ est,  
 imo postea, quām totūm Corpus vacuaveris,  
 ac necessariūm sit eozūm, quā in inflam-  
 mata partē continent, aliquid edicas ab  
 erūas, atq; etiam foras versus attrahas.  
 Loquitur ex textū Galeni, uti videtis, de cū-  
 cūbita affigenda ip̄i parti inflammatione  
 laborant, ut nēmp; ex ea derivetūr eximan-  
 tur pūm humor in ipsa partē pūcans: quo casū  
 applicari parti prohibet inter initia: et non  
 nisi adhibita univerſali prīmū graduati-  
 one, ne nēmp; majori copia humor, qui  
 adhuc in motū est, versus partem affectam  
 trahatūr. Sed hoc quāeritūr, an non  
 liceat morbi initio, dūm ad hinc fuit humor,  
 revulsions causa in altera partē, quām ca-  
 quā laborat, omissa vēna sectione, uti enī  
 cūcūbitūla et Respondit Gal: cod. cap. ſu-  
 ſequētib; verbis. Genraudis. a. adhuc  
 vitijs, minime ip̄is membris, quā laborant  
 incipiunt. Sed ijs, quā continua hīs sūnt,  
 cūcūbita impōni debet, arellendi in con-  
 trariūm causa. Quō pacto posset claris?  
 Revulſe. n. uti hic omnes fatentur, ipso  
 morbi initio instituenda est. Nec est, q̄  
 regerat, cūm ad oculūm ſtrictiones  
 efficar eſt remedium dixisst, cūcūbitas  
 in occipito dixinas Gal: quōd ſubſiciat,  
 vacuari tamen totūm corpus prius ex-  
 pedit: nam si refertūm Sanguineo corpū  
 sit, in quācūnq; capitū partē cūcūbitas  
 defineris, totūm ip̄sūm impletis. Is emi-  
 paragm;

49. paragraphas de scolis loquuntur oculis inflatio  
natione laboreantibus, a quibus uti revellat  
Sanguis in occipito cunctibus adhibent:  
sed cum cunctibus sine delectu trahant, tam  
a partibus inferioribus quam ab ipsis oculis,  
quandoquidem tam partes inferiores septem  
ribus contraria sunt, quam posteriores an-  
terioribus: hinc n<sup>o</sup> caput pars princeps,  
est oculi inherent, impletus, ante usum  
cucurbitularum cervici applicandarum en-  
vacuationem totius institui jubet. Manet  
ergo revulsionis causa cucurbitularum  
usum institui posse, etiam vena sectione  
non praemissa in hoc affectu, dummodo  
applicentur parti a capite satis remoto.

Tertio loco revellunt a cerebro humorum  
rem fluentem, extremorum dolorificas  
ctiones et ligaturae.

Quacumque utrum etiam purgatio ad  
revulsionem adhiberi possit? negat Al-  
exander Plazarias, motus, uti dicit, auctoritate  
Hipp. IV. de vesc. sat. in moeb. acut. t. 22.

locis Hippocratis est. Purgans ea, quae  
inflammantur, statim morborum inter  
initia, medicamenta soluta conantur, unde  
solum ab intensa inflammataq; parte  
nihil admittunt, cum non cedat, obsequa  
turq; quae adhuc cruda est affectio, etc.

- verum ad hunc Hipp: quod attinet locum,  
is de revulsione humoris adhuc fluentis  
non loquitur, sed de ea evacuatione per  
medicamenta, quae humorum in partem in  
flammata form fixum extraheci conantur;  
ac proinde locis is non probat purgantia  
revulsionis eago adhibenda non esse.

Aly purgationes, praesertim leviores  
prescribant, utilisq; iudicant haec ratione,  
quia cum Clysters intestina exanimanter  
a capite

a capitulo revellant, multo magis id facere possimus per medicamenta alvum novetia.  
Qualia ea medicamenta sunt, passim apud recentiores descripta inventiuntur.

Causa antecedens non tantum evacunantia, derivantiaq; sed et repellentia requirit medicamenta: quia a. forma ea administrari debent, dictum, cum de bono Capitis ageremus.

Causa continens est derivantia, et resolventia et peculiariter ipsum Cerebrum expurgantia requirit.

Derivantia generalibus praemisis, non  
dum frico humoro instituantur, uti sectio  
venae frontis, quam etiam interium non  
praemissa vena sectione in brachio admini  
nistrari sibet Paulus. III. 6. Si desipiens,  
inquit, brachium non porrigit, aut si  
porrigat, metus sit secundum vacuationem  
Sanguinis profluxy, dum manum exquiratur  
in ob mentis turbationem jactitot;  
recta in fronte vena divisa, una ricio quod  
satis est, affteremus. Idem monit Alex:  
Trallianus. I. 13.

ut a. commodo hac vena secat posset, col  
lum, momento eod. Tralliano, artificiose  
fascia lanca constringendu<sup>t</sup> vas attollat.

Expedit et interdum ad derivationem  
nervis internas securi, eaq; ratione sanu  
guinem dicero. Alij venas sub lingua  
secant. Nonnulli sanguisugas fronti,  
temporibus, naso, calvariae insigunt.  
Non desunt quicq; qui ariiculas scarificant.

Hoc dum administrant, etiam resolven  
tia ac discentientia medicamenta adhibentes,  
qualia relata, cum ageremus de dolori Cap  
itis: Sed notandum, dum in nigritate  
meritis est, prorsq; humoris inflaxit, prorsq;  
afflit.

Si affluit, ipsis repellentibus resolventia  
miscentur est.

Recentiores ad resolventos humoris in  
tincti carnibus & visceribus animalium  
recens mactatorum, eaq*bus* calentia adhuc can-  
siti Phrenitido laborantis applicant.

Si forte ab iniuria materia neq*ue* revelan-  
tibus, ut q*ue* repellentibus, neq*ue* deratentibus  
neq*ue* discutientibus, caput liberari possit;  
reliquiae evacuanda erunt ss, quae secundum  
ariter caput expungant; uti Apoplegman-  
tis, Errhinis. etc.

Ultimo loco indicatio, quae ab affectu deo-  
sumit, competit hinc quod Symptoma,  
cujus non parum sic habenda ratio. Tenu-  
quent. n. Phreniticos vigilia pertinacissime.  
Eleganter Celsus. m. i. o. Omnibus sic affectis n  
somnis & difficultis, & pricipu necessari*bus* est.  
Itaque is conciliandus aut exterius admotis  
aut assumptis.

Exterius adhibentur inunctiones tempor-  
rum & nascium Ol: violaceo, de Reniphar:  
Papaveri, Unguento popule recenti, Alata  
steini: Eundem in finem Oxyrodinis w*n*  
pellentibus opidm quoq*ue* permisetur.  
Brachia cura q*ue* lavantur dicto plati-  
varum, violazum, lactucarum, Reni  
pharis, capitum Papaveris: Odores quoq*ue*  
offruntur frigidi, ex Rosis, Nicolis, hacq*ue*  
de Ca*usa* monente Celso alijs Mandran-  
gea mala pulvino subiiciunt. Confect  
etiam aliquid ad somnum, inquit Celsus,  
Silanus farta cadens.

Hic sed non sibi videntibus ad ea reveren-  
dum est, quae interius sumuntur: qualia  
sunt, emulso en Sem: papaveris, Philo-  
niu*m*, Reg: Nicolai, similiq*ue*.

Ad rictus rationem quod attinet:  
Aer sit temperatus, ut nempe aut infla-  
mationis

52.

flammatiōnēm aūgēat, si nīmīb caleat; aut evaporationēm prohibeat, si nīmīs frīgēat.

In cibo q̄nq̄s moderatio adhibenda, inquit Celsus. Nam nīq̄ implendūs aeger est, nī insaniat; neq̄ sejūnto nīq̄ verandūs est, nī imbecillitātē in cardinacām incidat. Op̄us autēm est cibo infirmo, maximq̄s soebitione.

Ad Animi pathēmata quod attinet. sū  
versus omnium, inquit Celsus, si insaniū  
entium animos geret sc̄ p̄o cuiq̄s necessarīū  
rīūm est. Quorūdam. n. vari metis. etc.  
qua apud Cels. d. l.

Utrūm vero in līcō an tenebris h̄t debet  
sēm eleganter; Tūc antiqui tales agros  
in tenebris habebant, eo q̄ ipsi contrariū  
est exterriri, & ad getūm Anīm tenebras  
ipsas constriū aliqd jūdicabant. At Asclepiades,  
tanquām tenebris ipsiis terribiliq̄, in lūmīū  
habendos esse dixit: Ne h̄tūm tū perpetuū  
est: aliūm. n. lūx, aliūm tenebrae magis turbat,  
repellunturq̄, in quib. nūllūm discriminē depīn  
hendi hoc vel illo modo posst. Optimūm  
itaq̄ est strūm̄ exp̄ri, & habet eam, q̄i  
tenebras abhorret in līcō, enīm q̄ lācem,  
in tenebris. At ubi nullūm talis discriminē  
est, aeger si vīres habet, loco lūcōd; si n̄  
habet, obſcurō tenebundū est.

Pahlīus quoq̄s monet, ill locis a picturis  
liber sit, quod ha talis dīterreant.

Ad quicquid motūm q̄ attinet, Pahlīus  
Egineta, in quietū, inquit, quoad ejus  
fieri licet, contineri debent: ita ut signis  
prædispositis aliqui fherint, per famulas  
continēantur: Sin minus, vinculis con  
stringant: nam inordinatus motio vīris  
converllit.

Lethargi  
etymon.

## DE LETHARGO.

**Ληθαργος** Grac: Veternus Lat: dicit,  
ληθαργος a ληθη oblivio, & ληθη velox;  
quasi velocem oblivionem dicas, derivatur.

Aly ληθαργον quasi pigram oblivionem  
dictam volunt, ληθη n. quasi λεπτος,  
pigrum, tardum, otiosum significat: quia  
nempe et pigeri, tardius et obliquis sunt cegri  
hoc morbo laborantes. Quemadmodum n.  
in Phrenitide somnus difficultis, prompta ad  
omnem audaciam mens est, ita in hoc mor-  
bo marcer et impugnabilis adest dormi-  
endi necessitas.

Latinis veternus dicit: quamquam  
veteri vox Apuleio pro Pthysi, Catoni  
pro Hydrope sumatur. Quicquid sit  
apud Grecos a symptomatis huic affectui  
nomen inditum est.

**Definitio**  
tanquam Symptoma,  
aut tanquam Morbus.

Symptoma, **Tanquam Symptoma definit.** Principis  
functionum ingens imminutio, cum inex-  
pugnabili dormiendi necessitate, febre con-  
tinua et lenta, propter pituitam in Cervi  
corpoce persistente.

Dico principum functionum ingenitam  
et diminutionem: secundum n. Gal: III,  
de loc. aff. 5. et ratio et memoria, et  
de synpt. diff. 3. etiam imaginatio in  
Lethargo imminuntur.

Scio quidem ab aliis per somnum profun-  
dum cum febet lenta, ab aliis per membra  
et diminutionem, immo deperditionem defi-  
nitiri, quod ista Symptomata in sensu  
admodum incurvant: fatentur tamen illi  
ipsi et imaginationem et rationem in

Lethargo

59.

Lethargicis quoque vehementer immittit, ex locis Galeni jam ante citatis; unde commodiss per omnium functiones prius et ipsum immittitionem, quam per unam tantum definitur.

Si tanquam morbus definiatur: Stan-  
tutur esse frigida & humida cerebri in  
tempore a materia pituitosa pectuscenti,  
febris lentam, principum functionum  
ingentem immittitionem, & inexpugna-  
bilem dormiendi necessitatem inducens.

Dico esse intemperium frigidam & hu-  
midam ipsius cerebri a materia pituitosa:  
Gal. enim T. proe. cōnūct. 1. tōct. 1. cū  
dixisset Phrenitidem exquisitam fieri, cū  
Bilis flava locum, in quo princeps animae  
pars residet, præbenderit: subiectum, Le-  
thargus, vero, cū locum eundem humecta-  
rit, dilueritq; pituita: Sed addo,  
pectuscenti: Gal. n. xiii. metr. mōd. 21.  
cū separatos affectus a frigide humorib;  
generari asserisset, subiectum: Phreni  
aliquando humor pituita, utriusq; cām fū-  
bis incidunt ea genera; vocatq; morbus  
Græco ῥύθαρξ.

Sed quarentur utrum Lethargus Cerebri  
sit intemperies cū humorē, an vero tumor  
mor dici debeat? Avicen. lib. iii. fū. 1.  
tract. iii. cap. 7. Lethargin, inquit, dicitur  
Apostolica phlegmaticum factum intra  
craniū. Gal. tamen, neq; quisquam  
Græcorum Lethargum tumorem est asserit.  
Neq; sane verissimile videtur pituitam punc-  
tuscentem tanta copia in cerebri subin-  
stantia imbibiri posse, ut eam in tumo-  
rem attollat, ut non simul ventriculi  
ipsius Cerebri comprimans, exciteturq;  
Apoplexia

55. Apoplexia. Statuerūm itaq; potius,  
sib; intemperie hinc morbum comprehendit,  
et exq; intemperiem frigidam et humidam  
cūn materia.

Verūm cūn in Lethargo Pittita pān  
trefcat, ac proinīd calorem concipiāt,  
et quidem talem, ut ejas pātredinis rati  
onē Febris excitetur Symptomatica, quo  
pacto frigida hūmidaq; et non potiū calida  
dicetur Cerebri intemperies?

Querūm quidem id est, febrem sic exci  
tari Symptomaticam propter Pittitā pān  
tredinem, sed lentam levemq; ac proinīd  
pātredinem istam leviorēm quōq; est,  
ac viscūs per se calidūm in consensū  
quidem trahere, sed nō cūn gradūm ca  
loris pātredine hūne hūmorēm acquirere,  
qui cerebrūm viscūs per se frigidūm, ino  
metropolin frigidū et hūmidū secundūm  
Hipp: calefacere valeat.

Sed cūn tam vehementes pātredines hic  
calor non acquiratur, qui cerebrūm ma  
nistē calefacere, febremq; satis vehementi  
tem excitare possit, quo pacto itaq; Le  
thargus morbus acutus et periculosis dī  
a Gal: com. 3. in T. dō morb: vulg: sex. 1.

Hippocratis in morbis acutis tria dē  
siderat. 1<sup>o</sup> ut infestent partem principis,  
2<sup>o</sup> ut a materia pendeant mobili. 3<sup>o</sup> ut  
conjunctam habeant febrem continuam.  
Quā omnes in hoc affectū concurrunt: nos  
enim ad continuūtatem febris vehementia  
quidquām facit.

### DIFFERENTIA.

Ex iam dictis et quās affectūs, et quāe  
pars affecta in hoc sit affectū satis su  
perq; cognosci potest.

Differentia hūijs affectūs pricipia ē  
qua distinguunt in Lethargum Verūm & Spirū  
Verūs

Verus is est, qui jam descriptus est.

56

Spiritus est, cum Capit non primario,  
sed per consensum laborat: ita Gal: vii  
de usu partium. Qui novit facultatem  
anima ratiocinatricem esse in Cerebro:  
Deliria, Phrenitidas, Lethargos, manias,  
Melancholias intelliget accidere, cum con-  
zervum aut prima ratione, aut per con-  
sensum afficitur.

### CAUSSAE.

Ad causas hujus mali pertinet, ex  
aut sunt Externae seu evidentes, aut In-  
ternae.

Causae externae primum sunt ea, quae  
cumque Pittuita copiam in corpora produc-  
unt, sive frigidus, humidus et crassus;  
Cibi viscidus, lenti, pittuitosi; faciens  
Mytilorum, ostacorum, pisicium effusus:  
vita otiosa; Somni longiores; Nimirum coru-  
peris repletio. Obvius n. Calor nativus  
minus proba ingesta concoquit.

Deinde et ea causae externae hujus  
mali accedunt, quae pituitam jam congre-  
stem in pitredinem conjiciunt: Ita  
Austerina constitutio, ipsaque consistens etas,  
qua mense ad declinationem obigit, inter  
causas hujus mali evidentes statuntur:  
Austerina constitutio: quemadmodum enim  
quotidianas tempestates Aquilonia cogunt  
corpora firmaque mobiliora item, expi-  
ditoraque et coloratione atque auditu valen-  
tiora reddunt; ita austerina eadem solvant  
et humectant, auditum hebetant, caput  
gravant, tarditatem et languorem corpori  
hus deferunt: ac proinde non mirum,  
si ad pitredinem humorum multo faciat.  
Ita quod in consistente etate jam inclin-  
ante

Causae

externae  
pituitam  
producents

productam  
pitredinum

Auster,

etas consist-  
entes.

57. nantu Letbargi siant: Hippocr. testatur,  
(M. ap. 30.) Ultra juvenilem etatem prouisii " "  
Ais, inquit, Asthma, Pleuritides, Peri, " "  
pneumonia, Letbargi, Pneumonias, ardentes " "  
Febris, diuturna alvi profluvia, Cholera, " "  
Difficultates intestinorum, Cruritatisq; eo, " "  
vindem, e? Hemorrhoides accidunt, " "  
Quod autem, cum hic Aphorismus con-  
sistentem etatem inter causas Letbargi  
statuit, intelligi debeat ea consistens etas,  
quae iam inclinat, patet satis ex Gal: in  
Comment. Febris, inquit, Letbargica sunt " "  
ex humoris pituitoso in cerebro asper " "  
vato: qui prioribus quidem atatibus par- " "  
cior potius est, quam redundantior, in " "  
senili utro atatu plurimus habetur, sed " "  
propter atatus frigiditatem febris non ac- " "  
cedit. In quibus a. etatis fervor e? " "  
vigor elongescit, ejusmodi etiam abundat " "  
humor, necdum frigidum corpus est. Hoc " "  
etius Gal: At vero quinam sint i?, " "  
in quibus etatis fervor e? vigor elongescit, " "  
e? necdum frigidum corpus est? Si quin  
quidem consistentem etatem agunt, sed ias  
inclinantem: Consistens namq; etas, q  
inventum sequitur, proxime ad temperie  
juventutis accedit, quia autem ad senectutes  
abit, ejus quoq; temperamentum participat.  
Inter causas evidentes remedia Pueri  
tis nimis resistentia nimiumq; hypo-  
notica quoq; resensent.

interna. Causa hujus mali interna, humor in-  
tuitus patiens est. ut iam ex Galeno  
probatum.

### SIXTA.

Signa diagnostica hujus mali ma-  
xima ex parte in definitione quoq; tradita  
Sunt

Signa-

Sunt autem haec. 1.º Febris continua &  
lenta. 2.º Somnus profundus & inevitabilis  
dormiendo necessitas. 3.º Omnimodum  
operationum principium imminentia. Quod  
cum symptomatum causam si velimus:  
consultamus Gal: III. de loc. aff. 5.

59. Diagnosticus  
1.º II. m.

Hipp. III. de morb. p. 980: Lethargi quidem  
morti constitutio eadem, q. e. "Inflammatio"  
Pulmonis, Peripneumonia dicta.  
Gravier tamen, etc.

4.º Hisce additum quod pulsus lethargicorum  
similis. Peripneumonicorum sit, magni  
tudine, imbecillitate, mollescere; sed eo  
tardior, raroque, ac minus inaequalis, in  
termittens potius quam intercurrentis, teste  
Gal: IV. de causa puls: 13. Causas horum  
pulsuum videre licet eodem capitulo.

5.º Urina veluti sumentorum, crassa, turbida,  
pallida, propter putrida peccantis copias.

Horum Signorum si quis meminerit,  
poterit eorum interventu & lethargum con  
gnoscere, & facile ab alijs soporiferas affectus  
bus distinguere.

Signa hunc affectionis praesagientia sunt,  
1.º Capitis gravitas. 2.º Pigritia ad motum.  
3.º Insignis propnsio ad somnum. 4.º Debilitata memoria & ratio. 5.º Tremor capitis.  
6.º Dolor capitis continuus & gravans.  
Quibus si causa evidenter jam aucto relata  
accedant, non parvam imminentis lethargi  
suspicionem novent. Quidam teste Celso  
III. 20. acutum hoc malum sit, et nisi sicut  
currat, celeriter fugiet, ut Medicus per  
nocebat posset, atnam evanescens sit ager,  
nec n.º morbi & vixi compunctionis  
institutus necesse est. 11.º Et hoc sciat, Ita  
dies VII Lethargicos ut plurimum mori, quos  
si evaserint non parvam affligeret salutis  
spem. III.º Tum & summi periculi mintus  
est.º Tremoris in Lethargo, ut et.º Vigore moro  
vo circa caput sudorem frigidum.

Prognostica  
imminentis  
1. 2. 3. 4.  
5.  
6.

Salutis &  
mortis.

1.  
II.  
Hipp. III. de morb.  
P.  
III.º VII. ap. 21.  
IV.

CURA

CURATIO.Cura

Ad curationem huius mali quod attinet,  
Causa primum evidentes praecedenda sunt;  
deinde etiam antecedentes continentiaq; non  
ferenda. Namq; ista fiunt etiam atque  
etiam symptomatis, somni nempti ratio  
habenda. De causis evidenter dicens  
omnes, ubi ad victimam ratem pervenerimus.

Causaanteced:

Causae antecedenti evanescantia, repellentia,  
repellentiaq; conveniunt. Nam  
ad rem videtur Gal: xiiii. metr. med. 2.  
de quibus remedys abunde satis dictum  
fuit in precedentibus. Id nunc tantum  
investigabimur.

Vena sect.

Utrum in hoc affectu conveniat Vena  
sectio. Eam Gal: d. l. manifeste prescribit.  
At vero, inquit quis, manifeste ante dictis  
ab humoris pituitoso interruptum Cerebri  
frigidam humidamq; inducentem, ejusq; sub-  
stantiam dilatentem, eaq; simul patescere  
Lethargum produci; quo pacto itaq; Vena  
sectio locum habere potest? Cum is humor  
neq; Vena sectione evanescari, neq; revelli  
possit. Rg, Causae antecedenti, non  
autem continent adhiberi Vena sectionem.

Cum itaq; in venis pituitosus frigidusq;  
magna copia continetur Sanguis, is humor  
sozi quoq; copia versus cerebrum fertur,  
und in Cerebro quoq; longe pituita con-  
pessor generatur. Si itaq; Vena sectio  
tanquam evanescans et revellens adhibetur  
remedium. Idem quoq; de medicamentis  
repellentibus dicendum.

continentia

Causa continens, quo pacto, acroteribus  
Apophlegmatismis, Palati illitionibus, Sttr.,  
nuntatoris, Erubinis, et solvientibus discen-  
tientibusq; medicamentis, Setou, Cantorio,

Cucurbita

Cū curbitūlis collo adhibitis eracienda sit,  
etiam ex superiorib[us] abunde patet, pru-  
terquam quod in hoc affectū etiam ad  
Sinapism[is] tōuso capite deveniendū.

Ea quoq[ue], quā preparandi pituitam facil-  
tatem obtinent, aceto incoquendo, odorib[us]  
eorū & vapores naribus recipieudi:  
Eadem preparantia per os quoq[ue] exhibenda,  
Postmodum pituitam purgantia subiungenda.

Sed a somno praecipit[us] excitandi agri-  
sis præsertim temporib[us], quib[us] febris le-  
vissima est. Id quo pacto faciendū, ele-  
ganter Celsus. m. 20. Hos agres quidam  
subinde excitare nituntur, admotis his,  
per quā sternūtamenta evocant, et his  
quā odore foedo movent, quālis est Piz,  
cruda, lana succida, Piper, Veratrum,  
Castoreum, Acetum, Allium, Cepa: fixa  
etiam Galbanum incendant, aut Pilos, aut  
cornū cervinū. Si id non est, quodlibet  
aliud. Hac n. cūm comburint, odorem foen-  
dūm movent.

Quo pacto Opiniām excitarit medicus  
videtur Horat. II Sat. 3.

Victus ratiō tota attenuari sit & in-  
cidens; Aer cubiculi alteris odoramentis  
ex Castoreo, Galbano, Pulegio, Tymo,  
similibusq[ue].

Symptomatici

Dicta.

## De MELANCHOLIA.

Melanchol:

Etymon.

Melancholice vox non uno sumitur si  
gnificata: Interdum enim pro ipso humorē  
melancholico, quarta massa sanguinea,  
parte, quā proprieter ~~ter~~ ter ter ter ter  
succus melancholicus dicitur, humor int̄m̄  
frigidus & secus, naturalis tamen & benignus,  
sed crassus, faculentus & niger, sarcinans  
mistus ad corporis nutritionem: Interdum  
pro humorē seu potius examento melancho-  
lico a Liem⁹ attracto: Interdum pro  
affectu, de quo in presentiarum actūri  
sumus: Cui a causa denominatio  
tributa est. teste Gal: II. metb. med. 2.  
m. ad loc: aff: 7.

Est autem Melancholia delirium  
sine febre, cū timore & moestitia, sine  
causa manifesta. teste Gal: II. de Sympt:  
caus. 7. m. ad loc: aff: 7. & Comm: ad  
vi. apb. 23. Auctio quoq; ipse Hippocrate  
vi. apb. 23. Si metus atq; mastitia, " "  
inquit, longo tempore perseverent, ne  
lancholicum est signum. "

Cum autem p̄r delirium definimus,  
tanquam Symptoma definimus. Sed  
ad quod Symptomatum genus referri debet:  
Quod ad actionem lassam, & quidem depar-  
ratam referendum sit hoc Symptoma ipsi-  
us facilitatis principis, non est quod in  
dubium vocetur: Sit cūm facultatis perin-  
cipis tres numerantur a Galeno: atq;  
ex eo probatum quoq; sit anti, cūm de  
primentiō ageremus, posse imaginatio-  
solam affect, ratiocinationē illa se posse  
itidem ratiocinationē illa se imagin-  
nationē, posse utramq; simul laeti-  
tari et doc, Utrum sic sola deparat  
lædat;

laudatūz imaginatio, utrūm vero sola  
ratiocinatio, utrum utraq̄ simul?  
Quod Imaginatio in hoc Symptome de/  
privata laudatūz patet satis ex Galeno

ii Ad Symp. caus. 7. Melancholica vero  
delicia, inquit, multazūm sūnt Speciemūm,  
ex corruptis scilicet Speciemūm imagina/  
tionib⁹. Quod tamen et ratiocinatio  
in hoc affect⁹ non raro quoq⁹ depecaets,  
ex quotidianis setis patet Exemplis: imo  
quoq⁹ ex ipso Galeno, iii de loci affect⁹ 7.

Quo loco cūm dixisset Melancholicos tin  
mor nūquām defēgit, ita prater naturā  
eis visa per imaginationem, non semper  
codem generi continent. Subsistit tamen  
quosdam etiam alieno admodum atque  
extranto videbis animo, utpote qui  
simul et mortem metuant, et tamen  
mortem sibi conscient. Quo pacto  
autem quispiam tam extranto animo  
est potest sine rationis lesionē? unde  
Avicenna iii. fin. i. trait. q. cap. 20.

definiens melancholiā, eam dicit esse  
mutationem existimationum et cogita/  
tionum a cursu naturali ad corruptionē  
nem et ad timorem, etc. Quāquam  
non perpetuo utraq⁹ laudatūz; sed sola  
intervallū imaginatio, ratione satis pro/  
prio officio suo fungent⁹, imo ea, quā  
imaginatio sufficerit, deliramenta  
melancholica esse iudicant⁹.

Quām. a. omni⁹ Symptoma a morbo  
proficiuntur, quīnam est morbus pa/  
mario affect⁹ cerebro, qui hūs⁹ sympto/  
matis causa existit. Ad quod quān/  
sitūm adducatur Gal: iii. de loc. aff. 7.  
Crasji humoris, qui in Cerebri substantia  
abiorūt

63. abundant, interdum ut instrumentum, " tali, interdum ut similari parti nocent: " cum enim meatus obstruantur, ut in strumentali: cum vero temperamentum alteratur, ut similari. <sup>Proinde</sup> totus sic sermo in fine vi de vulgaris morbo: prescriptus est. Melancholici magna ex parte Comitiali morbo aet, " sicutur, et contra morbo Comitiali laborantes efficiunt Melancholici. Atque horum utrumlibet magis accidit, prout in hanc vel illam partem infirmitas reperit: Si enim in Corpus Epileptici, " Si vero in mentem Melancholici rediuntur. Hoc sermonem quidem primum declaravit, quod non semper, " sed magna ex parte horum affectuum alter in alterum transit: Quippe non solum melancholicus succus, verum etiam Pittuitosus morbum Comitiale com mittit. Igitur is, quem Melancholicus succus constituit, in Melancholicum transit: qui vero a Pittuitoso partus est, in aliam affectionem, de qua paulo post dicturam sum, permutat, Melancholicam vero huiusquam efficit. Altera vero Hippocratici sermonis pars, non parvum contemplandi locum desiderat, Quippe cum anima sit aut temperamentum activarum qualitatum, aut ab ipsarum temperamento alterata, Bilem, cum cerebro veluti parti instrum mentali nocet, ad cerebri corpus con verti ait, id quod in obstructionibus facili constat: cum vero temperamentum mutando, ei ut similari nocet, ad mentem eam repere dicit.

Locus

Locus Galeni elegans, ex quo luce  
meridiana clarius patet, morbum ex  
quo Melancholica Symptomata oriuntur  
intemperitem esse: Sed qualem? Don  
cuit id ipsum codem Cap: Galen: vestis  
precedentibus: Si in praesentia non obli-  
viscamur, pituitosos quidem eos non  
minare, cum simplicitate ita dicimus, in  
quibus frigiditas humiditasq; Melan-  
cholicos vero in quibus siccitas atq;  
frigiditas dominatur.

Symptomatum itaq; melancholicorum  
causam statuit Galenus intemperitem  
frigidam siccangis ipsius Cerebri, si can-  
put primario laboret affectu.

Atq; cum metus et mastitiae si  
longo tempore persistverent, Melanchon-  
licum sit signum: Quicritur quo pacto  
humor Melancholicus istorum Sympto-  
matum causa existat, utrum sua in-  
temperie, an vero atro suo color? Gal:  
m. ad loc: affect. 7. manifestissimis verbis  
assevit atro suo colori melanocholicum siccans  
duo ista Symptomata excitari: eadem ratione  
quemadmodum tenebra extrema timorem  
tristitiamq; bonitati inveniunt; idem assevit  
Avicenna loco ante citato.

Excutienda nobis nunc ea controver-  
sia est, utrum metus et mastitiae in  
melancholicis ab atro humoris melancholic  
orientur colore, nec ne? Diximus Gal:  
ii de Sympt: caus: 7. et m de loc: affect: 7.  
manifeste id ipsum asseritur. Contea q;  
Galeni opinionem disputat Averrhoes, cuius  
argumenta videantur apud neotricos; ut  
Massar: H. Mercenari: ceterosq;  
Argum.

63.

Argumentis ipsius respondent Galeni mentem non satis percipi ab Averroed: ac proinde Galeni mentem explicant hoc ratione, quod cum spiritus animales instrumentum sint ipsius animae ad functiones actiones ipsius peragendas, ypsi, limpidi, non autem suriosi, nigriq; esse debeant: ac proinde hinc melancholicorum sequitur metum et tristitiam; quod nigrities humoris melancholici contaminant et obscurant puritatem et splendorem spiritus animalium. Secundum quo pacto hoc duo symptomata nigritem humoris melancholici sequuntur, non satis video, quantum explicare conentur auctores Galeni mentem. Certum enim est actionis passionem Symptoma est; Symptoma a. sequitur morbum eadem ratione, qua umbra corporis: protrecta causam morbi non latet actionem, nisi interventu ipsius morbi quae enim vera sint, quo pacto nigritys humoris melancholici contaminans spiritus animalium horum symptomatum esse existit: cum ex ipso Galeno clarissime monstratum sit, morbum, quem melancholica sequuntur symptomata, intemperie cerebri frigidam siccacantur esse, Tunc ductam ab humoris melancholico, non quatenus niger est, sed quatenus frigidus siccusq;. Statuerimus itaque potius videtur ab intemperie frigida siccansq; hoc Symptomata produci, quam ab altero hujus humoris colori.

### DIFFERENTIA.

Principia Melancholia differentia sunt, quia desumitur a loco primarij affectu, cuius minimis Gal: III. de loc: aff: 7. statu,

statuitq; triis est<sup>o</sup> Melancholia species;  
Prima, q̄ia Sanguine, q̄i est in toto  
corpori nona vacante; solus sanguis q̄  
in cerebro est, melancholicus redditur.

Secunda, in q̄ia Sanguine universo,  
q̄i est in venis, redditio melancholico  
cerebrum quoq; in consensu trahitur.

Tertia in q̄ia non a toto corpori,  
humor melancholicus, sed ab Hypochondriis  
vapores melancholici versus caput ferunt.

Innumeræ possent statui Melancholie  
differentiae, pro varietate ipsius imagina-  
tionis passionis: namq; ut Galen<sup>o</sup> legit<sup>ur</sup>  
U. de Sympt: caus: 7. Melancholica delicia  
multarum sunt specierum; ex corruptis sc.  
speciatim imaginationibus: Sed cum via  
illa admodum varient, nihilq; ad curatio-  
nem faciant, eas differentias recenser<sup>o</sup>  
non admodum est necesse.

Solent et differentiae hujus affectus re-  
censeari a magnitudine ejus desumpta: In  
alys enim sola imaginatio, in alijs cùm  
imaginatione ratio quoq; traditur.

### CAUSSÆ.

Ad Causas quod attinet, eo sunt aut  
externæ seu Evidentes, aut Internæ.

Evidentes qui videar<sup>o</sup> volet, eleganter  
eas descriptas videt apud Fern. U. Pathol:  
6. quæ sic transcriber<sup>o</sup> non est necesse.

At vero, inquit q̄is, Fernelius eo loco  
Item & Cor frigidum secundumq; Melancholiæ  
statuit causam, cùm tamen Galenus  
asserat Comment. III. ad III Epis: text. 70.  
Quibus multis & calidius sanguis generat,  
prompte in Melancholicorum humorum  
hos vitiis

Causæ,

Externæ,

Objet.

67 hos vitium devinire. Et in loc: aff: 7.  
agens de causis melancholia primaria  
sunt hujusmodi melancholicæ speciem afo  
fecto prius calidis dispositionibz cerebro,  
aut astratione, aut phlegmonosa passio  
ond, aut etiam pueritidz, interdum  
nro a sollicitudine, mœstitia cum vigi  
llys.

Ag. Respondemus causas melan  
cholicæ esse duplices, aut per se, aut per  
accidens: Per se cum melancholia hui  
usmodi frigidus siccusqz sit, cum quoqz fri  
gida siccusqz partium intemporeis prodū  
cat nescio est. Per accidens, cum  
consumpta propter calidam partium  
dispositionem humorum humiditatw,  
simil quoqz humorum calor immunitur,  
relinquiturqz tandem humor frigidus  
siccusqz: Hoc est q Galenus, dicit,  
Com. 3. in M. Epid. Text. 71. deustam di,  
uternitate crassam materiam in me,  
melancholicum transisse excrementum.  
Unde mirum inter noctricos est, qui  
ascerant generantes causas internas  
melancholicæ semper esse calcificantes,  
ut Hepatis, Cordis, totius corporis Ven  
triculi, Capitisqz caliditatem.

Interna. Causa Interna est ipse humor  
aut vapor melancholicus.

Humor. a. vel in ipso Cerebro genit  
ur, ab causas jam dictas ex Galeno,  
aut ex ipsis venis Cerebro communicat,  
in ijs autem copiosior continetqz humor  
ob causas evidentes jam relatias.

Quod si a. crassis hic humor mesen  
teri vascula, partesqz in Hypochondriis  
continen,

contentas obstruat; tunc ex ijs locis  
vapores siccum melancholici versus cerebri  
tunc seruntur, idq; non aliter, ut si hunc  
melancholicus in cerebro continetur,  
afficiant.

### SIGNA.

Signa

diagnostic;

Signa hujus affectis diagnostica  
in definitione a nobis tradita quocq; sunt.  
Hoc est Metus et mastitia sive causa  
manifesta. Dq; ex VI. ap. Hipp. 23.  
Si metus atq; mastitia longo tempore  
perseverent, melancholicus est signum.

Sed cum ad curationem omnino non  
cessariam sit sciens, atrum Melancholia  
sit primaria, num totius corporis niti  
ssat, an vero Hypochondriaca sit: quibus  
haec species Signis distinguuntur? Docet id  
ipsum abunde Galen. III. de loc. affect. 7.  
qui videat.

Reliquaq; Signa vis  
deant apud Frenel. d. I. percurrente nim  
mizum in tuto corpore melancholia.

Ad Prognostica quae attinet.

I. Illi ad hoc malum proclives sunt, in  
quibus causa, quas melancholicum han  
mizem producere diximus, apparent.

II. Melancholia primaria facile aut  
in Convulsionem, Epilepsiam, Apoplexi  
iam, aut Maniam mutatur.

III. Si Melancholicis Hemorrhoides aut  
varices supervenerint, solvits malum.

IV. Invenitata melancholia difficilime  
cureatur.

Prognostic:

i.

ii.

iii.

VI. ap. 21.

iv.

### CURATIO.

Uti metodice melanholia cures,  
ab affectu ipso indicatio desumenda.

Affectus

Affectus tria comprehendunt, Morbum,  
Morbi causam, & Symptoma.

A causa ablatione incipienda est  
cureatio, Evidentes quo pacto tolli  
debeat, tamen dicimus, cum quæna ratio  
ratio in hoc malo observanda sit non  
convenit.

Cum a. tres melancholia sint dif-  
ferentia.

