



Plantarum Belgii confoederati indigenarum spicilegium, quo Dav. Gorteri viri cl. Flora VII provinciarum locupletatur

<https://hdl.handle.net/1874/425032>

Botanisch Museum en
Herbarium - Utrecht.
Lange Nieuwstraat 106

PLANTARUM
BELGII CONFOEDERATI
INDIGENARUM
SPICILEGIUM.

PLANTARUM
PERI CONFERATI
INDIGENARUM
SPECIEUM

PLANTARUM
 BELGII CONFOEDERATI
 INDIGENARUM
 SPICILEGIUM,

Quo DAV. GORTERI viri cl. Flora vii. Provinciarum locupletatur,

A U C T O R E

STEPHANO JOANNE VAN GEUNS,
 MED. ET PHILOS. CAND.

Nemo reprehensus qui e segete ad spicilegium relinquit stipulam.

C A T O de re rust. L. I.

HARDERVICI
 APUD JOANNEM VAN KASTEEL, 1788.

ПЛЯТИАЛ

ДЕЛЕИ СОНКОДЖАКАТА

ИНДИЕНАРУМ

СПЕЦИЕИУМ

60 Dv. Gattari acq. de Pisa al Pro.
Alcuni libri sottoscritti

СЕРГИАНДОЛОНИЕВАН ОЕННІ

Л. Ф. в. в. в. в. в. в.

в. в. в. в. в. в. в.

в. в. в. в. в. в. в.

в. в. в. в. в. в. в.

P A T R I

A M A N T I S S I M O

MATTHIAE VAN GEUNS,

MEDICINÆ DOCTORI, EJUSQUE IN ACADEMIA
GELRO-ZUTPHANICA PROFESSORI PRIMARIO,
PRAXEOS AUTEM ATQUE OBSTETRICIÆ, NEC
NON BOTANICES AC CHEMIÆ ORDINARIO,
REPUBLICÆ GELRO-ZUTPHANICÆ AR-
CHIATRO, PLURIBUS DENIQUE ERU-
DITORUM SOCIETATIBUS VARIO
NOMINE ADSCRIPTO,

VITÆ SUÆ AC STUDIORUM DUCI
FIDELISSIMO,

PRÆCEPTORI OPTIMO,

HOC OPUSCULUM,

ANIMO PIO AC GRATO

A U C T O R

D I C A T.

«ОКИДА ОЛОТЧЕСКАЯ»

MINISTRIES DON
OTAWA OR OTTAWA

S O T D U A

PRÆFATIO.

Septem fere anni effluxere , e quo
Plantarum patriæ nostræ indigenarum in-
dicem illum in lucem emisit David de
Gorter , vir cl. , quem *Floram vii Pro-*
vinciarum Belgii foederati indigenam
Vocavit. Qui liber , natus ex alio qua-
tuordecim annis ante hunc edito , titulo
Floræ Belgicæ , ejusque Appendix &
Supplementis , curâ ultima cl. Gorteri ,
accedente etiam ope plurium in patria
Botanophilorum , perfectior sic & casti-
gatior prodiit .

Utraque autem hæc Flora vel ideo
Plenior esse credenda est in recensione
stirpium Gelricarum , maxime vero ea-
rum , quæ circa Hardervicum vegetant ;
tum quod Gorterus ipse in hac regione

& urbe præcipue vixerit, rei herbariæ operam dederit, eamque, ipso etiam Linnæo duce, excursionibus botanicas perfecerit, maxime quando docendi etiam munus dein accessisset; cuius quidem diligentia testis est particularis hujus regionis plantarum notitia, quam A. 1745., titulo *Floræ Gelro-Zutphanicæ*, edidit, & *Appendice* A. 1757. auxit: tum quoque quod revera Hardervicenus ager *Floræ* indigenæ divitiis adeo spectabilis sit, ut magis locupletem harum naturæ opum thesaurum in alio hujus regionis, & vel Belgicæ universæ, loco vix reperiri posse, censeamus.

Itaque quum ultimum edita illa, de qua dicere incepi, Gorteri Flora eo fere tempore prodierit, quo ipse inter Medicinae tirocinia, fideli Patris mei ductu atque instigatione, ad botanica quoque studia animum appuli, eademque, usu horti nostri Academici, egregie instructi, lubens excolui, his naturæ deliciis captus, non alio duce magis idoneo, quam

Gorteri hoc libro, uti me posse credidi, ad investigandas, etiam ipso natali in solo, plantas sponte apud nos crescentes.

Eo autem tempore suspicari vix poteram, vel in agro nostro Harderviceno deprehensurum me esse stirpes, quæ acutus illos Gorteri, ne dicam Linnæi, oculos fugissent; quamvis viri diligentissimi modestia spem talem, maxime quo ad cryptogamicas plantas, semel iterumque aluerit (*). Contigit tamen brevi, ut in unam alteramque plantam incurrerem, in Flora illa VII Provinciarum non notatam; qua quidem observatione excitato, plurimum detegendi desiderium continuo augebatur.

Neque juvenilem hunc impetum successus retudit. Crescebat enim indies repertarum stirpium, quibus Gorteri catalogus suppleri posset, numerus, ita ut, quum ad centenarium jam hic accessisset, animum facile subierit cogitatio,

(*) Vid. *Flor. Gelro-Zutph.* præf. pag. penult., item *Flor. Belg.* præf. pag. xiv., & *Flor. vii. Prov.* præf. pag. ii.

¶ * ¶

stirpium harum novarum notitiam aliquam in lucem aliquando edendi, & Floram imprimis Gelro-Zutphanicam amplificandi plena stirpium omnium, quibus agrum Hardervicenum natura instruxit, recensione. Solus enim hic ager auctarium illud Floræ mihi hactenus suggesterat, ipsiusque divitias, modo lundatas, tantas porro deprehendi, ut planitarum circa hanc urbem crescentium numerus mihi pedetentim ultra 800 auctus fuerit, atque inter has vel 250 occurrerint, quarum nullam in Flora Gelro-Zutphanica, ejusve Appendice, (quibus tantum stirpes 580 vere indigenæ continentur), mentionem fecerat cel. Gorterus.

Tam eximiam ergo Floræ fœcunditatem, qua dulcis nostra musarum sedes, Hardervicum, ad suum imprimis agrum botanophilos allicit, ecquis plena dignam non putaverit enarratione !

Hanc autem dum deinceps forte paratur sumus, nunc id prius agendum duximus, ut spicilegio hoc illas tantum of-

ferremus plantas, quæ a Gortero, inter plantas septem patriæ universæ regionum indigenas, non fuere commemoratae. Quo titulo igitur nunc 150 recensemus plantarum species, quibus Gorteri illa ultima Flora ditetur & suppleatur.

Scilicet, post primas illas meas in agro Harderviceno excursiones botanicas, in aliis quoque pluribus, & Gelriæ & aliarum provinciarum, locis, plantas indigenas dein investigandi, ultraque etiam a Gortero omissas reperiundi, occasio non defuit.

Neque defuere aliena ad hanc messem alteram subsidia; quo loco mihi inprimis laudandus est cl. Frid. Ehrhart, Botanicus regius Hannoveranus, oculatissimus plantarum, præcipue minorum & obscurarum, scrutator (*), idemque indo-

(*) Testari hoc possunt tum bene multæ, quas detexit, novæ plantarum species, a Linnaeo fil. & Hedwigio operibus suis insertæ, tum varia ipsius viri cl. opuscula, inter quæ *Phytopinacem Luneburgensem*, & *Colleganea ad Historiam naturalem* (*Beiträge zur Naturkunde*), quorum jam tria volumina prodierunt, sufficiat nominasse.

lis ingenuæ candore , ac morum vitæque simplicitate venerabilis. Hic enim vir eximius , quando , aliquot abhinc annis , iter suum botanicum pedestre ad quasdam etiam Belgii regiones extendisset , hortumque nostrum & nostras oras diligenter visitaret , in Patris mei amicitiam venit , mihiique adeo ducem se & comitem facilis dedit , quocum agros nostros et suburbia perquireret. Quo factum est , ut et primus ille meus botanices amor ultra exarserit , et ipse , quod gratus commemoro , ad examen cryptogamicarum aliarumque cognitu difficillorum plantarum , in quibus Gorteri opera plurimum deficit , aptior evaserim. Ehrhartus igitur , quum , in ipso hoc itinere , plures a Gortero omissas plantas in Belgio invenisset , brevem earum enumerationem dein in *Promptuario Hannoverano* dedit (*) , nostratis tamen vix notam. Hanc itaque opusculo nostro inseruimus , prout*ī* laudata a nobis Ehrhar-

(*) *Hannoverisches Magazin* 1783 , 12 - 18 Stück.

ti auctoritas, plantas illas, quae ab ipso repertæ sunt, indicat.

Secutus fui in hoc libello ordinem atque rationem Floræ Gorterianæ, ut ipsi messi spicilegium eo melius accommodarem. Plantas igitur meas disposui ad methodum Linnaei, & hujus viri summi characteres specificos, subinde tamen ad naturæ observationem mutatos, singulis adscripti ex ultima, quam ill. Murray curavit, *Systematis Vegetabilium* editione. Plura quidem variorum auctorum synonyma Linnaeano nomini & characteri, Gorteri exemplo, addere, facile profecto fuisset: sed ratum habui his libelli molem non augere. Dum enim tironibus talia synonyma majorem ferre parere confusionem solent, quam veram illustrationem, rei herbariæ periti hæc facili opera, si tanti rem faciant, ex *Systemate Plantarum* Linnaei a Cl. Reichenbach edito, quod omnium teritur manibus, eruere poterunt. Illis vero stirpibus, quas recentissimorum auctorum industria ab eo tempore detexit vel extricavit, præ-

fixo asterisci signo distinctis, nomina impo-
sui & characteres auctorum illorum, qui
primi illas Linnaeana methodo definive-
runt; atque his solis, quum in *Systemate
Plantarum* non reperiantur, selecta quo-
que aliorum botanicorum synonyma ad-
denda esse duxi. Quia denique una etiam
alteraque plantæ species hic a nobis pos-
ita sit, quas frustra tum apud Linneum,
tum apud alios auctores botanicos que-
fivimus, has ipsi definire pro virili de-
buimus.

Quod superest, quæ huic opus-
culo desunt suppletæ etas, & si quæ di-
eta sunt juveniliter, pro indele accipian-
tur (*).

Dab. Hardervici, Id. Sept.

MDCCLXXXVIII.

(*) Quintilianus *Infl. Orat. L. xii.*

PLANTARUM

81

VII CLASSIS XIX

BELGII CONFEDERATI

А И У є О И О М

INDIGENARUM

SPICILEGIUM.

EX CLASSE II

DIANDRINA

MONOGYNA

VERONICA floribus solitariis, foliis digi- *verna*.
tato partitis, pedunculis calyce brevioribus.
Linn. Syst. vegetab. gen. 25. spec. 36.

Op zaailanden aan de Zandsteeg en elders
by Harderwyk.

EX CLASSE III
TRIANDRIA

MONOGYNIA.

- fusca.* 2. **SCHÖENUS** culmo (subtriquetro) folioso, spiculis subfasciculatis, foliis filiformibus canaliculatis. *Syst. veg.* 65. 5.

By Hengelo en Venbrug in Overyssel (Ehrhart).

Op veenachtige lage heide-velden by Harderwyk.

Distincta omnino videtur species a sequente, quam cum tamen conjunxit Hudsonius. Bene illam numerius descripsit Roth in Beiträge zur Botanik II th. f. 125.

- albus.* 3. **SCHÖENUS** culmo subtriquetro folioso, floribus fasciculatis, foliis setaceis. *Syst. veg.* 65. 13.

Tuschen Zwol en de kleine Haar, en tuschen Hardenberg en Venbrug in Overyssel (Ehrhart).

Op dezelfde gronden en plaatsen, als de voorgaande; niet zeldzaam op de lage heide-velden van de Veluwe.

DIGYNIA.

- Canariensis.* 4. **PHALARIS** panicula subovata spiciformi, glumis carinatis. *Syst. veg.* 74. 1.

Langs de wegen, aan mesthopen, en op de Stadswallen van Arnhem, Harderwyk, Naarden en andere plaatsen.

Hæc utique Florae indigenæ inferenda est, nisi velimus etiam *Licem Aquifolium*, *Linum usitatissimum*, *Galanthum nivalis*, *Prunum domesticum*, ipsum *Erigeron canadense*, similesque stirpes, exoticas quondam, nunc vero civitatis jure donatas, excludere.

5. *PANICUM* spica tereti, involucellis unifloris *viride*, fasciculato pilosis, seminibus nervosis. Syst. veg. 76. 5.

By Heemze (Ehrhart).

Op zandige bouwlanden by Harderwyk, Putten, en Naarden.

Anne hæc eadem planta ac n. 34. *Floræ Gelro-Zutphaniæ p. 12 & 243?* Sic fraudet synonymon C. Bauhini; sed quare igitur postea in suis scriptis eam omiserit Gorterius, non perspicio.

Involucella non biflora. Neque calyx trivalvis.

6. *AIRA* foliis setaceis, vaginis angulatis, floribus subspicatis, flosculis basi aristatis. Syst. veg. 81. 12.

By Hengelo (Ehrhart).

Veel by Harderwyk op droge zandige plaatsen.

Arista dorsalis contorta! Adeoque Avenæ species.

7. *POA* panicula diffusa, spiculis multifloris li-*maritima*, nearibus, culmo basi subrepente, spicula-

rum glumis obtusissimis. Pollich hist. plantarum in Palatinatu Electorali sponte nascentium tom. I. p. 89.

Aan het zee-strand van de Zuider-zee by Nykerk, Harderwyk en Elburg.

Sit ne hoc gramen mera varietas *Airæ aquatica*, an vero distincta species ad *Poæ* genus referenda, uti Pollichius d. I. & Ehrhartius (*Beiträge zur Naturk.* 1 band. f. 68.) volunt, nondum certo constat. Mihi quidem, qui non semel in eodem *Airæ aquatica*, procul a mari crescentis, specimine, spiculas vidi & bifloras, & tri-, quadri-, quinque-, imo sex-floras, prior sententia probabilior videtur.

Poa maritima Rainvillii, quam cl. de Gorter (*Flor. VII. prov. n. 87.*) describit, multis modis, non tamen omnibus, cum nostra planta congruit. Doleo hujus specimen, quod dubium solvere posset, non superesse in horto sicco Gorteriano, cuius copiam Academie huic nuper fecit cl. viri vidua.

gubra. 8. *FESTUCA* panicula secunda scabra, spiculis aristatis, flosculo ultimo mutico, culmo semitereti. *Syst. veg. 88. 3.*

Op droge zandige plaatzen langs de wegen by Harderwyk.

*mariti- *9. *HORDEUM* flosculis lateralibus (masculis
mum. &) spuriis aristatis, involucris (omnibus) scabris. Oeder in explic. tab. 630 sue*

Floræ Danicæ, Roth, Beiträge zur Botanik II th. s. 97.

Grama spicatum secalinum maritimum minus. *Tournef. Inst. rei herb. t. I. p. 518,* *Scheuchzer Agrostogr. p. 18. n. 4.*

Grama secalinum palustre & maritimum. *Rai Catal. plant. Engl. p. 152., Synops. method. stirp. Britann. p. 242., Hist. plant. vol. II. p. 1258.*

Veel op de hooilanden aan het zee-strand tuschen Harderwyk en Nykerk.

,, Invenitur mente Majo & Junio in maritimis Belgii ", Scheuchzer l. c.

Recte jam Raius l. 1. dixit, differre ab Hordeo spurio, i. e. murino, quod culmus sit procerior & gracilior, aristæ breviores. Idem confirmant icon præclara Oederi, & distinctionis notaæ a Rothio d. 1. exhibet; antherarum tamen quod ille delineat, hic describit, discrimen, nullum observare potui. Neque omnes flosculi laterales spurii & inanes sunt, ut iidem volunt, sed illi tantum qui superiorem spicæ partem tenent.

Non commemoratur a Linnæo, uti recte dixerunt ill. Hallerus in Append. I. ad Scheuchz. Agrostogr. p. 4., & Rothius d. 1. Quam enim huc pertinere contendit Ehrhartus (Beitr. zur Naturkunde III b. s. 155.), varietas β Hordei murini Linn., referenda est ad *Hordeum secalinum* Schreberi.

*10. *HORDEUM* flosculis lateralibus masculis *secali-*
(& spurii) *aristatis, involucris seta-* *num,*

ceis scabris. Schreber *spicileg. Floræ Lips.*
p. 148.

Hordeum murinum β . Linn. *Fl. Suec. ed. 2.*
 $n. 113.$, *Spec. plant. t. 1. p. 126.*
Gramen spicatum fecalimum minus. *Tour-*
nef. d. l., Scheuchz. Agrostogr. p. 17.
n. 3., Vaillant. Botan. Paris. p. 83. tab.
17. f. 6.

Hordeum spicis distichis, folliculo brevi,
glumis calycinis aristatis. *Haller Hist. stirp.*
Helv. n. 1538.

An *Hordeum murinum microstachyon Ehr-*
harii? *Conf. Hannoy. Magaz. 1780.*
14 Stück.

Op Doreweerd in Gelderland.

Simillimum præcedenti gramen; neque specie ab
eo differre, mihi, cui utriusque plantæ plurima
specimina colligere & conferre licuit, videtur.
Separat tamen Scheuchzerus, quem Hallerus (*L.*
c. & Append. ad Scheuchz. Agrost. p. 4.) fequitur.
Hic vero non confinxisse videtur *Hordeum mari-*
timum; ille fæpissime, specierum nomine, varie-
tates describit.

T R I G Y N I A.

umbella- LI. *HOLOSTEUM floribus umbellatis. Syst. reg.*
tum. 104. 4.

Niet zeldzaam in 't voorjaar op zandige
bouwlanden by Harderwyk.

In nostris speciminiis vidimus stamina 3 vel 5.

nec 4, stylos semper 3, petala inæqualiter tridentata, pedunculos 6-12. Alium harum partium numerum & figuram observarunt Loefling, Linnaeus, Heister, Pollich, Leers, alii.

EX CLASSE IV

T E T R A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

12. **GALIUM** foliis senis obovatis obtusis, caule *saxatile*, ramosissimo procumbente *Syst. veg.* 125. 8.

Aan droge wallen by Harderwyk (Ehrhart).

D I G Y N I A.

13. **CUSCUTA** floribus sessilibus quinquesfidis, *Epithymum* bracteis obvallatis. *Syst. veg.* 179. 2.

Vry gemeen op de heide-velden van de Veluwe, Gooiland, Utrecht en Friesland, om de heide-struiken geslingerd, of over dezelve uitgespreid.

Gorterius noster hanc non distinxisse videtur a vulgaris C. europaea. Conf. loca natalia hujus, quæ describit Floræ VII. prov. n. 153. Meesius itidem utramque confudit; vid. Flor. Fris. n. 71, Flores pentandri.

TETRAGYNIA.

- grami-*
neum. 14. **POTAMOGETON** foliis linear-lanceolatis
alternis sessilibus stipulâ angustioribus. *Syst.*
reg. 174. 10.

*Tuschen Hardenberg en Venbrug, en by
Heemze (Ehrhart).*

- marinum.* 15. **POTAMOGETON** foliis linearibus alternis
distinctis inferne vaginantibus. *Syst.* *reg.*
174. II.

Te Harderwyk in de Stadsgraft by de Zee.

EX CLASSE V

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

- Belladon-*
na. 16. **ATROPA** caule herbaceo, foliis ovatis inte-
gris. *Syst.* *reg.* 249. 2.

Raram ceterum hanc, quod minime dolemus, ne-
que antea in Belgio repertam, stirpem, in tractu
tamen Oldamptino Provinciæ Groninganae non
deesse, singulari casu detectum fuit. Conf. cl. S.
J. Brugmans *Dissert. de plantis inutile. & vene-*
natis pratorum p. 30.

DIGYNA.

- Amarel-*
la. 17. **GENTIANA** corollis quinquefidis hypocra-

teriformibus, fauce barbatis. Syst. veg.
322. 33.

In de duinen by Scheveningen en 's Gravenhage (Ehrhart).

18. GENTIANA corollis quadrifidis imberbis, filiformis,
bus, caule dichotomio filiformi. Syst. veg.
322. 38.

Op lage heide-gronden op de Veluwe, onder
andere kleine planten, als Scirpus setaceus, Linum Radiola, Blasia, Anthoce-
ros en diergeleyken, als by Harderwyk aan
't eind van de hoge Sypel en Zandsteeg,
en by Vanenburg.

Tusschen Poppen en Hengelo, en tusschen
Zwolle en de kleine Haar (Ehrhart).

Flores semper tetrandri monogyni.

19. SIUM foliis pinnatis, umbellis axillaribus pe- angustifolium.
dunculatis, involucro univerali pinnati- lium.
fido. Syst. veg. 348. 2.

In verscheide sloten en beeken by Harderwyk,
als aan het eind van de hoge Sypel, in
Tonsel en aan de Nykerker weg.

*Est Sium nodiflorum a Gortero in Flora vii. Prov.
recensitum; quod non tantum ex loco natali, ibi
commemorato, dimicatus fueram, sed quod
ex ipso viri cl. horto siccо manifestum est, ubi,
nomine Sii nodiflori, Sium angustifolium afferva-
tur. Non rarus est inter Botanicos hic error,*

quum etiam Hallerus (*Hist. stirp. Helv.* n. 778.), Weigelius (*Observ. botan.* p. 26.), Retzius (*Observ. botan. fasc. I.* p. 16.), & Oederus (*Flor. Dan.* tab. 247.) Sium nostrum angustifolium vident nodiflorum.

- graveo-* 20. **ANETHUM** fructibus compressis. *Syst. veg.*
lens. 364. I.

By Zutphen (de Gorter *Flora Zutphanica* p. 21.).

An vere indigena?

EX CLASSE VI

H E X A N D R I A.

M O N O G Y N I A.

- multiflo-* 21. **CONVALLARIA** foliis alternis amplexi-
ra. caulibus, caule tereti, pedunculis multiflo-
ris. *Syst. veg.* 425. 7.

By Harderwyk op schaduwachtige plaatsen in
de boschen.

By Heemze (Ehrhart). By Overveen in de
duinen (Loosjes *Flora Harlemica* n. 82.,
quem tamen locum Gorterius, adsignat C.
Polygonato.)

Attenta partium & attributorum in loco natali
inspectio omnino comprobare videtur, hanc spe-
cie non distinctam esse a Convallaria Polygonato.
Eadem antea Linnæo sletit sententia. „ Varie-

„tates,” inquit, „hæ fatis manifestæ & evi-
 „dentes sunt; specie tamen non distinctas esse,
 „docuit attenta inspectio partium & attributo-
 „rum in loco natali. Distinguat itaque eas,
 „qui velit; ego convictus sum, quod specie di-
 „stingui non debeant, licet pedunculi in aliis
 „uniflori, in aliis multiflori sint.” Vid. *Hort. Cliffort.* p. 125. Miror igitur, deinde sententiam
 mutasse virum ill.

- *22. *JUNCUS annuus*, culmo ramoso panicula- *Tenagela.*
 to, floribus solitariis sessilibus, petalis ova-
 to oblongis, capsula subglobosa. *Linn.*
fil. Supplēm. plantar. p. 208.
Juncus foliatus minor, floribus per ramum
 sparsis. *Vaillant. Botan. Paris. p. 109.*
tab. 20. f. 1.

By Delden en Hengelo (Ehrhart).

Novam hanc speciem primus descripsit, & cl. Lin-
 næo suppeditavit Ehrhartus. Mirari autem hac
 occasione subit, ill. Murraium novæ suæ Syste-
 matis vegetabilium editioni, neque hanc infe-
 riuisse plantam, neque plurimas alias, quas a
 cl. Ehrhart, sibi indicatas, Supplemento plan-
 tarum inferere nullus dubitaverat Linnæus filius.

- *23. *JUNCUS culmo nudo filiformi*, foliis se- *tenellus.*
 taceis erectis, capitulis terminali laterali-
 que subfoliosis.

Op vogtige plaatsen op de heide-velden by
 Harderwyk.

Diversa a Linneanis Junci speciebus. Proxime autem ad nostram accedunt:

Juncus caule brachiato, foliis setaceis, floribus fasciculatis ad ramos sessilibus. Hall. hist. stirp. Helv. n. 1320. Sed culmus nostra simplex est, non brachiatus.

Juncus (*capitatus*) foliis setaceis, capitulis terminali alarique subfoliosis, petalis acutis integris, pericarpio aequalibus. Weigel Observ. botan. p. 28. — Sed non semper adest capitulum alare, magisque accedit ad Juncum squarrosum quam ad bufonium; neque icon tab. 2. f. 5. nostra satis respondet.

Juncus (*ericetorum*) culmo nudo filiformi, foliis linearibus canaliculatis, capitulo subrotundo sessili terminali triphylo. Pollich hist. plant. part. n. 350. Sed nostra non semper unicum habet capitulo terminale, neque occurrit in pratis siccis fabulosis.

nemoro-
sus. *24. JUNCUS foliis planis pilosis, floribus fasci-
culatis. Pollich d. l. n. 350.

Juncus planifolius umbellatus, petalis aequa-
libus. Haller hist. stirp. Helv. t. II.
n. 1327.

Gramen hirsutum angustifolium majus. C.
Bauh. Pin. p. 7, Scheuchz. Agrostogr.
p. 318.

In het Puttensche en Spulder bosch op de Ve-
luwe.

Sitne haec vere distincta species, an vero varietas
Junci pilosi, dubitaverim.

TRIGYNIÆ.

*25 RUMEX floribus hermaphroditis, valvulis *Nemolapathum*, linearibus obtusis integerrimis graniferis, verticillis remotis, ramis patentibus, foliis inferioribus cordato lanceolatis. *Linn.*
fil. Suppl. Plant. p. 212.

Rumex (glomeratus) floribus hermaphroditis, ad alas foliorum conglomeratis, foliis lanceolatis integerrimis. *Boehmer Flor. Lips. p. 240. n. 576.* & *Schreber conspect. floræ Lips.*

Rumex conglomeratus. *Leers Flor. Herborn. n. 275.* & *Murray prodr. design. Stirp. Götting. p. 52.* Nullam tamen vir ill. ejus mentionem facit in Syst. vegetab.

An Lapathum Hydrolapathum? *Scopoli flor. Carniol. n. 442.*

Rumex crispus B. *Pollich l. c. n. 356.*

Rumex acutus B. *de Gorter flora vii. prov. n. 323.*

Lapathum petiolis latescens, foliis longe lanceolatis, floribus verticillatis verrucosis. *Hall. l. c. n. 1590.*

Lapathum minimum. *C. Bauh. pin. p. 115.*

Lapathum acutum minimum. *J. Bauh. hist. t. II. p. 985.*

Op verscheide plaatzen aan de kanten van slooten, als by Harderwyk, en aan de kant van trekvaarten in Holland.

By Hengelo (Ehrhart).

POLYGYNIA.

- natas.* 26. ALISMA foliis ovatis obtusis, pedunculis solitariis. *Syst. veg.* 460. 5.

In slooten by Delden en Hengelo (Ehrhart).

EX CLASSE VIII

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

- multiflora.* 27. ERICA antheris muticis exsertis, corollis cylindricis, stylis exsertis, foliis quinis, floribus sparsis. *Syst. veg.* 484. 71.

By Harderwyk (Linnæus Flora Belgica, in Amoen. Acad. vol. VI. p. 52.).

TRIGYNIA.

- sumetorum.* 28. POLYGONUM foliis cordatis, caule volubili levi, floribus carinato alatis. *Syst. veg.* 495. 30.

*Vry gemeen in Gelderland aan de heggen der tuinen, en tuschen het hakhout.
Op sommige plaatsen in Overyssel (Ehrhart).*

Huc pertinet Convolvulum nigrum Dodon. sempf. p. 396. quod synonymon Gorterius refert ad Polygonum Convolvulum, a quo nostram speciem

non satis distinxisse v. cl., patet insuper ex loco natali, quem P. Convolvulo tribuit „in heggen;” atqui in sepibus haec non crescit,

EX CLASSE X

DECANDRIA.

DIGYNTIA.

- *29. **CHRYOSPLENIUM** foliis oppositis. *Syst. oppositifolium.*
Veg. 558. 2.

Habitat in Belgio (Linnæus *Syst. plant. t. II.*
p. 308.).

- *30. **DIANTHUS** floribus solitariis, squamis ca-deltoides,
lycinis lanceolatis binis, corollis crenatis.
Syst. veg. 565. 10.

By Zwol (Ehrhart).

TRIGYNTIA.

- *31. **STELLARIA** foliis lanceolatis, petalis bi-aquatica.
partitis, calycem longitudine æquantibus.
Pollich d. l. n. 422.

Alfine foliis lanceolatis, petalis bipartitis, petiolis unifloris. *Haller Helv. n. 885.*

An Alfine folio gramineo angustiore, palustris.
Dillen. Append. p. 69., quæ Linnæo varietas est
Stellariae gramineæ? Est autem *S. aquatica* vere
ab hac distincta species.

Aan het eind van de hoge Sypel, aan de Weibek, en elders op vogtige plaatzen by Harderwyk.

Tuschen Hardenberg en Venbrug in Overysfel (Ehrhart).

P E N T A G Y N I A.

- reflexum.* 32. **SEDUM** foliis subulatis sparsis basi solutis, inferioribus recurvatis. *Syst. veg.* 579. 11.

Aan den voet der bergen langs den Rhyn by de Doreweerd, en op de wallen en fortificatiën van Naarden.

Varius petalorum & staminum numerus, styli & capsulae plerumque 6-9, evidenti sunt arguento, separationem generum Sedi & Sempervivi esse mere artificiale, imo ne quidem in systemate plantarum artificiali bene procedere.

- equati-
cum.* 33. **CERASTIUM** foliis cordatis sessilibus, floribus solitariis, fructibus pendulis. *Syst. veg.* 585. 13.

By Zandvoort, Muiden, Muiderberg, ^{aan} de Helder en op Texel.

Conf. de Gorter *Flor. Belg.* n. 376, ubi hanc plantam recenset; omisit autem iterum in *Flora VII. Prov.*, motus quibusdam, manu Chirurgi Alcmarensis Timmer scriptis, animadversionibus, quæ tamen parvi ponderis esse videntur (*Conf. Flor. VII. Prov. Plant. dub.* n. 1076.); & quidquid de-

mum de illis sit, tum ipse Ao. 1784. aan de Helder, tum Ao. 1782. cl. Ehrhart by Muiden genuinum Cerastrum aquaticum Linn. invenimus.

34. SPERGULA foliis verticillatis, floribus pen- ^{pentan-}
tandris. Syst. veg. 586. 2. ^{dra.}

Hier en daar by Harderwyk en Haarlem.

In Vriesland onder de gemeene Spurrie (Mee-
fe).

EX CLASSE XI

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

35. ASARUM foliis reniformibus obtusis binis. *europeum.*
Syst. veg. 589. 1.

Boerhaavius indigenam esse significavit. Ind.
alt. plant. hort. L. B. T. II. p. 95.

„ Crescit in umbrosis opacis sepibus, praeser-
tim corylaceis, in variis locis Hollandiae „,
Linnaeus Hort. Cliffort. p. 178.; vid. & Flo-
ram Belg. in Amoen. Acad. t. VI. p. 52.

TRIGYNTIA.

- *36. EUPHORBIA umbella multifida dichotoma, *campe-*
involucellis subcordatis, petalis integris, *fbris.*
foliis linearie lanceolatis subimbricatis acu-
tis glaucis.

Zeer veel aan den Yseldyk by Campen,
Deventer, Zutphen en Voorst.

Proxime ad nostram accedunt, neque tamen in
omnibus convenient:

Euphorbia Esula Pollichii, t. II. n. 460.

Euphorbia Paralias Scopolii, *Flor. Carniol.* n. 581.

Euphorbia Cajogala Ehrharti, *Hannov. Magaz.*
1783. 14 Blück, *Beiträge II. b. f.* 102.

Tithymalus foliis linearibus aristatis imbricatis,
stipulis umbellaribus ovato lanceolatis, florali-
bus cordatis. *Hall. hist. stirp. Helv.* n. 1055.
quod Synon. ad *Euph. Paralias* refertur in *Syst.*
Plant.

Est fere intermedia species inter *Euphorbiam Esu-*
lam & *Paralias*, ab utraque tamen probe di-
flingenda. Crescunt in per plures annos ha-
tres species in horto nostro Academico, neque
una in alteram, fatione aliquoties a me insita-
ta, transit.

EX CLASSE XII

ICOSANDRIA.

DIGYNIA.

monogy- *37. *CRATAEGUS* foliis subtrifidis acutis, flori-
na. bus monogynis. *Jacquin Flor. Austr. vol.*
III. t. 292. f. 2. Syst. veg. 622. 10.

Op dezelfde plaatsen, als de gemeene Haag-
doorn (*Crataegus Oxyacantha*); gemeen,
by Harderwyk.

Pro nova specie descripta JACQUINUS. Pace tam
men viri illi, non differre videtur a C. Oxy-
acantha, nisi numero stylorum; sed ut in plus
minus hujus classis arboribus numerum hunc va-
riare, res est notissima, sic quoque plura vidi
specimina C. Oxyacanthæ floribus trigynis. An-
ne igitur haec etiam ad distinctam speciem erunt
referenda? Sed & vidi in eadem arbore sèpius flo-
res alios monogynos, alios digynos, adeoque,
juxta Jaquinum, duas has species in eadem stir-
pe conjunctas.

P O L Y G Y N I A.

38. ROSA germinib[us] globosis petiolisque acu-
leatis, aculeis recurvis, foliis subtus rubi-
ginosis. Syst. veg. 631. 2.

Aan zee-kant by Harderwyk, op Dore-
weerd, langs de weg tuschen Nymegen
en Arnhem, by Velzen, en elders by Haar-
lem.

Rosam Eglanteriam cum nostra confundere vide-
tur cl. de Gorter (Flor. vii prov. n. 428.). Idem
alii botanici plurimi fecerunt.

39. FRAGARIA caule decumbente, (femini-
bus receptaculo exsucce affixis). Syst. veg.
633. 3.

By Harderwyk in het Ribbenboschje.

Demonstrat haec planta, arte, non natura, distin-
cta esse Fragariæ & Potentillæ genera;

EX CLASSE XIII

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

- dubium.* 40. PAPAVER capsulis oblongis glabris, caule multifloro, setis appressis, foliis pinnatis-dis incisis. *Syst. veg.* 648. 6.

Op zandige bouwlanden en wegen by Arnhem, Harderwyk, Haarlem, Naarden, Noorddorp, Groningen, en andere plaatzen.

EX CLASSE XIV

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

- virgata.* 41. MENTHA floribus capitatis, foliis ovatis serratis subsessilibus pubescentibus, staminibus corolla longioribus. *Syst. veg.* 713. 7.

Habitat in Hollandia (Linnaeus *Syst. plant.* t. III. p. 43.).



EX CLASSE XV

TETRADYNA MIA.

S I L I C U L O S A.

42. *MYAGRUM siliculis lentiformibus orbicula-paniculatis punctato rugosum.* *Syst. veg.* 796. 8. *tum.*

In de koornlanden by Emaus buiten Harderwyk.

S I L I Q U O S A.

43. *ISATIS foliis radicalibus crenatis, caulinis tinctoria sagittatis, siliculis oblongis.* *Syst. veg.* 824. 1. *Weede Belg.*

In Holland, vooral op de duinen (van Berkhey Verhand. van de Holl. Maatsch. VIII d. bl. 116.). In Noord-Holland (van Hazen Verh. v. d. Holl. Maatsch. XIX d. 1. st. bl. 271.). Op de bouwlanden van Vriesland (Brugmans Orat. de plant. indig. accurat. not. max. commend. p. 36.).

44. *CRAMBE foliis caueque glabris.* *Syst. veg.* maritima, 825. 1.

Op het uiterste der stranden van Holland (Dentan Verhand. van de Holl. Maatsch. XIX d. 3 st. bl. 31.).

EX CLASSE XVII

D I A D E L P H I A.

O C T A N D R I A.

- amara.* 45. *POLYGALA* floribus cristatis racemosis, caulis erectiusculis, foliis radicalibus obovatis majoribus. *Syst. veg.* 851. 5.

Op schrale gras-landen en lage heide-velden;
by Harderwyk op de Gagel-kampen, en
by Hartskamp op de Veltiwe.

Equidem conjungendam iterum putaverim cum
Polygala vulgari; vidi enim plura specimina in-
ter utramque quasi speciem media; & *Polygalæ*
vulgaris in horto cultæ folia radicalia latiora
sunt, ita ut vix ab amara dignoscantur.

D E C A N D R I A.

- spinoza.* *46. *ONONIS* floribus racemosis solitariis, foliis
ternatis solitariisque, ramis spinosis. *Murray*
Syst. veg. 862. 2.

Anonis spinosa flore purpureo. *C. Bauh. Pin.*
p. 389.

Anonis. Dodon. Pempt. p. 743.

Ononis arvensis α , β . *Gorter Flor. VII. prov.*
n. 596.

Veel langs de wegen, dyken en bouwlanden,
en op schrale weilanden.

A Gortero nostro, ut olim a Linnaeo, refertur ad

Ononidem arvensem; a qua tamen specie hanc differre, plurimi hodie, & inter hos Murraius quoque, contendunt; num recte? dubitare licet.

47. *PISUM* petiolis supra planiusculis, caule *an-*
marit-
gulato, stipulis sagittatis, pedunculis mul-
mum.
tifloris. Syst. veg. 870. 3.

Crescit in littoribus Belgii (Linnæus *Hort. Cliffort. p. 369.*).

48. *LATHYRUS* pedunculis multifloris, cirrhis *palustris.*
polyphyllis, stipulis lanceolatis. *Syst. veg.*
872. 20.

In de Ooster-meeren by Harderwyk.

49. *TRIFOLIUM* spicis ovalibus imbricatis, *procum-*
vexillis deflexis persistentibus, caulis pro-
cumbentibus. Syst. veg. 896. 43.

Rys-klaver Hardervicensis.

Langs het zee-strand by Harderwyk en Doorn-
spyk.

50. *TRIFOLIUM* spicis subimbricatis, vexillis *filiforme,*
deflexis persistentibus, calycibus pedicella-
tis, caulis procumbentibus. *Syst. veg.*
896. 44.

By Elburg, Bysfelt en Oldebroek op de Ve-
luwe.

simile admodum præcedenti, quocum recte, quan-
tum video, junxit ill. Hallerus (*Hist. Stirp. Helv.*
n. 364.), qui cæterum augere magis amat,
quam imminuere specierum numerum.

EX CLASSE XVIII
POLYADELPHIA.
POLYANDRIA.

*monsta-
num.* 51. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus
serrato glandulosis, caule tereti erecto,
foliis ovatis glabris. *Syst. veg.* 902. 29.

Op de bergen langs den Rhyn, op Doreweerd.

pulchrum. 52. HYPERICUM floribus trigynis, calycibus
serrato glandulosis, caule tereti, foliis am-
plexicaulibus cordatis glabris. *Syst. veg.*
902. 35.

*In de boschen van Doreweerd en Staverden
op de Veluwe.*

EX CLASSE XIX
SYNGENESIA.
POLYGAMIA AEQUALIS.

pirtum. 53. LEONTODON calyce toto erecto, foliis
dentatis hirtis, setis simplicissimis. *Syst. veg.*
912. 2.

*Langs de wegen en op de gras-landen aan
zee-kant by Harderwyk.*

POLYGAMIA SUPERFLUA.

54. INULA foliis amplexicaulibus ovatis rugosis *Helenum,*
subtus tomentosis, calycum squamis ova-
tis. *Syst. veg.* 956. 1.

Op roggige plaatsen by Almelo.

Crescit in pratis succulentis & humidioribus
per Belgium (*Linnæus Hort. Cliffort.*
p. 407., Syst. plant. vol. III. p. 824.)
Indigenam stirpem esse, etiam Boerhaavius
significavit (*Ind. alt. hortii Lugdb. tom. I.*
p. 94. n. 1.).

55. CHRYSANTHEMUM foliis pinnatis multi-*inodorum.*
fidis, caule ramoso diffuso. *Syst. veg.*
966. 10.

*By Harderwyk, Elburg en Nykerk aan de
wegen, vooral aan zee-kant.*

EX CLASSE XX

G Y N A N D R I A.

D I A N D R I A.

56. OPHRYS bulbis aggregatis oblongis, caule *spiralis.*
subfolioso, floribus spirali secundis, necta-
rii labio indiviso crenulato. *Syst. veg.*
1011. 3.

By Hengelo in Overyssel (Ehrhart).

EX CLASSE XXI

M O N O E C I A.

T R I A N D R I A.

Ovrathea. *57. CAREX spicis pendulis, mascula erecta, femineis filiformibus pedunculo brevioribus, capsulis acutis distantibus. *Hudson. Flor. Angl. p. 353. n. 22.*

Carex vesicaria β. *Syst. plant. t. IV. p. 114.* ubi synonyma enumerantur.

Op de Gagel-kampen by 's Heeren-loo, niet verre van Harderwyk.

Jure hanc a Carex vesicaria distinguunt hodie botanici tantum non omnes.

S Y N G E N E S I A.

dioica. *58. BRYONIA foliis palmatis utrumque calloso scabris, floribus dioicis. *Jacquin Flor. Austr. vol. II. p. 59, Syst. veg. 1093. 2. Bryonia alba. Pollich Palat. n. 915, Leers Herborn. n. 744, Hudson Flor. Angl. ed. 2. p. 337.*

Bryonia foliis palmatis utrumque calloso scabris. *Haller. Hely. n. 547.*

Bryonia aspera s. alba baccis rubris. *C. Bauh. Pin. p. 297.*

Vitis alba sive Bryonia. *J. Bauh. Hist. v. II. p. 243.*

Bryonia alba. *Dodon. Pempt. p. 399.*

Multis in Belgio locis reperitur (Dodonæus l. c.).

Aan de heggen der tuinen en langs de wegen op schaduwachtige plaatsen by Harderwyk.

Ad hanc speciem plura synonyma & loca natalia pertinent, a Gortero relata ad Bryoniæ albam, a qua nostram non satis distinxit vir cl. In *Flora* enim *vii. prov. n. 801.*, dicit suam plantam monoicam esse, & baccas nigras ferre; excitat autem eodem loco *Floram Gelro-Zutph. n. 536.* ubi expresse dicit, dioicam esse.

En autem genuina Bryoniae albæ synonyma, quæ Gorterianis substitui queant:

Bryonia alba. *Scopoli Fl. Carn. n. 1200.*

Bryonia nigra. *Dodon Pempt. p. 395.*

Bryonia alba baccis nigris. *C. Bauh. Pin. p. 297.*

Vitis f. Bryonia nigris baccis. *J. Bauh. Hist. vol. 2. p. 146.*

EX CLASSE XXII

D I O E C I A.

D I A N D R I A.

59. *SALIX* foliis ferratis glabris, floribus triandris. *Syst. veg. 1098. 2.*

By Hengelo (Ehrhart).

60. *SALIX* foliis integerrimis utrinque villosis aurita, obovatis appendiculatis. *Syst. veg. 1098. 22.*

By Hengelo (Ehrhart).

- incubacea.* 61. *SALIX* foliis integerrimis lanceolatis subtus villosis nitidis, stipulis ovatis acutis. *Syst. veg.* 1098. 26.

By Oldebroek op de Veluwe (Ehrhart).

- repens.* 62. *SALIX* foliis integerrimis lanceolatis utrinque nudiusculis, caule repente. *Syst. veg.* 1098. 27.

Aan het eind van de hoge Sypel, en elders op zandige vogtige plaatsen by Harderwyk.

EX CLASSE XXIV CRYPTOGAMIA.

M U S C I.

- pubula-
zum.* 63. *PHASCUM* (caulescens), foliis (linearis) setaccis patulis. *Syst. veg.* 1189. 3.

Op de bouwlanden in het voorjaar by Harderwyk.

Neque ipsa planta acaulis, neque capsula sessilis est.
— In unico furculo non ramoso binas semel vidi
capsulas.

- muticum.* *64. *PHASCUM* acaule, foliis ovatis muticis con-
cavis conniventibus. Schreber de *Phasco*

obff. p. 8. tab. I. fig. 11, 12., Spicileg. flor. Lips. p. 72. n. 779., Weber Spicil. flor. Götting. p. 126. n. 195.
Phascum acaulon B. Linn. Syst. pl. v. IV.
p. 450, Hudson Fl. Angl. p. 396, Weis Pl. cryptogam. floræ Götting. p. 267.
Dillen. Hist. musc. XXXII. 12.

By het vorige, en by het Phascum acaulon.

Linnæus pro varietate habuit sui Phasci acauli,
 Distinxerunt vero Dillenium secuti, Schreberus,
 Weberus, Hedwigius. Haec tenus Linnæi magis
 placeret sententia; quod enim Ph. muticum sit
 acaule, cuspidatum vero (i. e. acaulon Linn.)
 caulescat, non sufficere videtur ut distinguantur;
 siue enim eodem modo specimina occurunt
 Phasci subulati vere acaulia, que tamen nemo ad
 distinctam speciem retulerit. Sed ipse cl. Schre-
 berus agnoscit: „ Phascum subulatum & cuspi-
 „ datum, pro varietate foli natalis, magnitu-
 „ dine & habitu admodum variare, ita ut se-
 „ plus novas species mentiantur ”. Vid. Obff.
 cit. p. 9.

*65. PHASCUM caulescens, folijs oblongis pi-
 piliferum. Schreb. de Phasco p. 8.
 tab. I. f. 6. 7., Spicil. p. 74. n. 1029.

Op eenige muren te Nykerk op de Veluwe.

Hæc a reliquis omnino distincta videtur species.

66. BUXBAUMIA aphylla, pedunculo elonga- aphylla.
 to. Syst. veg. 1188. I.

Primum legi rariorem hunc muscum Aprili
1786, in het Puttensche bosch op de Veluwe.

- urniges-
rum.* 67. **POLYTRICHUM** caule ramosissimo, pedunculis axillaribus. *Syst. veg.* 1192. 4.

By Elmerink niet verre van Deventer (Ehrhart).

- fontanum.* 68. **MNIUM** (caule ramoso, capsulis subrotundis obliquis). *Syst. veg.* 1193. 4.

By Harderwyk aan de oorsprong van de hoge Sypel, en by Arnhem aan het begin van kleine beckjes.

Pedunculi radicantes perichaetio manifesto squamoſo, (quod etiam Dillenius *Hist. musc.* tab. XLIV. f. 2. d. e. f. delineat), cincti sunt. Raro caulis vere simplex cernitur, neque in omnibus geniculis inflexus.

- palustre.* 69. **MNIUM** caule dichotomo, foliis subulatis. *Syst. veg.* 1193. 5.

Tuschen Heemze en de kleine Haar in Overysfel (Ehrhart).

- annoti-
num.* 70. **MNIUM** foliis ovatis acuminatis pellucidis, pedunculis subradicalibus, antheris nutantibus. *Syst. veg.* 1193. 10.

By Harderwyk aan den kant van slooten, en op rogtige plaatzen in de boschen.

71. **MNIUM calyptra villosa.** *Syst. veg.* 1193. 16. *polytrichoides,*
a. capsulis subrotundis, foliis integerrimis.

In het Puttensche bosch.

In de boschen by het Loo (Ehrhart).

B. capsulis subcylindricis, foliis ferrulatis.

In de boschen by het Loo (Ehrhart).

Merito has varietates Linnaeanas plurimi hodie spe-
cie distingunt, & Polytrichi generi utramque
inserunt.

72. **HYPNUM surculis vagis erectiusculis, fo- *rugosum,*
liis secundis recurvatis.** *Syst. veg.* 1195. 11.

Habitat in Hollandia (Linnaeus *Syst. plant.*
t. IV. p. 485).

73. **HYPNUM surculis subproliferis plano pinna- *delicatum-*
tis, cuspidatis, pedunculis aggregatis.** *Syst. veg.* 1195. 18.

In de boschen by het Loo (Ehrhart).

74. **HYPNUM surculis vagis teretibus, foliis *curtipen-*
ovatis acutis patulis.** *Syst. veg.* 1195. 35. *dulum,*

By de voorgaande (Ehrhart).

75. **HYPNUM surculis vagis ramosissimis, ramis *filiformium,*
filiformibus, antheris obliquis.** *Syst. veg.*
1195. 37.

Boerhaavius indigenam esse notavit (*Ind. alt. horti Lugd. B. p. 22. n. 42.*).

moticum. *76. *HYPNUM (compressum)* surculis plano pin-
natis, ramulis simplicibus proliferisque,
pedunculis bipolices adæquantibus. Nec-
ker *Deliciae Gallobelg. sylv. t. II. p. 477.*

Hypnum cuspidatum β. inerme. Weis *Plant. cryptog. fl. Götting. p. 253.*, Weber *Spicil. fl. Göt. p. 59.*

Hypnum purum β. Pollich. *Plant. Palat. t. III. n. 1044.*

Hypnum (compressum) surculo erecto ra-
moso, ramis basi setiferis planis recurvius-
culis stipite triplo brevioribus. Neck. Me-
thod. p. 159.

Hypnum (compressum) ramis apice attenua-
tis, foliis ovato lanceolatis, setis elonga-
tis, capsulis inclinatis, operculo conico.
Schreb. *Spicil. p. 96.*

Hypnum ramis teretibus, foliis ovato lan-
ceolatis, setis prælongis, capsula crassa,
operculo conico. Haller *Helv. n. 1742.*

Hypnum cypresifforme tenuius & compres-
sius. Dillen. *Musc. XL. 47.*

Muscus erectus, foliis angustis, caulinis ap-
pressis. Vaillant *Bot. Paris. p. 139. tab.*
29. f. 10. (opt.)

By Harderwyk in de Zandsteeg, het Kla-
ver-bosch en elders.

Indigena etiam dicta planta a Boerhaavio. (d.
l. p. 20. n. 10.)

Nomen triviale *compreſſi* minus convenit, quam

sic facile cum H. compresso Linneano confundatur.

- *77. **HYPNUM** furculis ramosissimis, ramis teretiviriparum.
retibus subulatis, capsulis erectis. *Necker Delic.* p. 475.

Hypnum (myurum) furculo multifloro, superne præprimis ramoso, ramis recurvis rigidiusculis, foliis ovatis acuminatis, capsulis lanceolatis erectis. Pollich Palat.

n. 1054.

Hypnum myosuroides v. *crassius. Weber Spicil.* p. 94.

Hypnum foliis ovato lanceolatis, ramis teretibus compressis. Haller Hely. n. 1754.

Hypnum myosuroides crassius, capsulis erectis Dillen. Musc. XLI. 50.

Muscus denticulatus minor nostras sericeus, capitulis Adianthi. Vaill. Bot. tab. 28. f. 4.

Aan de bomen op het Loo, en aan zee-kant tuschen Harderwyk en Doornspijk (Ehrhart).

Distinguunt Dillenius, Hallerus, Pollichius, Neckerus. Huic tamen aliter dein visum est, dixitque varietatem speciei affinem Hypni myosuroidis. Vid. Method. musc. p. 183.

- *78. **HYPNUM** furculis vagis procumbentibus, lutescens.
foliis ovatis lanceolatis subulatis striatis,
capsulis obliquis. *Hudson Flor. Angl.* p. 421., *Schreber Spicil.* p. 98.

- Hypnum (*ramosum*) surculis ramisque sparsis, foliis ovatis obtusis, antheris subcernuis. Neck. Delic. p. 484.
- Hypnum sericeum $\beta.$ *praelongum*. Weis Cryptog. p. 255.
- Hypnum strigosum $\beta.$ *ramosum*. Neck. Method. p. 180.
- Hypnum myosuroides $\delta.$ *praelongum*. Weber Spicil. p. 94.
- Hypnum caulinibus teretibus, foliis pilo terminatis, capsulis obliquis aristatis. Haller Helv. n. 1753.
- Hypnum sericeum, surculis longioribus & rectioribus, capsulis incurvis. Dillen. Musc. XLII. 60.

By de voorgaande (Ehrhart).

Aan de bomen in de Haarlemmer Hout.

- nitens.* *79. HYPNUM ramis brevissimis, foliis lanceolatis subulatis nitentibus. Linn. fil. Meth. musc. p. 34., Syst. veg. 1195. 50.
 Hypnum (*trichodes*) ramis erectiusculis approximatis apice setiferis. Necker Delic. p. 483.
- Hypnum (*trichodes*) surculo erecto, ramis approximatis, seta terminatis, foliis lanceolatis striatis, capitulis erectis. Necker Meth. p. 161.
- Hypnum (*nitens*) surculis erectis, ramulis brevissimis, foliis lanceolatis appressis striatis, perichaetiis longissimis, capsulis obliquis. Schreber Spicil. p. 92., Weber Spicil. p. 86.

Hypnum ramis compressis, foliis pilo aristatis nitentibus, capsulis erectis, operculis conicis. Haller *Helv. n.* 1784.

Hypnum palustre trichoides, ramulis crebris luteo & ruso virentibus glabris. Dillen. *Musc. XXXIX.* 37.

Aan de zee-kant tuschen Harderwyk en Doornspyk (Ehrhart).

A L G A E.

80. *JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pin-viticulosa, natis (basi & medio floriferis), foliolis planis nudis (ovatis).* Syst. veg. 1196. 3.

Op vogtige beschaduwde plaatsen, onder andere mosen, in het Puttensche bosch op de Veluwe.

81. *JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pin-lanceolata, natis lanceolatis, apice floriferis, foliolis integratim tegerrimis.* Syst. veg. 1195. 5.

Aan de Vecht by Heemze (Ehrhart).

82. *JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pin-bidentata, natis, apice floriferis; foliolis bidentatis.* Syst. veg. 1196. 6.

By de voorgaande (Ehrhart).

By Harderwyk aan de wallen der wegen, aan het eind van de hoge Sypel, op het Heeren pad, en elders.

D

50 PLANTARUM INDIENARUM

- bicuspidata.* 83. JUNGERMANNIA frondibus simpliciter pinnatis, medio floriferis, foliolis bidentatis. Syst. veg. 1196. 7.

By de vorigen (Ehrhart).

Huc pertinere videtur Hall. Hist. Stirp. Helv. n. 1865.

- quinquedentata.* 84. JUNGERMANNIA frondibus pinnatis ramosis, apice floriferis, foliolis quinquedentatis Syst. veg. 1196. 8.

By de vorigen (Ehrhart).

In het Puttensche bosch, aan de wortels van bomen.

Cl. Necker recte ad hanc speciem retulit synon. Halleri Helv. n. 1866, invito tamen Webero; Hallerus enim, nec male, ut videtur, Jungermanniam quinquedentatam & trilobatam conjunxit.

- undulata.* 85. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis subrotundis integerrimis undulatis. Syst. veg. 1196. 9.

By de vorigen (Ehrhart).

- memorosa.* 86. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinnatis, apice floriferis, foliolis ciliatis. Syst. veg. 1196. 18.

Op de heide, en in de boschen op beschaduwde plaatsen, by Harderwyk.

Granula illa rubra, caliculo terminali quasi inclusa

fa, Webero observata, etiam mihi saepius vide-
re contigit.

- *87. JUNGERMANNIA frondibus supra bipinna- *refupina-*
tis, foliolis crenulatis imbricatis rotundis. *ta.*
Syst. veg. 1196. 11.

In het Elspeeter bosch op de Veluwe.

- *88. JUNGERMANNIA frondibus subtus bipinna- *trilobata*
tis, foliolis quadratis obsolete trilobis. *Syst.*
veg. 1196. 13

*In het Puttensche bosch; en aan het Heere-
pad by Harderwyk.*

- *89. JUNGERMANNIA surculis erectiusculis con- *pulcherrima*
fertis, foliis ovatis imbricatis subbisidis ci- *ma*
liatis. *Linn. fil. Method. musc. p. 35.*,
Syst. veg. 1196. 23.

Jungermannia pulcherrima. *Weber Spicil. p.*
150., *Dickson Fascic. plantar. cryptog.*
Britann. p. 7.

Jungermannia (*ciliaris*) surculis repentibus,
foliolis duplicato imbricatis, inferne auri-
culatis ciliatis? *Linn. Flor. Suec. n. 1044.*,
Spec. plant. t. II. p. 1601., *Pollich Palat.*
n. 1073., *Leers Flor. Herb. n. 907.*

Jungermannia (*ciliaris*) surculis repentibus
pinnatis impubibus, foliis bifidis punctatis
ciliatis, stipulis nullis, amphigastris bifidis
ciliatis, perisphaeriis punctatis nudis. *Ehr-*
hart Hann. mag. d. l., & Beitr. z. na-
turk. II th. f. 149.

Lichenastrum scorpioides pulchrum villosum. Dillen. Musc. LXIX. 3.

By Heenze aan de Vecht (Ehrhart).

Non confundenda cum Jungerm. ciliari Linn. & Gorteri (Flor. vii prov. n. 932.), quam Ehrhartus d. l., nescio quare, vocat Jungerm. Tomentellam.

pinguis. 90. *JUNGERMANNIA acaulis*, fronde oblonga sinuata pingui. Syſt. veg. 1196. 30.

Op vogtige lage plaatſen van heide-velden, als aan het eind van de hoge Sypel by Harderwyk.

Blasia affinis.

cruciata. 91. *MARCHANTIA calyce communi quadripartito*, laciniis tubulosis. Syſt. veg. 1198. 3.

„ In Belgio, juxta fossam Lugdunensem, intra primum lapidem ab urbe (Harlemo), vidi. " Linnæus Hort. Cliff. p. 477.

pufilla. 92. *BLASIA*. Syſt. veg. 1199. 1.

Aan het eind van de hoge Sypel, voor aan de Elspeeter weg, aan het eind van de Zandsteeg, en op diergelyke vogtige plaatſen by Harderwyk.

erythalli-
na. 93. *RICCIÀ frondibus superficie papilloſis.* Syſt.
veg. 1200. 1.

By Harderwyk aan het eind van de hoge Sypel.

94. RICCIA frondibus glabris canaliculatis bilo- *glaucia*,
bis obtusis. *Syst. veg.* 1200. 2.

By de voorgaande, ook op braakliggende bouwlanden aan den Enck en de Zandsteeg, by Harderwyk.

95. RICCIA frondibus obcordatis ciliatis. *Syst. natans*,
veg. 1200. 3.

In de sloten onder het kroos (Lemna)
by Elburg.

96. ANTHOCEROS frondibus indivisis sinuatis *punctatus*,
punctatis. *Syst. veg.* 1201. 1.

Niet zeldzaam by Harderwyk, op dezelfde plaatsen als de Riccia crystallina en glauca.

97. LICHEN leprosus viridis, margine tubercu- *atrovirens*,
lisque atris. *Syst. veg.* 1202. 3.

Op de steenen langs de zee-dyk by Nykerk op
de Veluwe.

98. LICHEN leproso farinaceus, peltis stipitatis *bifidae*,
subglobosis. *Syst. veg.* 1202. 4.

Tuschen Zwolle en de kleine Haar (Ehrhart).

Non differt ab hac specie videtur Lichen fungi-

formis Scopolii, *Fl. Carn.* n. 1364. & *weber?*,
Spicil. p. 896.

portus. 99. **LICHEN** leprosus, verrucis subtefelatis la-
vigatis pertusis, poro uno altero cylin-
drico. *Syst. veg.* 1202. 7.

Vry gemeen aan de beuke- en sommige an-
dere bomen by Harderwyk, het Loo, Arn-
hem en Doreweerd.

Weigel'us & Weberus hunc ad novum *Sphaeriæ* ge-
nus retulerunt. Monuit autem jam Dilleniüs,
hanc speciem non recte ad suum *Lichenoidis* ge-
nus referri, *Hist. musc.* p. 128.

atros-al- 100. **LICHEN** leprosus niger, tuberculis atro al-
boque mixtis. *Syst. veg.* 1202. 14.

Op keisteenen op de heide by Doreweerd.

In nostris certe speciminiibus color ater crustam
constituit.

carpineus. 101. **LICHEN** leprosus cinereus, tuberculis al-
bidis rugosis. *Syst. veg.* 1202. 19.

Aan de bomen by Harderwyk en het Loo
(Ehrhart).

Ex his locis natalibus suspicor, cl. Ehrhartum hunc
cum Lichene pertuso confudisse, quod etiam
Neckerus fecit.

cerallinus. 102. **LICHEN** leprosus ramosus teres fascicula-

tus fastigiatus confertissimus albus. *Syst.
veg.* 1202. 20.

*Op de steenen langs de zee-dyk by Nykerk
(Ehrhart).*

*103. *LICHEN* leprosus, crusta cinerea tenui, *cinereo-
fuscus*, tuberculis fuscis planis, adultioribus con-
vexis. *Weber Spicil.* p. 188.

Lichen crusta tenuissima cinerea, scutellis
fuscis. *Haller Helv.* n. 2069.

*Aan de bomen by het Loo, en Oldebroek
op de Veluwe (Ehrhart).*

*104. *LICHEN* crustaceus farinaceus obscure fla- *ochroleu-
cens*, tuberculis rubris immersis. *ochroleu-
cus.*

Lichen (ochroleucus) rugosus obscure fla-
cens, scutellis rubris planiusculis. *Nec-
ker Method.* p. 52.

*Lichen (Hæmatomma) crustaceus farina-
ceus pallescere albidus, scutellis sanguineis,
junioribus concavis, adultioribus
convexis, margine granulato crassiuscu-
lo, crustæ coloris. Ehrhart Hannov.
magaz. 1786. p. 285, Beiträge z. na-
turk. II. th. f. 158.*

*Lichen (coccineus) crustaceus farinaceus
ex viridi sulphureus, tuberculis immersis
ruberrimis. Dickson Fascic. plant. cry-
ptog. Brit. p. 8. tab. II. f. 1.*

*Huc etiam pertinere omnino videtur Lichen
(cruentus) Weber Spic. p. 232. tab. 1.*

Lichen crustaceus tartareus glaucus, scutis
diformibus planis ruberrimis. Haller Hely.

n. 2050.

Op de steenen aan de zee-dyk by Nykerk.

tartareus. 105. LICHEN crustaceus ex albo virescens, scutellis
flavescens, margine albo. Syst.
veg. 1202. 25.

By het Loo (Ehrhart).

Parellus. 106. LICHEN crustaceus albus, peltis concavis
obtusis pallidis. Syst. veg. 1202. 32.

Op de steenen langs de zee-dyk by Nykerk
(Ehrhart).

ater. *107. LICHEN crustaceus albicans, scutellis ru-
gosis nigris. Hudson. Flor. Angl. p. 445.
Schreber Spicil. p. 132.

Lichen (*nigricans*) crustaceus albicans,
scutellis atris, margine cinereo lœvi. Nec-
ker Delic. p. 504.

Lichen *subfuscus* a. *ater*. Weis. Plant. cry-
ptog. p. 49.

Lichen crustacea glauca verrucosa tenace. Hal-
ler Hely. n. 2056?

Lichenoides crustaceum & leprosum, scu-
tellis nigricantibus majoribus & minori-
bus. Dillen. Musc. XVIII. 15.

Op steenen en muren op verscheide plaat-
sen, by Harderwyk en Nykerk.

- *108. LICHEN imbricatus, foliolis obsolete multilobatis, scutellis centrifugis, ^{centrifugis} albidis ^{gus.} rufo-fuscis. Syst. veg. 1202. 34.

Op de steenen aan de zee-dyk by Nykerk.

- *109. LICHEN imbricatus, foliis lobatis truncatis ^{crispus.} crenatis atroviridibus, scutellis concoloribus. Syst. veg. 1202. 40.

Op de steenen langs de zee by Harderwyk; op sommige muren te Leyden en Haarlem.

- *110. LICHEN imbricatus, foliolis oblongis obtuse multifidis, scutellis subfuscis. ^{orbicularis.} Nec ker Delic. t. II. p. 509.

Lichen (*orbicularis*) fronde germinante deformi scutellifera subrotunda, primordialibus farinosis. Necker Meth. p. 88.

Lichen (*pulverulentus*) imbricatus, foliolis lobatis crenatis obtusis viridibus pol-line confpersis, scutellis nigris margine crenatis. Schreber Spicil. p. 128., Hagen Histor. Lich. p. 66. tab. II. f. 8.

Lichen fronde cinerea profunde lacinata, rotunde lobata, scutellis nigris, Haller Hely. n. 2016.

Lichenoides glaucum orbiculare, segmentis latioribus, scutellis nigris. Dillen. Musc. XXIV. 71.

Aan de wilge-bomen by Harderwyk, en in de Haarlemmer Hout.

Aan de bomen tuschen Harderwyk
Doornspyk, en tuschen Utrecht ^{en}
Amersfoort (Ehrhart).

pullus. *111. LICHEN imbricatus, foliolis nitidis lobatis, scutellis margine lævibus. Necker Delic. t. II. p. 510.

Lichen (*pullus*) fronde lævi scutellifera germinante distorta, primordialibus granulosis. Necker Meth. p. 94.

Lichen (*pullus*) imbricatus, foliolis lobatis olivaceis, scutellis integerimis. Schreber Spicil. p. 131.

Lichen fronde semipinnata rotunde lobata olivacea, scutellis lævibus. Haller Hely. n. 2013.

Lichenoides olivaceum, scutellis lævibus. Dillen. XXIV. 77.

Lichen crustæ modo arboribus ad crescens *pullus*. Boerh. Ind. alt. hort. L. B. part. I. p. 16.

Boerhaavius l. c. indigenam esse notavit.

Acetabu- *112. LICHEN imbricatus, foliolis obtusis, scutellis folio concoloribus subtus rugosis. Necker Delic. t. II. p. 5.

Lichen (*Acetabulum*) fronde suborbiculata luteo virescente lævi, scutellis folio concoloribus subtus rugosis. Necker Meth. p. 94.

Lichenoides acetabulalis cutaneis & rugosis. Dillen. Musc. XXIV. 79.

Lichen pulmonarius cinereus, sive arboreus

e cinereo viridis. *Vaillant. Bot. Paris.*
tab. 21. f. 13.

Aan de bomen tuschen Utrecht en Amers-
foort, en by Zwol (Ehrhart).

- *113. **LICHEN** foliaceus gelatinosus subrotundus *nigres-*
cens.
lobatus rugosus atrovirens, scutellis con-
fertis rufis. *Hudson Fl. Angl.* p. 450.,
Linn. fil. Suppl. Plant. p. 451., *Syst.*
veg. 1262. 72.
Lichen (*cristatus*) foliaceus gelatinosus
membranaceus lobatus, scutellis concav-
is cristatis rubris. *Scopoli Flor. Carniol.*
n. 1410.
Lichen (*Lactuca*) gelatinosus membrana-
ceus exasperatus convolutus atroviridis,
scutellis rubris. *Haller. Hely.* n. 2037.,
Weber. Spicil. p. 252.
Lichen pulmonarius membranaceus gelati-
nosus pullus, in segmenta latiora divi-
sus, receptaculis florum exiguis obfatu-
re rubris numerosissimis. *Michel. Gen.*
plant. p. 87., *Meese Flor. Fris.* n. 492. †.
Lichenoides gelatinosum membranaceum te-
nue nigricans. *Dillen. Musc.* XIX. 20.

Op de bast van ypen-bomen te Hytzum in
Vriesland (Meese l. c.).

Aan verscheide bomen, vooral ypen, by
Harderwyk en Elburg.

- *114. **LICHEN** foliaceus laciniatus albis, laci- *tenellus*,
niis suberectis obtusis pilosis, scutellis

sessilibus. Scopoli *Flor. Carn.* ed. I. p. 110., ed. 2. n. 1406., Hagen *Hist. Lich.* p. 80.

Lichen *hispidus*. Schreber *Spicil.* p. 126.

Lichen *ciliaris* β. *albidus*. Weis *Plant. cry-*
prog. p. 63., Necker *Meth.* p. 102.

Lichen fronde profunde laciniata semituba-
losa ciliata. Haller *Hely.* n. 2019.

Lichenoides *hispidum minus & tenerius*,
scutellis nigris. Dillen. *Musc.* xx. 46.

Lichen *cinereus arboreus*, marginibus fimbriatis. Vaillant. *Botan. Paris*, tab. 20.
f. 4. a. b.

By Arnhem, Harderwyk, het Loo, Amers-
foort, Haarlem, Leyden, en elders, op
de bast van de sleedoorn, wilg, denne en
andere bomen.

Est omnino species a L. *ciliari* distincta.

aphysus. 115. LICHEN *coriaceus repens lobatus obtusus*
planus, verrucis sparsis, pelta marginali
adscendente. Syst. veg. 1202. 76.

In het denne-bosch op Staverden op de Ve-
luwe,

perlatus. 116. LICHEN *coriaceus repens lobatus glaber,*
subtus ater, scutellis peduncularis integris.
Syst. veg. 1202. 82.

Aan de bast der bomen by Harderwyk,
de weg naar Elburg.

*117. LICHEN foliis adscendentibus multifido *foliaceus*,
laciniatis, subtus niveis, scyphiferis, scy-
phulis conicis brevissimis. *Hudson Flor.*

Angl. p. 457.

Lichen qui Muscofungus terrestris minor
crispus &c. *Morisoni. Boerh. Ind. p. 17.*
n. 18.

Boerhaavius d. l. indigenam esse significat.

*118. LICHEN fruticulosus solidus, tectus folio-*pascialis*.
lis crustaceis. *Syst. veg. 1202. III.*

Op hoge schrale heide-yelden van de Veluwe,
by Harderwyk, Elspeet, en Putten.
Tussen Zwol en de kleine Haar (Ehrhart).

*119. LICHEN fruticulosus ramosus nudus, cau-*spinosus*.
le retrorsum aculeato, ramulis acutis tu-
berculatisque. *Necker Delic. p. 521.,*
Hagen Hist. p. 126. tab. 2. f. 11.

Lichen (*spinosus*) fronde tereti ramosa re-
trorsum aculeata, ramulis acutis tubercu-
latisque. *Necker Meth. p. 64.*

Lichen (*spinosus*) fruticulosus tubulosus
ramosissimus spinosus, ramulis tubercu-
latis subdigitatis. *Oeder Enum. plant.*
flor. Dan. p. 29., Hudson Fl. Angl.
p. 459.

Lichen fruticosus vase ramosus foliosus,
extremis ramis palmatis fungiferis. *Hal-
ler Hely. n. 1952.*

Coralloides sparsum, caulis tortuosis &
spinosis. *Dillen. Musc. xvi. 25.*

Op eenige riet-daken in Veldwyk by Harderwyk.

aculeatus. *120. *LICHEN* foliaceus diffusus compressus ramosissimus, ramulis furcatis spinulosis. Schreber *Spicil.* p. 125., Weber *Spicil.* p. 207.

Lichen fruticosus durus castaneus, surculis spinosis. Haller. *Hely.* n. 1965.

Coralloides fruticuli specie fuscum spinosum. Dillen. *Musc.* xvii. 31.

Coralloides &c. Boerh. *Ind. t. I.* p. 19.
n. 4.

Op de heide by Harderwyk, en op de duinen by Haarlem.

Boerhaavius d. l. *indigenam esse significavit.*

Papilla- *121. *LICHEN* fruticulosus fistulosus aphyllus albidus, ramis paucissimis obtusis brevisimis, tuberculis terminalibus carneis. Ehrhart Hannoy. *magaz.* 1783. f. 218, *Beiträge II. b.* f. 105., Dickson. *Fascic.* p. 13.

Lichen fragilis a. minimus. Weber *Spicil.* p. 206.

Lichen caule fruticoso ramoso erecto densissime cæspitoso. Hall. *Hely.* n. 1962.

Coralloides minimum fragile madreporeæ instar nascentis. Dillen. *Musc.* XVI. 28.

Op de heide by Voorthuizen aan den weg naar Appeldoorn (Ehrhart.)

*122. LICHEN fruticulosus ramosus tubulosus, *furcatus*,
ramis erectis furcatis. *Hudson Flor.* p.
458., *Oeder Enum.* p. 29.

Lichen caule fruticoso subsolioso, ramis
adscendentibus repetito bifurcatis pun-
ctiferis. *Haller Hely.* n. 1954.

Dillen. Musc. XVI. 27.

Op de heide by Harderwyk.

In Vriesland (Meese *Flor. Fris.* n. 502 + a.).

*123. VALSA (*corticalis*). *Scopoli Flor.* *Carn. corticalis*,
n. 1416.

Lichen - Agaricus cespitosus acaulis nigri-
cans, sub cute Anagyridis non foetidæ
erumpens. *Michel. Gen.* p. 105. tab. 54.
f. 5., *Meese Flor. Fris.* n. 477., *Gor-
ter Flor.* vii prov., plant. dub. n. 1081.

Aan de stammen van zware eschen-bomen
in Vriesland (Meese l. c.).

Lichenoides tuberculatum compressum nigrum,
lignis putridis adnascens, Dillenii, quod hoc
refert Scopolius, potius ad Lycoperdon vario-
sum Linn. pertinere videtur.

*124. TREMELLA erecta plana, margine criso *lichenoi-*
lacinulato. *Syst. veg.* 1204. 5. *des.*

Onder andere mossen op de vogtige heide-
velden van de Veluwe.

Indigenam esse quoque notavit Boerhaavius
Ind. horti Lugdb. t. I. p. 17. n. 19.

- loreus.* 125. *Fucus fronde filiformi compressa dichotoma undique utrinque tuberculata.* Syst. veg. 1205. 20.

Aan het zee-strand by de Helder, Katwyk en Scheveningen.

- digitatus.* 126. *Fucus fronde palmata, foliolis ensiformibus, stirpe tereti.* Syst. veg. 1205. 37.

Aan het zee-strand by Roptazyl in Vriesland (Meese Beschryving en afbeelding ding van eene zonderlinge zee-plant &c. gevoegd agter de Opheldering van de xix classe van de Genera plantarum van Linnaeus).

- umbilica-* 127. *ULVA plana orbicularis sessilis peltata co-
riacea.* Syst. veg. 1206. 2.

Aan het zee-strand by de Helder.

- reticula-
ta.* 828. *CONFerva filamentis reticulato coadunatis.* Syst. veg. 1207. 11.

By Harderwyk in de Wei-beek, en te Velp in de graft van de Pastory.

- gelatino-
sa.* 129. *CONFerva filis ramosis moniliformibus, articulis globosis gelatinosis.* Syst. veg. 1207. 13.

Aan houte palen in de Hierder-beek op den Esenburg by Harderwyk.

¶ Réchte afferuit cl. Weis, hanc plantam male ad genus Conservæ a Linnæo relatam esse. Sed neque præcedens, neque variæ species aliae, uno eodemque Conservæ genere contineri commode queunt.

*130. BYSSUS pulverulenta cinerea rupes ope-saxatilis, riens. Syst. veg. 1208. 9.

Veel aan oude steenen en muren.

F U N G I

*131. AGARICUS stipitatus, pileo plano carneo *laetificus*, laetescente, lamellis rufis, stipite longo carneo. Syst. veg. 1209. 7.

In de boschen by Harderwyk.

*132. AGARICUS pileo fuscō murino spadiceo *pustulatus*, cinereo, verrucis & lamellis albis, anulo magno, tubere crasso. Scopoli Flor. Carn. tom. II. n. 1461.

Agaricus caulescens, pileo convexo cinereo, verrucis lamellisque albis, stipite basi crassissimo. Linn. Flor. Suec. n. 1236.

Amanita petiolo procero fistulofo annulato, pileolo plano striato verrucoso sordido, lamellis albis. Haller. Hely. n. 2397.

Agaricus &c. Schaeffer Fung. tab. 90.

Agaricus amplissima volva exceptus, pileolo plano spadiceo verrucoso in margine striato, lamellis candidis, petiolo an-

nularo & fistuloſo, radice tuberosa. *Gleitſch Fung.* p. 85. c.

Fungus pustulatus. Sterbeek Campernoeil-en p. 206. tab. 20. k.

By Harderwyk en Putten in de boschen.

- luteus.* 133. *BOLETUS stipitatus*, pileo pulvinato subvifido, poris rotundatis convexis flavisimis, stipite albo. *Syst. veg.* 1210. 16.

Op verscheidene plaatſen in de boschen ¹⁰⁸¹
Harderwyk.

- bovinus.* 134. *BOLETUS stipitatus*, pileo glabro pulvinato marginato, poris compositis acutis, porulis angulatis brevioribus, *Syst. veg.* 1210. 17.

By de voorgaande, doch menigvuldiger.

Plures hujus apud nos occurruunt varietates.

- imbricata.* 135. *HYDNUM acaule arcuato rugosum romentum.* *Syst. veg.* 1112. 6.

*Aan neergehouwene boomē te Putten op
de Veluwe.*

*In ons land groeiende gevonden (Houttuyn
Natuurl. hist. II deel XIV ft. bl. 634.)*

- pineti.* 136. *HELVELLA acaulis.* *Syst. veg.* 1214. 2.

In het bosch van Vanenburg op de Veluwe.

137. CLAVARIA clavæformis simplicissima. Syst. pistillaris.
yeg. 1216. I.

Aan het eind van de hoge Sypel, en op de agterste Stads-weide by Harderwyk.

138. CLAVARIA clavata integerrima compressa *ophioglossoides*.
obtusa. *Syst. veg.* 1216. 5.

Aan het eind van de Zandsleeg, en op andere vogtige plaatzen, op de heide by Harderwyk.

139. *Lycoperdon parasiticum* subrotundum *truncatum*. *Syst. veg.* 1237. 14.

In de boschen van het Loo (Ehrhart).



PLANTÆ DUBIÆ, QUARUM-
QUE HABITATIO IN BELGIO
INCERTA VIDETUR.

fruticosa. 140. SALICORNIA caule erecto fruticoso. *Syst.
veg.* 10. 2.

Inter indigenas Belgii stirpes numeratur a Linnaeo (*Flora Belgica in Amœn. acad.* vol. VI. p. 44.). Vix tamen crediderim, plantam hyemes nostras ægre ferentem, in patria nostra vere indigenam reperiri.

latifolia. 141. VERONICA racemis lateralibus, foliis cordatis rugosis dentatis, caule stricto. *Syst.
veg.* 25. 30.

Op het kerk-hof te Donjum, en in moes-hoven tuschen de vruchten, ook op akkers met bomen beplant in kweekeryen (*Mecce Flor. Fris. n.* 12.).

Videtur vir industrius hanc cum Veronica Chamaedry confudisse. Planta enim, huicdum non nisi in Helvetia, Austria & Bithynia visa, vix adeo vulgaris in Frisia esse potest.

142. GRAMEN paniculatum alpinum latifolium,
panicula miliacea sparsa. *Scheuchzer Agro-
stogr.* p. 134.
Milium confertum. Linn.

„ Cum hoc conferri meretur gramen, quod

„ mense majo copiose crescit in nemore Ha-
„ gæ Comitum adjacentem." Scheuchzer l. c.

143. **LONICERA** floribus verticillatis termina- *Caprifoliaceum.*
libus sessilibus, foliis summis connato per-
foliatis. *Syst. veg.* 233. 8.

*In Vriesland, op veele plaatzen in de Wouden
in boschen en wildernissen (Meese Flor.
Fris. n. 96).*

Lonicera Periclymenum intellexisse videtur
Meesius.

144. **ERICA** antheris aristatis, corollis campa- *Scoparia.*
nulatis, stigmate exerto peltato, foliis ter-
nis. *Syst. veg.* 484. 14.

*Linnæus inter stirpes Belgii nostri indigenas
recenset (Flora Belgica, Amœn. acad.
l. c. p. 52). Sed videtur E. Tetralicem
voluisse.*

145. **RANUNCULUS** (*Philonotis*) radice fas-
ciculata, herba pilosa, caule erecto ramo-
so, foliis ternatis, foliolis trilobis, lobis
crenato incisis, apicibus puncto albo ter-
minatis, pedunculis sulcatis, calyce re-
flexo, fructu globose, seminibus compres-
sis acuminatis. *Ehrhart Hannov. Magaz.*
1783. f. 270.

*Aan zee-kant tuschen Harderwyk en Doorn-
spyk (Ehrhart). Quo tamen loco ipse non*

alias Ranunculi species, præter repente, aciem
& sceleratum inveni.

Ranunculus Sardous Crantzii, quem hoc refert
Ehrhartus, alia planta esse videtur.

146. ORCHIS batavica sexta. *Clusius Rarior.*
plant. hist. p. 268.

„ Rara inventu crescit in marinis aggeri-
bus — ; interdum etiam reperitur cir-
ca Hagam Hollandiæ ” (*Clusius l. c.*) .

147. CAREX spicis feminine pedunculatis laxis,
masculina erecta, fulcris petiolorum aphyll-
is spathæformibus. *Linn. Hort. Cliff. p.*
439. n. 7.

Crescit in nemoribus Belgii rarius (*Linn.*
l. c.).

Ceterach. 148. ASplenium frondibus pinnatifidis, lobis
alternis confluentibus obtusis. *Syst. veg.*
1178. 9.

Indigenam significavit Boerhaavius (*Ind.*
alt. t. I. p. 25.). Vix autem verissimile, fili-
cem hanc, quæ ob frigoris impatientiam in
hybernaculis nostris asservari solet, sponte in
Belgio crescere.

149. LICHEN, qui musco-fungus lichenoides ar-
borum hybernicus scutellatus Morisoni.
Boerh. Ind. alt. t. I. p. 17. n. 20†.

Huc pertinet Dillen, Musc. XXV. 98, qui est Haller Helv. n. 2002.

Boerhaavius d. l. indigenam esse significat.

150. LICHEN fruticulosus solidus aphyllus subramosus, tuberculis alternis. *Roccella*, *Syst. veg.* 1202.

115.

Coralloides n. 3†. *Boerh. Ind. alt.* n. 3. p. 19.

Ex insulis Archipelagi & Canariis ad usus tintorios afferri solet. Boerhaavius d. l. Belgii etiam indigenam esse notat; de quo tamen vehementer dubitaverim. Pluresque alias stirpes, gramine imprimis & cryptogamicas pro indigenis idem vir summus recenset, quas vix credas revera in Belgio nostro reperiri. Videtur autem Boerhaavius stirpium exoticarum notitia multo magis imbutus fuisse, quam minimarum & difficilioris indaginis indigenarum; (qua de re conferri merentur, qua Hallerus in *pref.* ad *Agrobiographiam Scheuchzerianam* de litterario quodam inter Boerhaavium & Scheuchzerum duello narrat); quod quidem, quin etiam hodie, post illustratas, a Scheuchzero Graminum, a Dillenio Muscorum & Algarum, familias, de multis botanicis nimis verum sit, Boerhaavio fane, eximiis his subsidiis plane destituto, & maximo in reliquis viro, quivis facile condonaverit.

* * *

* *

*

VARIETATES IN FLORA VII
 PROVINCiarum non RE-
 CENSITÆ.

ERICA vulgaris, corollis albis.

Hier en daar op de heide-velden by Harderwyk.

SAPONARIA officinalis, floribus plenis.

In den Enck by Harderwyk.

ANEMONE nemorosa, flore ex purpura ru-
 bente. Boerh. Ind. alt. t. I. p. 36. n. 2.

In het Haagsche bosch (Boerhaave l. c.).

ANEMONE nemorosa, flore pallide purpu-
 rascente. Boerh. l. c.

Op dezelfde plaats (Boerhaave).

ANEMONE nemorosa, flore pallide viridescen-
 te. Boerh. l. c.

By de voorgaande (Boerhaave).

GLECOMA hederacea, antheris in tubo flo-
 ris sessilibus.

Gemeen in het begin van het voorjaar by Harderwyk.

Talia specimina unice conspexisse videntur ill. Halle-
 ierius, quum inter characteres Glecomæ ponat: „ Sta-
 mina brevissima in tubo floris latentia ” (Hijp. Airp.
 Helv. n. 245.); & forte Scopolius, dum antherarum

stum cruciformem, satis cæterum manifestum, plane neget (*Flor. Carniol. t. I. n. 730.*). Tales quoque flores refellisse Retzium videntur, dum dicat, Glecomam hederaceam primo vere plerumque desitui floribus masculinis (*Vid. Comm. Lips. de rebus &c. t. xxiv. p. 675.*). Quum autem tales flores quasi-feminei primo tantum vere maxime frequentes obseruentur, haud alienum videtur flatuere, providam naturam ideo antheras in tubum corollæ recondidisse, ut, hac ratione, tenella illa generationis instrumenta adversus aëris inclem tam defendaret.

T H Y M U S Serpillum, angustifolium glabrum.
Linn. varietas ♂.

Op de heide-velden by Harderwyk.

P R U N E L L A vulgaris, corollis albis.
Op Doreweerd.

P R U N E L L A vulgaris (grandiflora), coerulea,
magno flore. *Syst. veg. 735. 1^a.*

In den Enck by Harderwyk.

Hallerus & Pollichius pro distincta specie describunt. Videtur autem varietas tantum esse Prunellæ vulgaris; quamvis tamen ab hac, eodem forte jure, distingui possit, ac P. Iaciniata, quam ipse Linnaeus ex vulgari or tam dicit.

P E D I C U L A R I S sylvatica, corollis albis.

Op de Gagel-kampen by Emaus buiten Harderwyk.

C A R D A M I N E pratensis, floribus plenis.

Op vogtige weilanden aan de zee by Harderwyk.

A N T I R R H I N U M *Linaria*, floribus inferioribus perfectis, superioribus monstrosis Peloriae.

Op een bouwland aan den Enck by Harderwyk, en aan den weg even buiten Naarden.

Flores, in plerisque mihi visis speciminiibus, 4 vel 5 superiores in Peloriam degeneraverant, reliquis Linariae naturalibus; in nonnullis unicus tantum Peloriae flos aderat. Ergo Peloria non est planta hybrida.

Flores inferiores Peloriae, superiores Linariae, vidit cl. Krascheninikof. Vid. Scopoli Fundam. botan. p. III.

B R Y U M s t r i a t u m ulophyllum, ♂. Linn.

Weissia ulophylla. Ehrhart Beiträge zur naturk. I th. f. 191.

Aan de bomen by Harderwyk, Haarlem, Leyden. en andere plaatsen.

B R Y U M e x c i n c t o r i u m majus, ♂. Linn.

Op den Esenburg by Harderwyk.

B R Y U M h y p n o i d e s virescens, ♂. Linn.

Op de heide-velden by Harderwyk.

L I C H E N i s l a n d i c u s angustifolius, ♂. Linn.

Aan het zee-strand tuschen Harderwyk en Doornspijk (Ehrhart).

L I C H E N i s l a n d i c u s tenuissimus, ♀. Linn.

Op de heide-velden by Harderwyk.

I N D E X.

A.		Confervæ gelatinosa.	pag. 64
<i>Agaricus lactifluus.</i>	pag. 65	reticulata.	ibid.
<i>pustulatus.</i>	ibid.		
<i>Aira præcox.</i>	17	Convallaria multiflora.	24
<i>Alisma natans.</i>	28	Crambe maritima.	35
<i>Anemone nemorosa</i> β , γ , δ .	72	Crataegus monogyna.	32
<i>Anethum graveolens.</i>	24	Cuscuta Epithymum.	21
<i>Anthoceros punctatus.</i>	53		
<i>Antirrhinum Linaria</i> β .	74	Dianthus deltoides.	29
<i>Afarum europæum.</i>	31		
<i>Asplenium Ceterach.</i>	70	E.	
<i>Atropa Belladonna.</i>	22	Erica multiflora.	28
		scoparia.	69
B.		vulgaris β .	72
<i>Blasia pusilla.</i>	52	Euphorbia campestris.	31
<i>Bryonia dioica.</i>	40		
<i>Bryum exstinctorium</i> β .	74	F.	
<i>hypnoides</i> β .	Ibid.	Festuca rubra.	18
<i>striatum</i> δ .	Ibid.	Fragaria sterilis.	33
<i>Buxbaumia aphylla.</i>	43	Fucus digitatus.	64
<i>Bysus faxatilis.</i>	65	loreus.	ibid.
C.		G.	
<i>Cardamine pratensis</i> β .	73	Galium faxatile.	21
<i>Carex sylvatica.</i>	40	Gentiana Amarella.	22
		filiformis.	23
<i>Cerastium aquaticum.</i>	30	Glecoma hederacea β .	72
<i>Chrysanthemum inodorum.</i>	39		
<i>Chrysosplenium oppositifoliū.</i>	29	H.	
		Helvella Pineti.	66
		Holosteum umbellatum.	20

<i>Hordeum maritimum.</i>	pag. 18	<i>Lichen Acetabulum.</i>	pag. 58
<i>secalinum.</i>	19	<i>aculeatus,</i>	62
<i>Hypericum montanum.</i>	38	<i>aphthosus.</i>	60
<i>pulchrum.</i>	bid.	<i>atér.</i>	56
<i>Hypnum curtipedulum.</i>	45	<i>atroalbus.</i>	54
<i>delicatulum.</i>	ibid.	<i>atrovirens.</i>	53
<i>filifolium.</i>	ibid.	<i>bryoides.</i>	53
<i>lutescens,</i>	47	<i>carpineus.</i>	54
<i>muticum.</i>	46	<i>centrifugus.</i>	57
<i>nitens.</i>	47	<i>cinereofuscus,</i>	55
<i>rugosum.</i>	45	<i>corallinus,</i>	54
<i>viviparum.</i>	47	<i>crispus.</i>	57
I.		<i>foliaceus.</i>	61
		<i>furcatus.</i>	63
<i>Inula Helenium.</i>	39	<i>islandicus ♂. & ♀.</i>	74
<i>Isatis tinctoria.</i>	35	<i>nigrescens.</i>	59
<i>Juncus nemorosus.</i>	26	<i>ochroleucus.</i>	55
<i>Tenageia.</i>	25	<i>orbicularis.</i>	57
<i>tenellus.</i>	ibid.	<i>Papillaria.</i>	62
<i>Jungermannia bicuspidata.</i>	50	<i>Parellus.</i>	56
<i>bidentata.</i>	49	<i>paschalis.</i>	61
<i>lanceolata.</i>	ibid.	<i>perlatus.</i>	60
<i>nemorosa.</i>	50	<i>pertusus.</i>	54
<i>pinguis.</i>	52	<i>pullus.</i>	58
<i>pulcherrima.</i>	51	<i>Roccella.</i>	71
<i>quinquedentata.</i>	50	<i>spinosus.</i>	61
<i>resupinata.</i>	51	<i>tartareus.</i>	56
<i>trilobata.</i>	ibid.	<i>tenellus.</i>	59
<i>undulata.</i>	50		70
<i>viticulosia.</i>	49	<i>Lonicera Caprifolium.</i>	69
L.		M.	
<i>Leontodon hirtum.</i>	38	<i>Marchantia cruciata,</i>	52

<i>Mentha hirsuta.</i>	pag. 34	<i>Riccia glauca.</i>	pag. 53
<i>Milium confertum.</i>	68	<i>natans.</i>	ibid.
<i>Mnium annotinum.</i>	44	<i>Rosa rubiginosa.</i>	33
<i>fontanum.</i>	ibid.	<i>Rumex Nemolapathum.</i>	27
<i>palustre.</i>	ibid.		S.
<i>polytrichoides $\alpha.$ & $\beta.$</i>	45		
<i>Myagrum paniculatum.</i>	35	<i>Salicornia fruticosa.</i>	68
	O.	<i>Salix aurita.</i>	41
		<i>incubacea.</i>	42
<i>Ononis spinosa.</i>	36	<i>repens.</i>	ibid.
<i>Ophrys spiralis.</i>	39	<i>triandra.</i>	41
<i>Orchis.</i>	70	<i>Saponaria vulgaris $\beta.$</i>	72
	P.	<i>Schoenus albus.</i>	16
		<i>fuscus.</i>	ibid.
<i>Panicum viride.</i>	17	<i>Sedum reflexum.</i>	30
<i>Papaver dubium.</i>	34	<i>Sium angustifolium.</i>	23
<i>Pedicularis sylvatica $\beta.$</i>	73	<i>Spergula pentandra.</i>	31
<i>Phalaris canariensis.</i>	16	<i>Stellaria aquatica.</i>	29
<i>Phascum muticum.</i>	42		T.
<i>piliferum.</i>	43	<i>Thymus Serpillum $\beta.$</i>	73
<i>subulatum.</i>	42	<i>Tremella lichenoides.</i>	63
<i>Pisum maritimum.</i>	37	<i>Trifolium filiforme.</i>	37
<i>Poa falina.</i>	17	<i>procumbens.</i>	ibid.
<i>Polygala amara.</i>	36		U.
<i>Polygonum dumetorum.</i>	28	<i>Ulva umbilicalis.</i>	64
<i>Polytrichum urnigerum.</i>	44		V.
<i>Potamogeton gramineum.</i>	22	<i>Valsa corticalis.</i>	63
<i>marinum.</i>	ibid.	<i>Veronica latifolia.</i>	68
<i>Prunella vulgaris $\alpha.$ $\beta.$</i>	73	<i>verna.</i>	15
	R,		
<i>Ranunculus Philonotis.</i>	69		
<i>Riccia crystallina.</i>	52		

1449725

C O R R I G E N D A.

Praefat. pag. xi. not. lin. 4., leg. *Phytophyiacum*.

pag. 17. lin. 27. *maritima*, leg. *salina*.