



Theses seu communes, loci totius rei Medicae. ;

<https://hdl.handle.net/1874/436774>

THESES

SEV COMMVNES, LOCI
totius rei Medicæ.

ITEM.

DE VSV PHARMACO-
rum, deq̄ artificio suppressam
aluum ciendi, Liber.

Per Othonem Brunfelsium.



ARGENTORATI EXCVDE-
bat Georgius Vlricher Andla-
nus, Anno M D XXXII.

EPIGRAMMA

IOHANNIS MÜNTERI

Gandauensis, in harum The-
sium commendationem.

Artis Apollineæ, lector studiose, libellos
Accipe, quos mittit πῶδ' ἄδ' ὄς Otihō decus,
Instar apīs, uirides quæ sedula peruolat herbas,
Optima collegit mella fauosq; tibi.
Ac ueluti Moses sitienti pocula plebi
Præbuit, incussa rupe, uerendus aquam,
Sic tibi doctiloquus Brunfelsius ore propinat,
Cautibus è duris, nectar & ambrosiam.
Hos uersa assiduo noctuq; dieq; labore,
Ditat cultores, hic bene cultus ager.

IOHANNES

M V N T E R V S N I C O L A O

Syluio suo, trium linguarum pe-
ritissimo, Lubecensiumq; Aca-
demiaē lectori publico.

S. P. D.



Vo diutius ac lon-
ginquius alter ab
altero seiungimus,
Nicolae doctissi-
me, tu Daniae uici-
nus, ego Afsatig, eò
magis atq; magis
tui teneor desyde-
rio. Nec ulla mihi

die Sol exoritur, imò nullum momentū
præterit, quin non singularem beneuolē-
tiam, candoremq; erga me tuum memo-
ria mecum repetam, exosculer, adorem.
Neq; quisquam ueterum amicorum me-
orum sic cor meum penitius sibi uendica-
uit, ut tu. Quod autem crebrius scribenti,
iamdiu nihil responderis, non queam es-
tiam, si uelim, tibi succensere, adeo de a-
micis semper optima conijcio, & uel in
temporum infœlicitatem, uel in literarū

P R A E F A T I O A D N I

interceptores hanc culpam reiſcio. Quæ propter cum nunc certo certius comper-
tum habeam, meas ſi non ocuſſime, ſaltẽ
breui ad te literas peruẽturas, noſui pro-
ſus ſine munuſculo ad te ire. Quonã in-
quies: gemmeo ne uel auro: imo charra-
ceo, quod tamen nec gemmis nec auro
ſua cedat nobilitate. Quod ut intelligas,
audi me pauliſper. Quadriennium fer-
mẽ eſt, q̃ in Germaniam ſpõte me, ut no-
ſti, receperim, hic ne nihil agerem, uifum
eſt mihi, mea ſtudia non quidem muta-
re, ſed auctiora reddere, ac forte fortuna,
bonis, ut aiunt, auibus, incidi in Medicæ
paleſtræ candidatos. Quippe ad quã mi-
hi longe magis, à pubeſcentibus annis,
q̃ ius ciuile, ſemper animus geſtijt, fuiq̃
natura propenſior, utpote memor illius
Pliniani: Optimam eſſe Medicinæ exer-
citationem. Inter hos eſt Otho Brunſelſi-
us, uir ſane citra iactantiam, neſcias docti-
or ne an exercitior, nec ſolum de huius
artis alumnis, nõ infimo loco, bene me-
ritus. Is me donauit hoc Aphoriſmorum
belliſſime in ſuas claſſes digeſtorum *εϋχα-
ριſτῶ*, donatione autem ſic omnino rata,
ut mihi mancipatum uoluerit, uel cū uitẽ
ne

COLAVM SYLVIVM.

necisq̄ potestate, hoc est, aut ædendi, aut
supprimendi, si uelim. Verum licet non
sim ea præditus eruditione, ut bona stu-
dia possim adiuuare, tamen id pro uirili
cupiam quàm maxime, nec inter plaudē-
tes, opinor, fuerim postremus. Itaq̄ cum
mihi mirum in modum liber hic arrise-
rit, nolui eum mihi soli usui esse, ut faciūt
nōnulli, præsertim uetuli, potius ad imos
manes huiusmodi secum rapientes, quã
superis gratificaturi. Tu igitur potior ui-
sus es, cui hanc methodum (à qua utinã
ἐμπερικὸς, similesq̄ non abhorreant) de-
dicarem, tum q̄ ab hac disciplina mini-
me sis alienus, tum q̄ ualitudinis tuæ cu-
randæ quoddam futurum sit incitame-
tum. Encomion operi adscribere super-
uacuum puto, quia uino uendibili nō est
opus suspensa hædera: probaq̄ merx sese
fatis laudat. Adiecimus nos Arnoldi Ne-
ocomensis medicinalium libros duos,
quem qui aspernatur, q̄ parum propitijs
Musis scripserit, quæ res, haud dubiũ, cul-
pa temporum contigit, is meminerit o-
portet, q̄ non eloquentia curentur mor-
bi, sed eruditione & experientia, sedulaq̄
opera. Secundus liber præparationem

P R A E F A T I O.

medicaminum continet, & artificium uerum
 trem soluendi, quæ plane pro secreto mihi
 hi donauit, atq; cõmisit idem bonus uir,
 non quia tanta res sit componere medi-
 camina, sed quia ab infulatis & titulari-
 bus illis magno æstimatur, purpurasq; lar-
 gitur & censum. Proinde tu, cæteriq; le-
 ctiores operam nostram boni consulite.
 Sed heus, ex animo gratulor tibi tantam
 conditionem, gratulor & prudētissimi
 præclare Lubecensium Reipublicæ Sena-
 toribus, qui tanto iudicio uirum tā eximi-
 um ciuibus suis præfecere. Cognoscent
 spero & opto propediem, q̄ non penes
 ingratum salarium suum collocarint. Ser-
 uet te, tuosq; Seruator ille noster uni-

cus, Rex gloriæ, & dominus
 potens in prælio, Chri-
 stus Iesus, & uale,
 pridie kalendas
 Maias, ex Ar-
 gentoratorum ciuitate
 clarissima.

Theo

THESES REI

MEDICAE.

Medicina.	Abscessus.
Medicus	Hulcera.
Homo.	Circumstantia locorum,
Natura hominis.	temporum, etatum, & se-
Humores.	xus.
Sanguis.	Pharmaca.
Phlegma.	Semen genitale.
Cholera.	Fœtus.
Melancholia.	Epidimie.
Anatomia.	Loca affecta.
Morbi & eorum nos-	Predictiones. Somnia.
mina.	Afrecorum obseruatio.
Morborum causse.	Venarum sectio.
Morborum symptomata.	Hirudines.
Morborum differentie.	Cucurbitule.
Naturales facultates.	Valitudinis tuæ de ratio.
Elementa.	Exercitium.
Febres.	Veſtio.
Pulsus.	Gestatio.
Criſes.	Vnctio.
Vrine.	Abſtinentia.
Ratio uictus.	Affectus.
Deiectiones alui.	Spirationes.
Solutio continui.	Plenitudines.
Tumores præter naturam.	

INDEX SINGV

GVLORVM CAPITVM

& contentorum.

DE summa totius rei medicæ.	1°
De medico & eius officio.	1.2.3.4°
De circumstantijs obseruandis in medicando.	5
De medicamentis.	5.6°
De consuetudine non facile immutanda.	7°
De moderantia & temperamento seruando.	7
De pernitiâ nimie repletionis, & ratione uictus sanorum.	8°
De ratione uictus ægrorum.	9.10.11.12.13. & 14°
De fame.	14.
De uino.	15
De aqua mulsa.	15.
De oximelle,	16°
De melle & quibus conuenit.	16°
De aceto.	17.
De aqua eodem.	17.
De temporum mutationibus.	17.18.19°
De Vere.	19.21.
De morbis æstatis eodem.	19.21.
De Autumno.	20.21.
De hyeme.	20.22°
De pueritia & iuuentute.	22
De crassitie & pinguedine.	23°
De macilentia.	23°
De senectute & eius incommodis.	23°
De subita mutatione uitanda.	24
De siti eodem.	24°
De 4 humoribus.	24°
De sanguine.	25°
De uenæ sectione, uel sanguinis missione.	26°
De atra bile.	27°
De Phlegmate.	27°
De tie	

I N D E X.

De timore & tristitia.	27.
De ratione morborum, & morbis curandis in generali.	28.
De natura humana.	29
De morborum indicationibus.	30.
De præfagijs morborum in generali.	31.
De notis ex facie,	33.
De signis aduerse ualitudinis.	34
De bonis in ægotantibus signis.	35
De malis signis ægotantium.	36.
De signis longæ ualitudinis.	37.
De indijs mortis	38.39.40.
De notis quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit	41.42.43.44.45. & 46.
Quæ notæ in quoquo morbi genere, uel spem, uel pericula ostendant.	47.48.49.50.51.52. & 53.
De præfagijs ex decubitu	54.
De præfagijs ex somno.	55
De laetitudine.	55.
De signis mortis	56.57.58.59.
De aluo ducenda	59.
Quando expediat euacuare	60.61.
De aluo ducenda	62.63.64.
De alui profluuijs	65.
De Helleboro & eius usu	66
De dysenteria	66
De alui excrementis.	66.67.
De alui constrictione	68

I N D E X.

De Phlebotomia	68.69.70.71.	
De sanguinis deiractione per cucurbitulas.		72.
De balneis	73	De fricatione, 74.75.76.
De gestatione	76.	De exercitio
De capite De cerebro.		77
De sternutationibus	De facie	78.
De mania & phrenitide		79
De oculis.	De auribus & auditu	80
De faucibus	eodem	
De gutture & angina	De lingua	81.
De dentibus	De apoplexia	eodem
De morbo comitali.		81.
De pleuritide, & morbis pectoralibus		82.
De uentre	De epate	83.
De hydrope	84.	De tabe
De morbo regio	86	85
De pure & sputo	86.	De singultu
De intestinis	87	86.
De hemorrhoidibus	88	De osibus
De sudoribus	91.92.93.	87.
De frigoribus	94.	De lyene
De gerentibus in utero		88
De mulieribus		De urina
De foetu & secundis	98.	89.90.91.
De abscessibus		De caloribus
De podagra	101	94.
De febribus		95.96.
		De menstruis
		97.
		De semine & cocep.
		98.
		99.100. & 101.
		De Eresypilate
		102.
		102.103.104.
		De

I N D E X.

De angina	107	De tuberculis	112
De dolore	115	De spasmo	115
De somno & uigilia	125	de supuratione	116

I N D E X I N S E N T E N T I

as medicinales Alexandri Benedicti.

De medico & eius officio			118
De cura morborum in generali, deq; conferentibus et nocentibus			120
De sanguine & sanguinis detractione, quibusq; conueniat, & quo potissimum tempore			122.
de ministracione pharmacorum, de aluo ducenda, & circumstantijs, quæ requiruntur ad eam rem			124.
de ratione uictus sanorum & ægrorum			126
de febrium curatione		eodem	
de morbis qui capiti accidunt, interni & externi, & de cura eorundem			127.
de uitijs aurium			128.
de passionibus stomachi, singultibus, fame, siti, uomitibus, dolore, & id genus alijs			130
de ægri tudinibus hepatis, & quæ illi accidunt, de hydropse & de eiectionibus			133.
de passionibus pectoris, & cordis, & præcordiorum, & eorum cura.			129
de dysenteria, torminibus, colica, stranguria, & hæmorrhoidibus			134
de uescica, calculosis, urina, uenere, menstruis, & prægnantibus			135
			de

I N D E X.

de podagricis & articularum doloribus	136
de solutione alui	141
de pharmacis ab extra applicitis, & euacuation.	143.
In quibus pharmacis somnum cōuenit prohibere.	143.
Mensura euacuationis per pharmaca	eodem
Regula uitandi constrictionē uentris post euacua.	eod.
Canones alterandi post pharmatiam membra distra	
siata	144
Canones mensurandi tēpus, quod cura sufficiat.	eodē
Vicera & suppuraciones	137.

I N D E X S E N T E N T I A

rum Medicinalium Arnoldi Neocomen-
sis, de morborum curationibus.

F ons omnis medicine	138
de medico	eodem
de ratione & electione medicamentorum	eodem
de humoribus & succis malignis, deq; curatione	139.
de uentosis & cucurbitulis	140
de Phlebothomia	eodem
de curatione morborū per instrumēta chirurgica.	145
de his quæ impediunt curationem	eodem
Curatio meatus innaturalis	146
Cura asperitatis innaturalis	147.
Curatio lenitatis innaturalis	148
Excessus totius corporis uel membri	eodem.
de diminutione supplenda totius corporis uel mem	
brorum	149
	Corre

I N D E X.

Correctio situs innaturalis	eodem
de mulieribus & solutione continuitatis	eodem
Artificium componendi potionem uulnerariam	eodē
Quæ prohibent uulneratis potione administrare	150
Quibus uulneratis competant potiones	eodem
Quibus uulneratis uinum non conuenit	eodem.
Artificium sanguinem compescendi	eodem
Artificium sanguinem resoluendi intra corpus	151.
Quomodo consolidatio uulnerum procuretur	eodē
Ingenium curatiuum ulcerum sordidorum & malignorum	152.
Canones medicandi neruos	eodem
Quæ in fracturis ossium sint obseruanda	153
Curatio apostematum	253
Regimen conualescentium	154.
Pericula recidiuantium	155

I N D E X S E N T E N T I A

rum medicinalium Arnoldi Neocomensis, de singulorum morborum remedijs, & methodo curandi eos.

A Egritudines capitis	156
Vertigo & Scotomia	159
de Epilepsia de frenesi & litargia	160
de manica & melancholica passione	eodem
de parali & apoplexia	162
Passiones membrorum neruosorum	eodem
de Spasmo	162
de uisu	163
	de

I N D E X

de membris organicis, & de passionibus oculorū.	163.
Aurium passiones Passiones narium	164.
Conseruatio memoriae, & aliarum uirtutum, sanitatis cerebri	165.
Canones ægriitudinum, membrorum spiritualium, nutritiuorum & generatiuorum, & primo de spiritualibus	167.
de sudore de Epate calido	eodem.
de febribus	168.
Administratio uini in febricitantibus	eodem.
de uoce	eodem.
Passiones membrorum nutritiuorum	170.
de Hepate	172.
Intestinorum & partium uentris passiones	172.
Conseruatio in lapsis corporibus, cum ijs qui lapsum corrigunt.	174.
de conferentibus & nocentibus iuncturis, & primo de nocentibus	eodem.
de conferentibus iuncturis	175.
Arnoldi Nouicomēsis de morbis uestigadis regule	176.
Eiusdem Arnoldi de curatione febrū regule	40. 177.

INDEX SE

CVNDI LIBRI THESIVM,

de usu pharmacorum, & artificio suppressa

sam alium ciendi, per Othonem

Brunfelsium.

Ratio

I N D E X.

R atio scribendi & disponendi recepta	183
Receptas, ut uocant, disponendi ratio alia, ex B. Montagnana alia ab ea que superius est descripta.	184
Ordo disponendi unguenta, emplastra, trageas, & electuaria	eodem
Mixturarum ratio alia	eodem
Regule aliquot de medicinarum preparatione	185.
Pondera uulgata, ut hodie habentur in usu	186.
Canones in euacuatione obseruandi	187.
Canones aliquot in solutione alui obseruandi ex Celso, Galeno & ueteribus	189
In quibus morbis conueniat ducere aluum ex Celso & alijs	189
Pharmaca uentrem ducentia, simplicia Io. Mesue. 190.	
Que pharmaca, à quibus membris principalibus euacuent cathartica capitis	192
Pharmaca ueterum quibus aluum purgabant de his que catartice miscentur	193
Res ipsæ quibus utimur ad confectionum medicaminum	eodem
Aque uulgares quibus communiter utuntur ad mixturas syroporum, & epithimatum.	194
Aque capitales	eodem.
In quo pondere propinandi sint syrups & digestiua, ex Montagnana	196
Syrups qui magno artificio constant	eodem.
	Cons

I N D E X.

Confectio Rob.	197
Ratio confectionum	eodem
Epithimata.	eodem
Forma scribendi epithimata	198
Embrocatio,	eodem
Preparatio unguentorum	199.
Forma scribendi unguenta	eodem
Linimenta	200
Preparatio emplastrorum	eodem.
Forma scribendi emplastra.	eodem.
Confectio Trochiscorum, & differentia pillularum & Trochiscorum	200
Summa electuariorum calidorum.	201
Summa electuariorum frigidorum	202
de decoctionibus	eodem
Correctio medicinarum	204.
de doloribus solutiuorum, tam simplicium quàm com- positorum	206
Confectio Ceratorum	211
Syrupus respiciens stomachum & cerebrum	eodē.
Iulep & syrapi differentia	212
Confectionis & electuarij differentia	eodem
Mixturarum & electuariorum differentia	eodem
Ex Plinij libro 26. cap. 8.	214.
Ex Dioscoride libro 1. uentrem soluentia	216
Phlegma ducentia.	217.
Mixtos humores educunt, Phlegmati & cholore com- munia	munia

I N D E X.

munia sunt	218
De Coccognudio	eodem.
De Scammonea	219
De Fumo terra.	eodem.
De Rhabarbaro	eodem.
Aqua Casei	eodem.
Tamarindis	eodem.
Psilio	eodem.
Turbith	eodem.
De Agarico	220
de colocyntide	eodem.
de cucumere asinino	eodem
de Mirabolanis Kebulis & Belliricis	221.
de sale gammato	eodem
de Euphorbio & Epatorio.	eodem
de Hermodactylis	eodem
De soluentibus Melancholiam, de lapide Lazuli	eodē
De lapide armeno	eodem
De Epithymo	222
De folijs Senæ	eodem
De Chamedri	eodem
Bartholomei Montagnanie Regule, de pharmacorum administratione.	eodem
Eiusdem Bartholomei canones alij, in compositione medicaminum	225.
De compositione Sacculorum	226.
De iuuamentis oculorum, olea mitigatiua	227
	De

I N D E X

De ordinatione Clysterium	218
Simplicia Clysterium.	eodem.
Formule aliquot clysterium ordinandorum, clyster conferens delicatis & choliciis, educens phlegma, & melancholiam	229.
Regule obseruandæ in dandis clysteribus	230.
De differentia clysterium	eodem.
Variorum clysterium typi,	eodem.

F I N I S

ERRATA

In epistola lege $\epsilon\gamma\chi\epsilon\gamma$. In eadem lege hedera. Fol.
 4. fa. 2. artificem. Fol. 9. fac. 2. lin. 3. semibus. Fol. 15. fa.
 2. lin. 16. alui biliosa. 16. lin. 6. uiribus. 22. linea 21. brus
 ma. Eod. lin. 15. uerruca. 24. lin. 8. uentre. 26. lin. 15. san
 guine misso. 30. lin. 12. iudicationibus. Θ 15. iudicabunt
 34. lin. 8. acres. 37. lin. 24. dele subsidunt. 41. fa. 2. li. 25.
 finitur. 44. lin. 12. lateris. 49. fa. 2. lin. ult. lege $\Phi\upsilon\mu\alpha$.
 Ta. 51. fa. 2. lin. 2. dele, deinde oriuntur. 71. fa. 2. lin. 22.
 medico. lin. penult. finis. 72. fa. 2. lin. 14. lege uitium. 74.
 lin. 1. ambientem. 81. fol. 2. lib. 3. impossibile. 82. lin. 11.
 spumofum. 83. lin. 23. circuitus. 89. lin. 3. pro utrices le
 ge uarices. 96. fa. 2. lin. 14. lege quecunq;. 217. Carta
 mus. 201. diarodon. 182. gemmatum.

The first part of the report is devoted to a general
 description of the state of the country, and the
 progress of the war. It is then divided into
 several chapters, each of which contains a
 detailed account of the operations of the
 army in a particular part of the country.
 The first chapter is devoted to the operations
 of the army in the north-west, and the
 second to the operations in the north-east.
 The third chapter is devoted to the operations
 in the south, and the fourth to the operations
 in the west. The fifth chapter is devoted to
 the operations in the east, and the sixth to
 the operations in the south-east. The seventh
 chapter is devoted to the operations in the
 north-east, and the eighth to the operations
 in the south-east. The ninth chapter is
 devoted to the operations in the west, and
 the tenth to the operations in the south-west.
 The eleventh chapter is devoted to the
 operations in the north, and the twelfth to
 the operations in the south. The thirteenth
 chapter is devoted to the operations in the
 east, and the fourteenth to the operations
 in the west. The fifteenth chapter is
 devoted to the operations in the north-east,
 and the sixteenth to the operations in the
 south-east. The seventeenth chapter is
 devoted to the operations in the north-west,
 and the eighteenth to the operations in the
 south-west. The nineteenth chapter is
 devoted to the operations in the north-east,
 and the twentieth to the operations in the
 south-east. The twenty-first chapter is
 devoted to the operations in the north-west,
 and the twenty-second to the operations in
 the south-west. The twenty-third chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the twenty-fourth to the operations in
 the south-east. The twenty-fifth chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the twenty-sixth to the operations in
 the south-west. The twenty-seventh chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the twenty-eighth to the operations in
 the south-east. The twenty-ninth chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the thirtieth to the operations in the
 south-west. The thirty-first chapter is
 devoted to the operations in the north-east,
 and the thirty-second to the operations in
 the south-east. The thirty-third chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the thirty-fourth to the operations in
 the south-west. The thirty-fifth chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the thirty-sixth to the operations in
 the south-east. The thirty-seventh chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the thirty-eighth to the operations in
 the south-west. The thirty-ninth chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the fortieth to the operations in the
 south-east. The forty-first chapter is
 devoted to the operations in the north-west,
 and the forty-second to the operations in
 the south-west. The forty-third chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the forty-fourth to the operations in
 the south-east. The forty-fifth chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the forty-sixth to the operations in
 the south-west. The forty-seventh chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the forty-eighth to the operations in
 the south-east. The forty-ninth chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the fiftieth to the operations in the
 south-west. The fifty-first chapter is
 devoted to the operations in the north-east,
 and the fifty-second to the operations in
 the south-east. The fifty-third chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the fifty-fourth to the operations in
 the south-west. The fifty-fifth chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the fifty-sixth to the operations in
 the south-east. The fifty-seventh chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the fifty-eighth to the operations in
 the south-west. The fifty-ninth chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the sixtieth to the operations in the
 south-east. The sixty-first chapter is
 devoted to the operations in the north-west,
 and the sixty-second to the operations in
 the south-west. The sixty-third chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the sixty-fourth to the operations in
 the south-east. The sixty-fifth chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the sixty-sixth to the operations in
 the south-west. The sixty-seventh chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the sixty-eighth to the operations in
 the south-east. The sixty-ninth chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the seventieth to the operations in the
 south-west. The seventy-first chapter is
 devoted to the operations in the north-east,
 and the seventy-second to the operations in
 the south-east. The seventy-third chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the seventy-fourth to the operations in
 the south-west. The seventy-fifth chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the seventy-sixth to the operations in
 the south-east. The seventy-seventh chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the seventy-eighth to the operations in
 the south-west. The seventy-ninth chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the eightieth to the operations in the
 south-east. The eighty-first chapter is
 devoted to the operations in the north-west,
 and the eighty-second to the operations in
 the south-west. The eighty-third chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the eighty-fourth to the operations in
 the south-east. The eighty-fifth chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the eighty-sixth to the operations in
 the south-west. The eighty-seventh chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the eighty-eighth to the operations in
 the south-east. The eighty-ninth chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the ninetieth to the operations in the
 south-west. The ninety-first chapter is
 devoted to the operations in the north-east,
 and the ninety-second to the operations in
 the south-east. The ninety-third chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the ninety-fourth to the operations in
 the south-west. The ninety-fifth chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the ninety-sixth to the operations in
 the south-east. The ninety-seventh chapter
 is devoted to the operations in the north-west,
 and the ninety-eighth to the operations in
 the south-west. The ninety-ninth chapter
 is devoted to the operations in the north-east,
 and the hundredth to the operations in the
 south-east.

THESES

SEV LOCI COMMVNES
totius rei Medicæ, ex optimis ac uetustissi-
mis Scriptoribus, qui Aphorismos
& Gnomas medicinales con-
scripserūt, per Orthonem
Brunfelsium nuper
in ordinem
digesti.

DE SVMMA TOTI-
us rei Medicæ.



Ita breuis, ars ue-
ro longa, occasio
autem præceps, ex-
perimentum peri-
culosum, iuditiū
difficile. Nec so-
lū seipsum præstare
oportet oportuna
facientem, sed & ægrum, & assidentes,
& exteriora. Hip. lib. 1. Aph. 1.

DE MEDICO ET
eius officio.

○ Mnia secundum rationē facienti, si
nō succedat secundū rationem, nō
a est

THESES TOTIVS

est transeundum, stante eo quod à principio uisum est. Hip. lib. 2. Aph. 52.

Nihil perinde medico conducibile censeo, quàm ut prudentè se prestare laboret. Præfag. lib. 1. Aph. 1.

Si enim apud ægros præterita, præsentia & futura, atque ea quæ ipse inter narrandum nouerit, prædixeritque, nihil quod ægros usui fuerit, ignorare putabitur. Quofit ut audentius homines medico sese committant. Præfag. lib. 1. Aph. 23.

Etenim perquam salutarem adhibebit curationem, si futuras affectiones præuiderit. Nam fieri nõ potest, ut omnes ægros sanitati restituat, quanquam hoc multo præstantius erat, quàm futura prænoscere. Præfag. lib. 1. Aph. 4.

Igitur cum homines intereant, alij quidem ob morbi uehementiam, antequam uocetur medicus. Nonnulli uero, uocato licet medico, repente moriuntur. Ac alij uiciduntaxat die, alij paulo longiori spacio uitam extendunt, priusquam medicus arte suã singulis morbis occurrẽdo resistat. Proinde harum affectionum naturas cognoscere oportet, quantum uidelicet corporis uiribus sint superiores. Præf. li. 1. Aph. 5. 6.

Quin

Quinetiam si diuinum quippiã morbis inest, eius quoq; prouidentiam perdisce. Sic enim optimo iure, & admirabilem, & bonum se præstabit medicum. *Morbina fugitur à Deo, uel ethnici etiam hominis testimonio.*

Præfag. lib. 1. Aph. 7.
Quos enim superstites fore cognouerit, eos rectius quoq; seruabit, utpote ex multo tempore singula consulte perpendens. Itaq; morituros, uicturosq; præsentens, atq; denunciatus, omnem prosum calumniam uitabit.

EX RASE.

Quam plures doctorum libros legere, & secreta eorum inspicere nimium confert.

Qui ex scientia naturali & Philosophia adiutus non fuerit. Nec ex canonicis Logicæ, & in rebus sæcularibus delectatur, medicus dubitabilis debet esse, & maxime medicinæ. *Philosophia medicinae necessaria.*

Doctores medicinæ ægros debent consolari, etiam si signa mortis perpendant. Corpora enim hominum spiritus eorum sequuntur.

Spiritus doctoris humilis, admodum confert ægris, & eius contrarius, non confert. *In Trascones.*

T H E S E S T O T I V S

Imperiti nihil minus quam medici. Laici & qui ex ingenio proprio uolunt iudicare, & iuuenes qui res non sunt experti, interfectores.

Decet magistrum ægrum interrogare, ut causam ægritudinis interiorē cognoscat, & postmodum rationabile iudiciū præstare poterit. Debet etiam ab alijs urinarum iudicia uidere, & earum iudicia audire, ut perueniat ad cognitionē morbi.

Dubitabilis est medicus, qui iudicat facile.

Decet magistrum ægri consuetudinē cognoscere in sanitate, ut cum res ipsi placentes in sanitate cognouerit, ei eas promittat, cum ab ægritudine ereptus fuerit.

Contra temerarios. In ægritudinibus non facile proferas iudicium.

Facile imponit urina. Ne facile pronunties de urina, nisi postquam ægrum uideris, & eum interroga ueris atque examinaueris.

E X D A M A S C E N O .

Medicus est adiutor nature. **S**I naturam iuueris, medici officium feras.

Pharmaca propinaturus, ne quid de deris quod membris officiat principalibus.

Viti-

or
nt
b

Vitium anime, sequitur complexio natura, quando igitur corpus & membra principalia patiuntur, medicinam animæ exhibe, id est, gustus, odoratus & auditus. *Medicus si totus in confortatione cordis*

Medici illiterati, simplices, & adulescentes, ut plurimum sunt homicidæ.

Ingenium naturale medici, cum parua arte adiuuat naturam. *Mars in sexta efficit medicum*

Interrogatus responde cum iudicio & prudenter.

Cuius qualitatem complexionis nouisti sani, eius infirmitatem non facile quoque deprehendes infirmi.

Crede experimento sine ratione, fallax est. *Cōtra empiricos.*

Nulla ægritudo est, quæ non opus habeat interrogare infirmum.

Vbi plurimi concordant, & ratio attestatur, & experimentum comprobatur, illud ante oculos statuendum est, contrarium uero contrarium.

Propter diurnitatem ægritudinis, non facile deficias ab infirmo.

Ad eam temperantiam duc infirmum, quam habuit dum esset sanus.

Non præsumas super aliqua infirmitate

T H E S E S T O T I V S

te curanda, nisi post certissimam scientiam. Albu. lib. 2.

E X S O R A N O,

De etate medici. **M**edicinæ iniciandus ea ætate sit, ex qua maxime è paruis homines trāsseunt ad magnitudinem, quod est in annos undecim. Hæc enim ætas est apta, ad sumendam sanctam artem medicinæ.

De habitu corporis. Corporis magnitudinem talem habet, at, ut neq; pinguis sit, neq; brevis admodum, & ut iuuentutem liberaliter agat, & senectutem utilem atque facilem ducat.

Medicus sit studiosus. Natura & animo sit studiosus, & ingeniosus, ut citius intelligat & docilis sit.

Fortis uiribus. Fortis sit, ut possit per diem sustinere labores, quoniam undiq; horrenda, & tanq; insuauia, & alienos casus, suas facit esse tristitias.

Doctus. Disciplinarum quoque & uirtutum cæterarum nequaquam sit expers, & citica mores habeat diligentiam, ut & in arte sit perfectus, & moribus sit optimus.

Bonus uir. Quod si unum de duobus defuerit, mes

melius esse uideretur, esse bonum quam artificum perfectum, mores habentem malos. Modestis quidem mores quod in arte deest, honestate repensare uidentur.

Grammaticam, Rethoricam, Arithmeti- *Liberaliū arcium pe ritus.*
 cam, & Astronomiam sciat, ut cognoscat syderum ortus, & occasus, & motus, & anni tempora, quòd cum ipsis & nostra corpora permutantur, & eorum mobilitate & perturbatione, ægritudines in hominibus commouentur.

Non sit superbus medicus, sed pauperes & diuites, seruos & liberos pariter curet.

Mercedes si quidem dantur, accipiantur, & non recusentur, si non dentur, non exigantur, quia quantum quisque dederit, nō potest ulla exequare mercede beneficia medicinæ. *Hic canon est hodie abrogatus*

Domos autem quas ingreditur, ita ingrediatur, ut ante oculos, cutam habeat tantummodo laborantis.

Memor etiam sit iuramenti Hippocratis, ut ab omni culpa sese abstineat, maxime uero à uenereo actu.

Ea quæ in domibus aguntur, & di-
 a 4 cum

T H E S E S T O T I V S

cuntur, tanq̄ myſteria celanda exiſtimet,
ſic enim & ſibi, & arti laudem acqui-
ret.

E X H I P P O C R A T I S
libro de natura huma-
na.

Sic medicum morbis mederi oportet,
ſhabita bene cuiusq̄ quod in corpo-
re pro tempore & eius natura uiget rati-
one.

In primisq̄ non ignorare debet, mor-
bos qui ex impletione proficiſcuntur, exi-
nitione curari, & ediuerſo, qui euacue-
factione proueniūt, ſanari ſaturitate, qui
à labore, hos à quiete, qui ex otio, eos ex-
ercitio uinci oportere.

In ſumma, oportet medicum ſcire ob-
ſiſtere inſtantibus, & morbis, & formis,
& temporibus, & ætatibus, & contenta
laxare, & laxata contendere.

Multa quæ non referente ægro, medi-
cum prænoſcere neceſſe eſt, Hip. de rati-
one uictus ægrorum lib. 1.

Illum medicum imprimis laudādum
cenſuerim, qui in acutis morbis, ea quæ
plures enecare ſolent, longa, diuerſa ab
alijs

alijs ratione, in melius commutare potest.

Medicos quidam arbitrantur esse, qui medici non sunt, facile enim est apud imperitos nomina usu comprobata proferre, aut prifang cremorem, aut uinum, aut aquam nominare. Hipp. li. i. de ratione in morbis acutis,

Quia uariæ sunt ægrorum facies, animaduertat medicus, ne ullæ ipsum occafiones lateant, siue ad confyderationem illæ pertineant, siue ad numerum uel partem uel imparem referantur.

Maxime uero impares dies metuendi sunt, qui ægros in diuersas adffictiones distrahere consueuerunt.

Obferuādus namq; primus dies, quo debilior factus est laborans, confyderando initium, ex quo & unde acciderit, id enim præcipuum esse putatur, quod scire oporteat.

Itaq; interrogādo ægrum, hæc omnia perpendere debet, Inprimis capitis adffictionem, an dolore, grauitateq; infestetur. Deinde præcordia & latera. Hæc quidem nullo ne dolore crutientur. Illa uero num laborent, aut suspendantur, aut

Mundus uult decipi qui magis credit circulatoribus & uetulis, quã doctis uiris.

De obseruatione dierum ceterorum.

THESES TOTIVS

intorqueantur, aut satietate grauentur, aut
latus doleat, an simul cum dolore tussis,
aut tormina, aut uentris dolor infestet, &
secundum hæc afferto remedia.

DE CIRCUNSTANTIIS obseruandis in medicando.

ANte omnia inspicere oportet regio-
nem, & tempus, & ætatem, & mor-
bos, in quibus conueniat, aut non. Hip.
lib. 1. Aph. 2.

Condonandum etiam aliquid tem-
pori, ætati & consuetudini.

Quæ ex longo tempore consueta sunt,
insuetis minus molestare solent. Opor-
tet igitur ad insueta permutari.

Inspicere oportet & consyderare ho-
minis naturam, ætatem, formam, & an-
ni tempus, & morbi genus, & uictû mu-
tare, & remedia facere, modo demedo,
modo addendo, & omnem curatione,
ad cuiusq; ætatis habitum, tempora, for-
mas, morbosq; dirigere.

DE MEDICAMENTIS.

Qui salubritatem corporis habent,
per medicamenta euacuati, cito ex-
oluuntur, & qui prauo utuntur ci-
bo. Hip. lib. 2. Aph. 36. Qui

Qui bene se habent corpore, difficul-
ter ferūt medicationes. Lib. 2. Aph. 37.

Omnia secundum rationem facienti,
si non succedat secundum rationem, nō
est transeundum ad aliud, stāte eo quod
à principio uisum est. Lib. 2. Aph. 52.

Ex medicamenti portione, conuulsio
letalis. Lib. 7. Aph. 25.

EX RASE ET DA-
masceno.

COgnitis medicamenti est utendū, *At hodie*
quorum haberi copia potest. Et quæ *peregrina*
non es expertus, omitte. *quæq; dele-*

Medicinæ quædam dantur post cœ- *stant.*
nam, & ante dormitionem.

Infirmis & iam iam defectis, nulla me-
dicamina, aut cibaria danda, nisi ea quæ
facile patitur natura.

Medicina temperamento uicina, odo-
riferaq; si cibus quoq; fieri potest, optimū
est.

Ne unq; fortem medicinam propina-
ueris, ne & animum & corpus dissoluas.

Medicina stiptica, odorifera, tempera-
mento propinqua, principalia membra
confortat, ea igitur tibi præcipue est uten-
dum.

Medi-

THESES TOTIVS

Pauca sed electa, & ea certissima expe- dit habere in proptu Medicamina pauca tibi tenenda sunt, et quorum operationes & vires iam multotiens es expertus. Totius enim multitudinis notitia est incomprehensibilis, nec cum per singula uolueris inquirendo discurrere, multiplici diuersitate distractus, nescias cui debeas adhaerere.

Oportet quoque medicinam attemperare ad similitudinem operantis naturae, si dura uel tarda fuerit, non secundum quod uidetur inuamentum habere absque ratione.

In nullum morbum medicina confecta est, quae ad complexionem eius uel extoto, uel parte non pertineat.

Laus Herbarij & simplicium. Simples medicinae dubitabiles non sunt. Compositae uero moderate & prudenter sunt adhibendae.

Spiritus malus destruitur, cum quis propter aegritudinem membrorum non principalium accipit fortem medicinam, quae membra principalia resoluit, & complexionem destruit eorum.

De circumstantijs obseruandis. Oportet remedia adhiberi cum morbi occasione, repugnando, tum etiam uictus genera mutando. Inspecta tamen & considerata hominis natura, aetate, forma

ma, & anni tempore, & morbi genere, debes uictum mutare, & remedia facere, modo demendo, modo addendo. Hippo-
de natura humana.

Veteres paucis admodum medicamentis usi sunt. Nam præter ea quæ de acutis morbis præcipiunt, hæc duntaxat traderunt. Elaterium, id est, medicamentum quod purgandi uim obrinet, serum, lactis suo tempore potum. Quæ si satis ad morborum curationem fuissent extollenda, ut quæ pauca admodum, sed quibus nihil deesset, præscripsissent. Id uero longe abest à ueritate.

DE CONSVETVDINE

non facile immutanda.

Qui consueti solitos labores ferre, & si fuerint imbecilles & senes, non cõsuetis, fortibus atq; iuuenibus facilius ferunt. Lib. 2. Aph. 49.

Quæ ex longo tempore consueta sunt, & si dereriora sunt, insuetis minus molestare solent. Oportet igitur ad insueta permutari. Lib. 2. Aph. 6.

RAZES ET DAMAS.

Homines à consuetudinibus remouere, si consuetudo fuerit antiqua, periculosum

THESES TOTIVS

sum est. Vide ad hoc Tit. de circumstantijs
obseruandis in medicando.

HIPPOCRATES LI=
bro 2. de ratione uictus in mor
bis acutis.

Mutationem laudo, si modica fuerit,
recta enim debet esse mutationis
translatio.

Vt rectam uictus rationem instituas, sa
lubria præcepta, quæ per bonam ualetu
dinem obseruanda sunt, perpendere o
portet.

Quibus consuetudo fuerit bis die cibū
assumere, ij nisi pransi fuerint, imbecilli,
ægrotiq; ac ignaui redduntur.

Vues ey =
ner ge =
uont hat,
das ist sein
speis.

Ventriculus cibos uel malos, & poti
ones facile sustinet. At idem tum cibos tum
portiones, quamuis suapte natura uicio
careant, grauiter fert, si præter consuetu
dinem ingerantur.

DE MODERANTIA
& temperamento seruando.

Non facietas, non fames, neq; aliud
quicquam, quod modum naturæ
excesserit. Hip. lib. 2. Aph. 4.

Somnus atq; uigilia, utraq; si modum
excesserit, malum, Eodem Aph. 3.

Eua

Euacuaciones quæ ad extremum deducunt periculosa. Et rursus, refectiones si extremæ fuerint, periculosa. Hip. lib. 1. Aph. 3.

Vbi cibus præter naturam plus ingestus est, hic morbum facit, ostendit auté sanatio. Lib. 2. Aph. 17.

Plurimū atq; repente euacuare uel replere, uel calefacere, uel refrigerare, siue quouis alio modo corpus mouere, periculosum. Quoniam omne nimis est natura inimicum. Sed quod paulatim fit, tutum est, tum aliàs, tum cum ab altero ad alterum transitus est. Vide Tit. de consuetudine. Item Tit. de circumstantijs obseruandis in medicando. Nota.

Somnus & uigilia utrinq; modum excedentia, morbus. Lib. 7. Aph. 68.

DE PERNITIE NIMIAE
repletionis, & ratione uictus sanorum.

Refectiones cum extremæ fuerint, periculosa. Hip. lib. 1. Aph. 3.

Vide titulo de aluo ducenda, Aphorismo; Habitus exercitatorum.

Se

T H E S E S T O T I V S

Senes facillime ieiunium ferunt. Se-
cundo loco qui ætatem consistentem ha-
bent, minus adulescentes, omnium mi-
nime pueri, præsertim qui inter ipsos sūt
uiuiores. Hip. lib. 1. Aph. 13.

Qui crescunt plurimum habent calidi
innati, plurimo igitur indigent alimen-
to, alioquin corpus assumitur. Senibus
uero, parum calidi innati est, paucis pro-
pterea fomitis egent, quia à multis ex-
tinguuntur. Eam ob causam febres seni-
bus, non similiter acutæ fiunt, frigidum
enim eorum corpus. Hip. lib. 1. Aph. 15.

Febres.

Ventres hyeme & uere natura calidif-
simi sunt, & somni lōgissimi. Quare per
ea tempora alimenta copiosiora sunt ex-
hibenda. Etenim tunc calor innatus plu-
rimus est, unde & pluribus ægent alimē-
tis, indicio sunt ætates & athletæ.

Impura corpora quanto plus nutries
tanto plus lædes. lib. 2. Aph. 10.

Facilius est impleri potu quàm cibus.

Lib. 2. Aph. 11.

Vbi cibus præter naturam plus inge-
stus est, hic morbum facit, ostēdit autem
sanatio. Lib. 2. Aph. 17.

Eorum quæ uniuersim & uelociter nu-
tri-

triant, ueloces quoq; fiunt excretiones.
Lib. 2. Aph. 18.

Vbi fames, laborandum non est. Lib.
2. Aph. 16.

Parum deterior potus, aut cibus, sua-
tior autem, melioribus quidem, sed mi-
nus suauibus est conferendus. Lib. 2. Aph.
38.

Ex multa potatione rigor & desipien-
tia, malum. Lib. 7. Aph. 7.

Corpora humida parum comedunt,
plurimum egerunt, difficulter curantur.
Dam.

Ieiunare in æstate corpus siccatur, colorẽ
citrinat, melancholiam parit, nec non &
uisum perturbat. Dam.

DE RATIONE VICTVS ægrorum.

Victus tenuis atq; exquisitus, in mor-
bis quidem longis semper, in acutis
vero, in quibus non conuenit, periculo-
sus. Et rursus, quæ ad extremum uenerit
tenuitas, grauis est. Nam & repletiones
quæ ad extremũ deueniunt, graues sunt.
Hip. lib. 1. Aph. 4.

In tenui uictu ægri delinquant, quo-
fit, ut magis lædantur. Hip. lib. 1. Aph. 5.
b Qui

*Ratio quia
natura à
tali uictu
debilitatur
& ad eam
transitus
est insue-
tus.*

THESES TOTIVS

Quicumq; enim error committitur ma-
gnus, maior in hoc fit, quã in paulo ple-
niori uictu, propterea etiam senis pericu-
losus existit.

Valde exquisitus uictus & cõstitutus,
quoniam errores grauius ferunt. Et ob
hoc igitur tenuis uictus, atq; admodum
exquisitus, eo qui sit paulo plenior ma-
gis periculosus.

Vbi morbus peracutus est, statim extre-
mos habet labores, & extreme tenuissi-
mo uictu utendum. Vbi uero nõ, sed ple-
norem uictum contingit adhibere, tan-
tum cibi indulgendum est, quanto mor-
bis extremis est melior. Hip. lib. 1. Aph. 7.

Quando morbus in suo uigore consti-
terit, tunc uictu tenuissimo utendum est.
Hip. lib. 1. Aph. 8.

Coniectari autem oportet, an æger cū
uictu sufficiat perdurare, donec morbus
consistat, & nunquid prius ille deficiat,
nec possit cum uictu perdurare, uel mor-
bus antea deficiat atq; hebetescat. Lib. 1.
Aph. 9.

Quibus igitur morbus statim consti-
stit, ijs statim tenuis uictus adhibendus
est, quibus uero posterius debet consistere

re, his & in ipso consistendi tempore, & parum ante illud cibus subtrahendus, prius uero uberius agendum, ut æger sufficiat. Lib. eodem. Aph. 10.

In accessionibus abstinere oportet, nã cibum dare nocuum est. Et quibus per circuitum fiunt accessiones, in ipsa accessione abstinere oportet. Eodẽ lib. Aph. 11.

Victus humidus febricitantibus omnibus confert, maxime uero pueris, & alijs qui tali uictu uti cõsueuerũt. Lib. 1. Aph. 16.

Et quibus semel, aut bis, & quidẽ plura ne an pauciora particulatim oporteat afferre, considerandum, condonandum autem aliquid tempori, ætati, consuetudini. Lib. 1. Aph. 17.

Aestati & autumno cibos difficillime ferunt, hyeme facillime. Secundum locũ uer habet. Lib. 1. Aph. 18.

His qui per circuitus accessionem habent, nihil dare oportet, neq; cogere, sed subtrahere, adiectione ante iudicationes. Lib. 1. Aph. 19.

Quæ longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet, quæ uero breui, breuiter. Lib. 2. Aph. 7.

Si à morbo cibum assumens quis, non

THESES TOTIVS

corroboratur, pluri alimento, corpus uti significatur. Quod si non affumente cibum hoc accidat, scire oportet, quod æget euacuatione. Lib. 2. Aph. 8.

Impura corpora, quanto plus nutries, tanto plus lædes. Lib. 2. Aph. 10.

Eius qui ex ægritudine bene cibatur, nihil proficere corpus, malū. Lib. 2. Aph. 31.

Omnes ferè qui male habent, circa initia bene cibati, nec quicquam proficientes, circa finem cibum rursus non appetunt, postea bene appetentes, ij melius euadunt Lib. 2. Aph. 32.

Lac dare caput dolentibus malū, malū uero & febricitantibus, & quibus illia suspensa murmurat, & siticulosus. Malū autē & quibus in febribus acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis multi facta eiectione est. Cōuenit autē & tabidis dare, quod nō ualde multū febricitat, & in febribus longis & paruis, si nullum ex supra dictis signis affuerit, & præter rationem consumptis. Lib. 5. Aph. 64.

In diuturno morbo fastidiuim cibi, & deiectiones syncerae, malū. Lib. 7. Aph. 6.

Præstat cum dieta potius curare, si possit fieri, quàm cum pharmacis Dam.

Con

Conualescentes secundum infirmitatem suam debent tractari, non tamen ex toto permittantur haberi, pro ut antea sani consueuerunt. Dam.

Ab infirmitate conualescentibus non est negandus cibus deterior, si hunc appetuerint, sed data quadam opera attemperandus ne noceat. Dam.

EX CORNELIO

Celso.

INitia morborum, primum famem, si trimque desyderant, ipsi deinde morbi, moderationem, ut neque aliud quam expedit, neque eius ipsius nimium sumatur.

Non conuenit iuxta inediam, protinus satietatem esse.

Si sanis corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit, quanto inutilius est in corpore etiam aegro?

Nulla res magis adiuuat laborantem, quam tempestiua abstinencia.

Scire igitur oportet, omnia legumina, quaeque ex frumentis panificia sunt, generis ualenticissimi esse.

Id ualenticissimum uoco, in quo plurimum alimenti est.

Item omne animal quadrupes domi-

T H E S E S T O T I V S

- Hæc infir-*
mis nequa
quã conue-
niunt.
Carnes be-
luarij.
- natum, omnem grandem feram, quales sunt: capræ, ceruus, aper, onager, omnẽ grandem auem, quales sunt: anser, & pãuo & grus. Omnes beluas maximas, ex quibus κῆτος est, quæq; his pares sunt. Itẽ mel & caseum. Quo minus mirum est, opus pistorium, ualẽtissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat.
- In media uero materia, numerari ex
- Quæ me =*
diocrẽ ali-
moniã præ-
stent.
Aues.
Pisces.
- oleribus debere ea, quorum radices uel bulbos assumimus. Ex quadrupedibus, leporem.
- Aues omnes à minimis ad phœnico-pterum, item pisces omnes, qui salem nõ patiuntur, solidiue saliantur.
- Olera.*
- Imbecillissimam uero materiam esse omne olus, & quicquid in cauliculo nascitur, qualis est cucurbita, & cucumis, & capparit. Omnia poma, oleas, & cochleas, itemq; conchilia.
- Plus alimenti est in carne, quàm in ul-
- Caro.*
Panis.
- lo alio.
- Firmius est triticum quàm milium, id ipsum quàm ordeum, & ex tritico firmissima siligo, simila deinde cui nihil ademptum est, quod αὐτόπυρον Græci uocant, infirmior est ex polline, infirmissimus ci-
- barius panis. Ex

Ex leguminibus uero ualentior faba, uel lenticula, quàm pisum.

Ex oleribus ualentior rapa, napiq; & omnes bulbi (in quibus cepam quoq; & allium numero) quàm pastinaca, uel que specialiter, radícula appellatur. Item firmior brassica, & beta, & porrum, q̄ lactuca uel cucurbita, uel asparagus.

At ex fructibus surculorum ualentiores uæ, ficus, nuges, palmulæ, quàm que poma proprie nominantur.

Atq; ex his ipsis firmiora quæ succosa, quàm quæ frigida sunt. Itemq; ex his uibus quæ in media specie sunt, ualentiora quæ pedibus, quàm quæ uolatu magis utuntur, & ex his quæ uolatu fidunt, firmiores sunt, quæ grandiores aues, quàm quæ minutæ sunt, ut ficedula & turdus. Atq; eæ quoq; quæ in aqua degunt, leuiorem cibum præstant, quàm quæ natandi scientiam non habent.

Inter domesticas uero quadrupedes leuissima suilla est, grauissima bubula.

Itemq; ex feris quo maius quodq; animal, eo robustior ex eo cibus est.

Pisciumq; eorum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utuntur, tamen

THESES TOTIVS

grauissimi sunt, ex quibus falsamenta quoque fieri possunt, qualis lacertus est, de inde qui quamuis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata coruus, scarus, oculata, tum plani, post quos etiam leuiores lupi, mullique, & post hos omnes saxatiles.

Neque uero in generibus rerum tantum modo discrimen est, sed etiam in ipsis, quod & ætate fit, & membro & solo, & cælo, & habitu.

Nam quadrupes animal omne si laetans est, minus alimenti præstat.

Item quo tenerior pullus cohortalis est.

In piscibus quoque media ætas, que nondum summam magnitudinem impleuit.

Deinde ex eodem suæ unguæ, rostrum, aures, cerebellum.

Ex agno, hedoue, cum petiolis, totum caput aliquanto; quam cætera membra leuiora sunt, adeo ut in media materia poni possint.

Ex auibus, colla, alæue recte infirmis annumerantur. Quod ad solum uero pertinet, frumentum quoque ualentius est collinum, quam campestre.

Leuis

Leuior piscis inter saxa æditus, q̄ in ha-
rena, leuior in arena quàm limo.

Quo fit ut ex stagno, uel lacu, uel flumi-
ne eadem genera grauiora sint, leuiorq̄
quæ in alto, quàm qui in uado uixit.

Omne etiam ferum animal, domesti-
co leuius, & quodcunq; humido cœlo,
q̄ quod sicco natum est.

Deinde eadem omnia pingua, quàm
macra, recentia, q̄ salsa, noua q̄ uetusta,
plus alimenti habent.

Tum res eadem magis alit iurulenta,
q̄ assa, magis assa q̄ frixa.

Ouum durum ualentissimæ materiæ
est, molle uel sorbibile imbecillissimæ.

Cumq; panificia omnia firmissima sint,
elota tamen quædam genera frumenti,
ut alica, oꝝuꝝ, & ptisana, uel ex iisdem facta
sorbitio, uel pulticula.

Et aqua quoq; madens panis, imbecil-
lissimis annumerari potest.

Ex potionibus uero, quæcunq; ex fru-
mentis factæ sunt, itemq; iac, mulsum, des-
frutum, passum uinum aut dulce, aut ue-
hemens, aut mustum, aut magnæ uetusta-
tis, ualentissimi generis est.

At acetum, & id uinum quod pauco-
rum

THESES TOTIVS

rum annorum, uel austerum, uel lene est, in media materia est. Ideoq̄ infirmis nūquam generis alterius dari debet.

Ceruisia.

Aqua omnium imbecillissima est, firmiorq̄ ex frumento potio est, quo firmius fuit ipsum frumentum, firmior ex eo uino, quod bono solo, quā quod tenui, quoq̄ réperato cœlo, q̄ quod aut nimis humido aut nimis secco, nimiumq̄ aut frigido, aut calido natum est.

Mulsum.

Mulsum quo plus mellis habet, defrutum, quo magis incoctum, passum quo ex sicciore uua est, eo ualentius est.

Aqua.

Aqua lenissima pluuialis est, deinde fontana, cum ex flumine, tum ex puteo, post hæc ex niue, aut glacie, grauior his ex lacu, grauissima ex palude. Facilis etiam & necessaria cognitio est naturā eius requirerentibus. Nam leuis, pondere adparer, & ex his quæ pondere pares sunt, eo melior quoq̄ est, quo celerius & calefit et frigescit, quoq̄ celerius ex ea legumina percoquantur. Fere uero sequitur, ut quo ualērior quæq̄ materia est, eo minus facile cōcoquatur, sed si cōcocta est, plus alar.

Itaq̄ utendum est materiæ genere prouiribus, modusq̄ omnibus pro genere sumendus.

Et

Ergo imbecillis hominibus, rebus in-
firmisissimis opus est.

Mediocriter firmos media materia, o-
ptime sustinet, & robustis apta, ualidissi-
ma est.

Plus deinde aliquis assumere ex leui-
oribus potest, magis in his quæ ualentissi-
ma sunt, temperare sibi debet.

B X H I P P O C R A T I S

libro primo de ratione ui-
ctus in morbis acutis.

IN morbis acutis, pituita rectissime ca-
teris quæ ex frugibus constant pulmen-
tarijs antefertur.

Nam uiscositas eius lenis, continua, in-
cunda, lubrica, & modice laxa est, sitim
arctet, & ubi ablutione est opus, facile de-
scendit, non adstringit, non uellicat gra-
uiter, neq; in uentre tumescit, quippe dū
decoqueretur, tumuit, quātum maxime
intumescere oportuit.

Verant pituitam ministrare uentē inci-
sio, medicamentum, & clyster.

Similiter in aridissimis morbis, haud
ita multum dare conuenit, sed ante sorbi-
tionem, aut aquam mulsam, aut uinum,
utrum magis profuturum existimaueris.

Pit-

T H E S E S T O T I V S

Ptisanam ex hordeo q̄ optimo facere,
& eam probe concoquere oportet, alio
qui nisi exquisitè præparetur, noxia sæpe
fit.

Non dabis ptisanam his, quibus cibus
adhuc recens conclusus est, quibus laterū
dolor continuus est, atq; calidis fomen-
tis non lauantur, neq; procedit sputum,
sed lentum & incoctum est.

D E F A M E.

Vbi fames, laborandum non est Lib.
2. Aph. 10.

Famem thorexis, id est, uini potio sol-
uit. Lib. 2. Aph. 21.

Corporibus carnes habentibus humi-
das, famem adhibere conuenit, fames e-
nim corpora siccat. Lib. 7. Aph. 50.

E X C E L S O L I B R O

2. cap. 15.

Abstinentiæ duo sunt genera, alterū,
ubi nihil assumit æger: alterum, ubi
non nisi quod oportet.

Initia morborum primum famem, si-
timq; desyderant, ipsi deinde morbi mo-
derationē, ut neq; aliud quàm expedit,
neq; eius ipsius nimium sumatur.

• Neq; enim conuenit iuxta inediā pro-
tinus satietatem esse.

Quod si sanis quoq; corporibus inutilis est, ubi aliqua necessitas famem fecit, quanto inutilius est in corpore etiam ægro?

Neq; ulla res magis adiuuat laborantem, q̄ tempestiua abstinencia.

DE VINO.

Dulce uinum non adeo ut uinosum capiti grauitatem adfert, & minus tentat mentem, nec ullum aliud tam facile per intestina descendit, sed iecur & lienem in tumorem attollit. Et ne his quidem utile est, in quibus amara bilis exuperat. Nam sitim infert, & superiorem intestinorum partem inflat. Hip. lib. 3. de ratione uictus in morbis acutis.

Dulce uinum albo minus urinam cit, sed nullū aliud efficacius promouet sputum, nisi cum sitim induxerit, tum enim minus euocat sputum. Idem.

Vinum album, uinosum, omni alio facilius ad uesicam transit, urinam cit, magnumq; semper auxilium in acutis morbis afferre solet.

Fuluum uinum, & nigrum austerum, capitis grauitatem inducit, mētem attingit, & urinæ atq; sputi exitum impedit.

Aui

T H E S E S T O T I V S

Auino albo & reliquis id genus, tum maxime abstinendum est, cum alui excrementa, & mollia & ramentosa fuerint.

D E A Q V A M V L S A.

Aqua mulsa per totum morbi acuti decursum epota, his qui amara bile abundant, & quibus tumida sunt uiscera, minus conuenit, quasi sitim ut uinum dulce excitat non adeo. Hip lib. 3. de ratione uictus in morbis acutis.

Aqua mulsa pulmonem imprimis lenit, sputum mediocriter educit, & propter abstergendi facultatem, tussientibus quoque utile est.

Præterea urinam efficaciter cit, nisi uiscosum aliquid obstiterit, alui, bili, & alia excrementa educit.

Aqua mulsa quo fuerit dulcior, eo efficacitorem sputi uim obtinet, atque pulmonem reddit leniorem.

Mulsa aqua quæ minus diluta fuerit, alui spumosa excrementa, & supra modum biliosa, & calidiora magis quam dilucior ducit.

Aqua mulsa à prætisanæ sorbitione epota, uehementer replet & inflat, uisceraque in præcordijs lædit.

DE MELLE ET QVI
bus conuenit.

Coctum mel aspicientibus quidē lon-
ge præstantius crudo uidetur. Est e-
nim splendidum tenue, cādīdum & per-
spicuum, sed quibus ab eo iuribus diffe-
rat, equidem non intelligo. Hip. lib. 3. de
ratione uictus in morbis acutis.

Aliquando tamen coctio melle uten-
dum, maxime si uiciosum, impurum, ni-
grum, & haud quāq; iucundi odoris mel
fuerit, siquidem plurima eiusmodi uicia
coctio tollit.

DE OXIMELLE.

Pocio oximellis plurimum cōuenit,
si in tempore detur, & his quibus nō
repugnat. Hip. lib. 3. de ratione uictus in
morbis acutis.

Qui pernicioso morbo laborant, qui
non tussunt, neq; ea quæ intus sunt, ni-
mis oximel dandum non est, materiam
enim magis uiscosam reddit.

Cum dare decreueris, perquā tepi-
dum sit, studendum est, at neq; affatim,
sed paulatim exhibendum est.

Oximel quod non adeo fuerit acidū,
& fauces humectat, sputum euocat, sicim
com-

THESES TOTIVS

compescit, præcordijs, uisceribus, cæcæ
 et quicquid genus partibus amicum est. Ete-
 nim mellis noxas reprimat, nempe eius
 biliosa, flatu discutit, urinam ciet, sed in-
 testini partem imam laxat, & ramenta e-
 licit.

Atqui in acutis morbis inutiliter non
 nunquam exhibetur, præcipue uero, quia non
 solum flatum cohibet, uerum rursus ipsū
 reuerti cogit, uires frangit, & morborum
 extremas partes infrigidat.

Huius quidem potionis paululum no-
 ctu acieiuno, ante uidelicet sorbitionem
 recte propinatur, quanquam nihil prohi-
 bet ipsam a sorbitione quoque bibere, mo-
 do longum interueniat spacium.

Porro qui in uictus ratione sola potio-
 ne, posthabitis sorbitionibus utuntur, ijs
 ipsis non semper exhibere conuenit, uel
 ob hanc maxime causam, quod intesti-
 na abrodit, & exasperat, utpote tum ni-
 hil stercoreum continentia.

Quod si per uniuersum morbi decur-
 sum ab hac potione, eaque multa præsidium
 aliquod expectaueris, paulum aceti in-
 funde, tantum uidelicet, ut gustanti dum-
 taxat sensum moueat, sic enim citra nox-
 am

am debita auxilia præstabit.

DE ACETO.

ACuta uis aceti his magis qui amara,
 & quibus atra bilis exuperat, cõferre
 solet.

Quippe amara ab ipso dissoluuntur,
 & agitantur, ac in pituitam degenerant.
 Atra uero bilis in massam attollitur &
 multiplicatur, nam acerum atram bilem
 parit.

Mulieribus longe magis quã uiris aduer-
 satur acerum, utpote quod uterum dolo-
 re cruciat. Hip. lib. 3. de ratione uictus in
 morbis acutis.

DE AQUA.

Aqua in morbis acutis potui datur,
 nec aliud præsidium ab eo petendũ
 ceseo. Hip. lib. 3. de ratione uictus in mor-
 bis acutis.

Non est alia potio quę minus sputum
 producat, si quis crebro eam biberit.

Aqua bilem parit in his qui suapte na-
 tura biliosi sunt.

Præcordijsquẽ infesta est aqua, ubi ua-
 cuo uentriculo ingeritur, utquẽ longe pessi-
 ma & biliosa redditur, ita uires maxime
 prosternit.

THESES TOTIVS

Incommoda aquæ hæc potissimum sunt, lienem & iecur attollit, fluctuat, sæpernatat, tarde transmittitur, utpote frigida, & coctu difficilis, non dicit aluum, non ciet urinam, atq; ex eo quoq; uiciosa est, quod stercoreum suapte natura expers est.

Qui aquã refrigeratis pedibus aliquando biberit, ex propositis noxis omnibus, illa multo grauius ipsum afficiet, ad quã fuerit procliuior.

In quibus morbis timueris, ne uel caput uehementer grauetur, uel mens tentetur. Tum uel aquam uel uinum aquosum, & album, & haudquaquẽ odorũ exhibere oportet. Deinde paulum aquę superbibere.

DE TEMPORVM MV- tationibus.

MVtationes temporum potissimum pariunt morbos, & in quibusdam temporibus magnæ mutationes, aut frigoris, aut caloris, & alia pro ratione eodem modo. Hip. lib. 3. Aph. 1.

Naturarum hæc quidem ad hyemem, hæc uero ad æstatem bene malẽue habet. Lib. 3. Aph. 2.

Morbi

Morbi quoque alij ad alia bene uel male se habent, & quædam ætates ad tempora & loca, & uictus genera. Lib. 3. Aph. tertio.

In temporibus, quando eodẽ die modo calor, modo frigus fit, aut ñales morbos expectare oportet. Lib. 3. Aph. 4.

Austri admodum hebetantes, caliginosi, caput grauantes, pigri, dissoluentes, quando huiusmodi tempestas præualuerit, talia in morbis patiuntur. At si aquilonia fuerint, tusses, fauces, alui duræ, difficultates urinæ, horrores, costarum dolores, & pectoris, quum hæc tempestas præualuerit, talia in morbis expectare oportet. Lib. 3. Aph. 5.

Quando æstas fit ueri similis, sudores in febribus multos expectare oportet. li. 3. Aph. 6.

In siccitatibus febres acutæ fiunt, & si annus magna ex parte talis fuerit, qualẽ fecerit constitutionem, tales plurimum morbos oportet expectare. Lib. 3. Aph. 7.

In constantibus temporibus, cum tempestiue tempestiua redduntur, morbi constantes & boni iudicij fiunt. In inconstantibus, inconstantes, & mali iudicij. Lib. 3. Aph. 8.

THESES TOTIVS

Autumno morbi acutissimi atq; exitiales, maxima ex parte. Ver uero saluberrimum & minime exitiale. Lib. 3. Aph. 9.

Autumnus calidus, malus. Lib. 3.

De temporibus si quidem hyems sicca, & aquilonia fuerit. Ver uero pluuiosum, & australe. Necessè est æstate febres acutas & lippitudines, Græci ophthalmias uocant, & intestinorum difficultates. præcipue uero mulieribus, & uiris qui natura sunt humidiores. Lib. 3. Aph. 11.

Si uero hyems australis, & pluuiosa & serena fuerit, uer autem siccum & aquilonium, mulieres quibus partus ad uer inest, ex quacunq; occasione abortiunt. Quæ uero pariunt, imbecillos & morbidos infantes pariunt, quare uel statim intereunt, uel tenues, uel ualitudinarij uiuunt. Cæteris uero difficultates intestinorum lippitudines sicca fiunt. Senioribus uero distillationes, quæ cito interiment. Lib. 3. Aph. 12.

Si uero æstas sicca fuerit & aquilonia, autûnus uero pluuiosus & australis. Dolores capitis ad hiemem fiunt, & tusses et raucedines, atq; grauedines. Quibusdam autem & tabes. Lib. 3. Aph. 13.

Si

Si uero aquilonius & siccus, qui natura
 ram habent humidiores, & mulieribus
 conferet. Reliquis autem erunt lippitudi-
 nes siccae, & febres acutae, & grauedines
 nonnullis, nonnullis uero & atrae biles.

Lib. 3. Aph. 14.

Ex anni autem constitutionibus quod
 in totum dixeram, siccitates imbribus sunt
 subtiliores & minus mortiferae. Libro 3.

Aph. 15.

Morbi in plurimorum multitudine,
 magna ex parte fiunt febres longae, alui
 profluvia, putredines, morbi comitia-
 les & attoniti, quos apoplexias Graeci uo-
 cant, & anginae. In siccitatibus autem, ta-
 bitudines, lippitudines, articulorum do-
 lores, stillicidia urinae, & difficultates in-
 testinorum. Lib. 3. Aph. 16.

Quotidianae autem constitutiones, a-
 quiloniae quidem corpora densant, con-
 tundunt, & bene mobilia, coloratiora &
 melius audientia faciunt, & aluos exsiccat,
 oculos mordent, & si pectus dolor ali-
 quis obsederit, dolorem augent. Austri-
 nae corpora dissolunt & humectant, au-
 ditum obtundunt, & corpora aggrauiant,
 & uertigines faciunt, oculis atque corpori

T H E S E S T O T I V S

bus difficilem motum præbent, & alios humectant. Per tempora anni, uere quidem & præterita ætate pueri, & qui hos sequuntur ætate optime degunt, & sani sunt maxime. Aestate uero & autumno usque ad aliquid senes. Reliquum, & hyeme qui mediam ætatē habent. Lib. 3. Aph. 18.

Morbi omnes quidem in omnibus temporibus fiunt, quidam uero magis in quibusdam ipsorum, & fiunt & excitantur. Lib. 3. Aph. 19.

D E V E R E.

Morbi Veris.

Vere etenim furores, & atræ biles & morbi comitiales, & profluvia sanguinis, & angina, & grauedines, & rancidines, & lepræ, & tusses, & impetiginæ, & vitiligines, & pustulæ ulcerosæ plurimæ, & tubercula, & articulorum dolores. Li. 3. Aph. 20.

D E M O R B I S A E S T A T I S.

Aestate autem nonnulli horum & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ febres & quartanæ, & uomitus, & alui profluvia, & lippitudines oculorum, & aurium dolores, & ulcera oris, genitaliū putredines, & sudamina. Li. 3. Aph. 21.

De

DE AUTUMNO.

Autumno uero plurimi uel æstiuu morbi fiunt, & febres quartanæ, & erraticæ & lienes, aquæ inter cutem, & tabes, & stillicidia urinæ, & difficultates intestinalium, & coxendicum dolores, & angina, & anhelationes (quas Græci asthma ta uocant) ilei, & morbi comitiales, furor, atræbiles.

DE HYEME.

Hyme uero morbi laterales, & pulmonis inflammationes, grauedines atq; rauedines, tusses, dolores pectoris, & laterum atq; lumborum, capitis dolores, uertigines & apoplexiæ. Lib. 3. Aph. 23.

In ætatibus autem talia contingunt pueris, & nuper natis puerulis, oris ulcera (quæ aphthæ uocantur) uomitus, tussis, uigiliæ, pauores, umbilici inflammationes, aurium humiditates. Lib. 3. Aph. 24.

In progressu uero, cum iam dētre incipiunt, gingiuorum prurigines, febres, conuulsiones, alui profluvia, & maxime cum caninos ædunt denies, & his præsertim pueris, qui crassissimi sunt, & aluos duras habent. Lib. 3. Aph. 25.

Cum uero iam magis adoleuerunt, tō
c 4 sillæ

T H E S E S T O T I V S

fillæ, & uertebrae quæ in occipitio ad interiora laxationes, crebri anhelitus (quos Græci Asthmata uocant) calculi lumbrici rotundi, uerrucæ, quas Græci achrochorthinas uocant, satyriæ, strumæ, & alia tubercula, sed præcipue ante dicta. Li. 2. Aph. 26.

Puberum morbi.

Grandioribus autem & iam accedentibus ad pubertatem, plurimi ex his & febres diurnæ magis, & ex naribus profluvia sanguinis. Lib. 2. Aph. 27.

Plurimæ autem passiones puerulis indicantur. Nonnullæ quidem in 40. diebus, nonnullæ in septem mensibus, quædam uero iam ad pubem accedentibus, quæ uero permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis aut sceminis cum menstrua erumpunt, consenescere consueuerunt. Lib. 3. Aph. 28.

Adolescentibus autem sanguinis sputiones, tales febres acutæ, morbus comitialis & alij, sed præcipue ante dicti. Lib. 3. Aph. 29.

Vltra hanc ætatem Asthma, id est, crebri anhelitus, morbi laterales, pulmonis inflammationes, lathargi, phrenetides, ardores, diurna profluvia, cholera,

ræ, difficultates intestinorum, leuitates
intestinorum, hæmorrhoides. Libro ter-
tio Aph. 30.

Senibus spirandi difficultates, distilla-
tiones cū tuffe, urine stillicidia, urinæ dif-
ficultates, articulorum dolores, renū pas-
siones, uerrigines, apoplexiæ, mali habi-
tus, pruritus totius corporis, uigiliæ, alui,
oculorū & aurium humiditates, uisus ob-
tusus, glaucedines, auditus graues.

In omni regione uentri qui cogunt nu-
bes, gignunt in hominibus, rheumatif-
mos & sensus aggrauant. Dam.

EX CORNELII CEL-

si Libro 2, cap. 2.

Saluberrimum uer est, proxima de in-
de ab hoc hyems, periculosior æstas,
autumnus longe periculosissimus.

Ex tempestatibus uero, optimæ aqua-
les sunt, siue frigida, siue calida, passiuæ,
quæ uariant maxime. Quo fit ut autum-
nus plurimos opprimat.

SORANVS DE VERE.

Ver incipit ab 8. Idus Februarij, & du-
rat usq; in 8. Idus Maij. Hoc tempo-
re crescit sanguis, & febres, & humores
dulces. Oportet uti rebus frigidis, ama-
c 5 ris,

T H E S E S T O T I V S

ris, & siccis, & quæ uentrem soluant, minimum ieiunare, assiduo laborare, tepidum bibere oportet.

S O R A N V S D E A E S T A
te.

Aestas incipit ab 8. Idus Maij, & durat in 8. Idus Augusti, hoc tempore nutriuntur, cholera rubea, quæ facit febres acutas, caufonem, synochum terrianam. Utendum ergo rebus frigidis, nimis dulcibus, & bene olentibus, quæ facile digestionem admittunt. Frigidum bibere & aquosum oportet, raro coire, minimum ieiunare.

D E A U T V M N O S O R A.

Autumus incipit ab 8. Idus Augusti, usq; in 8. Idus Nouembris, Hoc tempore nutritur cholera melina, ex qua nascitur pituita stomachi. Typicas facit febres & acutas, nigrum fel augetur, uenis crassitudo consequitur. Oportet uentrem purgare, & detrahare humores, & rebus uti relaxatorijs, sæpe uomitum prouocare, minime ieiunare, à Venere quoq; & frigida abstinere.

D E H Y E M E S O R A

nus.

Hy

Hyems incipit ab 8. Idus Nouembris,
 & durat usq; in 8. Idus Februarij.
 Hoc tempore phlegma crescit, proueni-
 unt catarri, distillationes, uuae, tumores,
 tussis, punctio laterum. Utendum igitur
 calidis & plenioribus cibus, synapi, apio,
 & pipere, agrimonia plurima. Exercita-
 tio corporis, meracum bibere, raro luan-
 te, caput sine intermissione purgare, Ve-
 neri non parcas.

DE PVERITIA ET IUV-
 enture.

Magnitudo corporis, iuuentæ quidē
 neq; indecens neq; illiberalis. Sene-
 ctæ uero inutilis, & deterior paruitate.

Hip lib. 2. Aph. 54.

Quicumq; iuuenes morbo comiciali la-
 borant, mutatione maximæ ætatis, & tē-
 porum, & locorum, & uictuum quoq; li-
 berantur.

Per tempora anni, uere quidē & pru-
 ma, æstate pueri, & qui hos sequuntur æ-
 tate, optime senes, & sani sunt maxime,
 æstate uero & autumno usq; ad aliquid
 senes, reliquum & hyeme, qui mediam
 ætatem habent. Lib. 3. Aph. 18.

In ætatibus talia contingunt paruis &

THESES TOTIVS

nuper natis puerulis, oris ulcera (quæ aphthæ uocantur) uomitus, tusses, uigilie, paures, umbilici inflammationes, auriû humiditates. Lib. 3. Aph. 24.

In progressu uero, cum iam dentire incipiunt, gingiuarum prurigines, febres, conuulsiones, alui profluvia, & maxime cum caninos ædunt dentes. Et his præsertim pueris qui crassissimi sunt, & aluos duras habent. Lib. 5. Aph. 25.

Cum uero iam magis adoleuerunt, tōsillæ & uertebrae, quæ in occipitio ad interiora laxationes, crebri anhelitus, Græci asthmata uocant. Calculi lumbrici, rotundi ascarides, uetrucæ (quas Græci acrochordonas uocant) satyriæ strumæ, & alia tubercula, sed præcipue antedicta. Li. 3. Aph. 26.

Grandioribus autem & iam accedentibus ad pubertatem, plurima ex his, & febres, diurnæ magis, et ex naribus profluvia sanguinis, Lib. 3. Aph. 27.

Plurimæ autem ægritudines pueriles iudicantur, nonnullæ quidem in 40. diebus, nonnullæ in septem mensibus, nonnullæ uero in annis septem, quedam uero iam ad pubem accedentibus. Quæ uero

ro permanserunt, nec in pubertate finie-
runt puerulis, aut foeminis cum mēstrua
erumpunt, consenescere consueuerunt.

Lib. 3. Aph. 28.

Adolescentibus autem sanguinis spu-
siones, tabes, febres acutæ, morbus comi-
tialis, & alij, sed præcipue ante dicti. Lib.
3. Aph. 79.

Vltra hanc ætatem, asthma, id est, cre-
ber anhelitus, morbus lateralis, pulmo-
nis inflammationes, lethargi, phreneti-
des, ardores, diuturna profluvia, difficul-
tates intestinorum, leuitates intestinorū,
hæmorrhoides. Lib. 3. Aph. 30.

Pueris calida lauatio, longo tempore
apta est. Vinū dilucius, neq̄ omnino fri-
gidum. Hoc autem exhibendum, quod
uētem minime attollit, perturbatq̄, atq̄
inflationes facit. Quæ omnia conducūt,
ne conuulsionibus conflictentur, sed ma-
iores coloratioresq̄ fiant. Polybus de ra-
tione uictus puerorum.

D E C R A S S I T I E E T

pinguedine.

Qui natura admodum crassi sunt, citi-
us intereunt, quàm qui graciles.

Hip. lib. 2. Aph. 44.

Ob=

THESES TOTIVS

Obæsi qui graciles fieri cupiunt, labores uniuersos ieiuni subibunt, & suspirantes adhuc, id est, necdum refrigerati cibum assument, uino prius temperato & non perfrigido usi, obsonia se fanis uel dulciarijs, alijsq; id genus conficiatur, atq; hæc copiosa, sic enim uel paucissimis saturantur.

DE MACILENTIA.

Qui natura admodum crassi sunt, citius intereunt, quam qui graciles.
Lib. 3. Aph. 44.

Qui tenues se implere uolunt, præter quæ plenis contraria facient, nullum ieiuni laborem subibunt. Pol. lib. de ratione uictus puerorum.

DE SENECTUTE ET eius incommodis.

Senes iuuenibus plurimum ægrotant minus, qui uero morbi ipsis accidunt longi, maxima ex parte comitantur ad mortem. Hip. lib. 2. Aph. 37.

Raucedines & grauedines in ualde senibus coctionem non admittunt. Lib. 2. Aph. 40.

Quicumq; aluos humidus habet, si quidem iuuenes fuerint, melius commutat
ijs

ijs qui siccas habet. Ad senectam uero dete-
rius commutant, nam senescentibus ma-
gna ex parte exiccant. Lib. 2. Aph. 53.

Magnitudo corporis iuuentæ quidē
neq; indecens, neq; illiberalis, senectæ ue-
ro inutilis, & deterior paruitate. Libro. 2.
Aph. 54.

Senibus spirandi difficultates, distilla-
tiones cum tuffe, urinæ stillicidia, urinæ
difficultates, articulorum dolores, renū
passiones, uerrigines, apoplexiæ, mali ha-
litus, pruritus totius corporis, uigiliæ, al-
ui, oculorum & narium humiditates, uis-
us obtusus, glaucedines, auditus graues.
Lib. 3. Aph. 31.

DE SVBITA MUTATI one uitanda.

OMnis subita mutatio, si modum ex-
cesserit, noxam inducit.

Maximè in nobis mutationes, tum na-
turæ, tum halitus, potissimum morbos
pariunt.

Quapropter neq; uenas importune ex-
inanite, neq; uigētibus seruētibusq; mor-
bis aliquid ingerere, neq; etiam per totū
morbi decursum, uel ad hoc uel ad illud
quicq; permutare conuenit. Hip. lib. 2. de
morbis acutis. De

T H E S E S T O T I V S

D E S I T I .

Qui noctu bibere appetunt, his admodum sitientibus, si super dormierint, bonum. Lib. 5. Aph. 27.

D E Q V A T V O R H V M O R I B U S .

Phlegma in capite, sanguis in pectore, cholera rubea in Venere, cholera nigra in vesica, dominantur. Soranus.

Crescit autem sanguis in uere, cholera rubea in æstate, nigra in autumnno, phlegma in hyeme.

Sanguis calidus & humidus est & dulcis. De his plura in suis titulis.

Sanguis dominañt ab hora noctis usq; in horam diei tertiam.

Cholera rubea amara, & uiridis & sicca est, dominaturq; ab hora diei tertia, usq; in horam nonam diei.

Cholera nigra, acida & sicca & frigida est, dominaturq; ab hora diei nona, usq; in horam tertiam noctis.

Phlegma frigidum & humidum est, dominatur ab hora noctis tertia, usq; ad horam noctis nonam.

Sanguis per nares, cholera rubea per aures, cholera nigra per oculos, phlegma

ma per os & aures purgantur.

Phlegma cum parte sanguinis in pueris dominatur, ab anno 14.

Cholera rubea dominatur ab anno 14 usq; ad annum 35. deinde à 34 uel 35. maxima pars sanguinis dominatur cū cholera nigra usq; ad summam ætatem.

Sanguis facit pueros moderatos, blandos & formosos.

Cholera rubea facit iracundos, acutos, ingeniosos, leues, macilentos, uoraces.

Phlegma facit corpora composita, uigilantes, & intra se cogitantes, canos cito producentes.

Cholera nigra facit subdolos, auaros, perfidos, tristes, somniculosos, timidos, inuidiosos.

Hyeme crescit in homine pituita, q; ipsa præcipue ex omnibus quæ in corpore sunt, natura sua eo tempore frigidissima est. Hip. de natura humana.

Vere, pituita in corpore uiolentissima est. Sed sanguis crescit, suscipitq; indies maius incrementum. Idem.

Æstate sanguis quidem adhuc uiget, sed bilis effertur, accrescitq; & in autumnum pertinet. Idem.

d. In

THESES TOTIVS

In autumno sanguinis parum est, quia illius naturæ id temporis contrarium est. Idem.

Pituita æstiuo tempore infirmissima est, quia id tempus propter calores & sic citates ei aduersatur. Idem.

In anno modo hyems, modo uer, modo æstas, modo autumnus uiget, haud aliter in homine, interdum pituita domi-
natur, interdum sanguis, interdum bilis, tum flaua tum atra.

DE SANGVINE.

*Consule ti-
tulum de
4. humori-
bus.*

Quibus sanguis niger de subtus exierit, postridie moriuntur. Hip. lib. 4. Aph. 23.

Sanguis quidem supra qualiscunq; factus erit, malus, infra autem bonus est. Lib. 4. Aph. 25.

Quibus in febribus sanguinis exierit multitudo, quacunq; ex parte, alui his humoribus mectantur. Lib. 4. Aph. 27.

Quibus speratur abscessum futurum ad articulos, si sanguis ex naribus fluxerit, breui admodum solutio fit. Lib. 4. Aph. 74.

Si sanguinem aut pus minxerit quispiam, aut renem aut uesicæ exulceratione significat. Lib. 4. Aph. 75.

Qui

Quicumq; sponte sanguinem mingūt,
his à renibus uenulam ruptam significa-
tur. Lib. 4. Aph. 78.

Si sanguinem mingunt, aut grumos,
uel stillicidium urinæ habeant, & dolor
in anum incidat uentrem, & pectinem,
& semen, circa uesicam labor est. Lib. 4.
Aph. 80.

Vbi sanguis plurimus fluxerit, singul-
tus aut conuulsio superueniens malum.
Lib. 5. Aph. 3.

Si sanguinem aut pus minxerit, aut
squammulas, & grauis odor adfit, uesicæ
exulcerationem significat.

Mulier utero gerens sanguinem, misso
ex uena, abortit, & magis si fœtus sit ma-
ior.

Mulieri sanguinem euolenti, men-
struis erumpentibus solutio.

Menstruis deficientibus sanguis ex na-
ribus fluens, bonum.

Quibuscūq; mulieribus ad mammas
sanguis colligitur, furorem significat.

De sanguine plura, uide titulo de men-
struis.

Si in uentrem sanguis præter naturam
effunditur, necesse est suppurari.

T H E S E S T O T I V S

A sanguinis uomitu tabes, & puris purgatio supra.

Si quis sanguinē minxerit & grumos, & stillicidio urinæ laborat, & dolor incidit in femur & imum ventrem, pectus menq; qui circa uesicam male se habere significatur.

V E N A E S E C T I O V E L
sanguinis missio.

Quibuscunq; uenæ sectio uel purgatio cum medicamento conuenit, hos uere purgare uel uenam incidere oportet.

Difficultatem urinæ uena secta iuuat, secare uero interiores. Lib. 6. Aph. 36.

A sanguinis sputo, puris sputum. Lib. 7. Aph. 15.

Quibus in uenis sanguinem mittere confert, his uere uenam oportet secare. Lib. 7. Aph. 54.

Quicumq; euomunt sanguinem, si sine febre, quidem salutare, si uero cum febre, malum. Curare uero acerbis & refrigerantibus. Lib. 7. Aph. 37.

Quibus à uenis sanguinem mittere confert, his uere uenam oportet secare. Lib. 7. Aph. 54.

Quis

Quibus intra uentriculum & septum pituita reposita est, & dolorē adfert, non habens exitum, neq; ad alterum uentrē, his per uenas ad uesicam, pituita uersa, soluitur morbus. Lib. 7. Aph. 55.

Iugulatis sanguis fluit, primo quidem feruentissimus atq; plus quā rubidus, mox magis pituitosus, magisq; biliosus. Hip. de natura humana.

DE ATRA BILE.

MOrbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis, uel supra uel infra exierit, letale. Hip. lib. 4. Aph. 22.

Quibuscunq; ex morbis acutis aut diuturnis, uel ex uulneribus, siue quouis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue utri sanguis niger de subter exierit, postridie moriuntur. Lib. 4. Aph. 23.

Difficultas intestinorum si ab atra bile incœperit, letalis est. Lib. 4. Aph. 24.

Atra bile uexatis, & renam passionibus hemorroides superuenientes, bonū. Lib. 5. Aph. 11.

Si timor atq; mœstitia longo tempore habentes, perseverent, ex eo atra bilis significatur. Lib. 6. Aph. 56.

In morbis melancholicis, ad hæc perid
d 3 culo

T H E S E S T O T I V S

culosi decubitus, stuporem corporis, uel
conuulsionem, uel furorem uel cæcitatē
significant. Lib. 6. Aph. 56.

Si lingua repente incontinens fiat, aut
aliqua pars corporis stupore elanguit, ta-
le est melancholicum. Lib. 7. Aph. 40.

Si timor atq; mœstitia longo tempore
hominem habentes perseuerauerunt, ta-
le est melancholicum. Lib. 7. Aph. 41.

Melancholici iuuenes ne purgētur for-
titer, faciliter enim hæret, & est paucissi-
ma. Dam.

D E P H L E G M A T E.

Qui alba pituita detinetur, si fortis
fluxus uentris superuenerit, à mor-
bo liberatur.

A pituita alba, aqua inter cutem super-
uenit. Lib. 7. Aph. 71.

Quibus inter uentriculum & septum
pituita reposita est, & dolorem affert, nō
habens exitum, neq; ad alterum uentrē,
his per uenas ad uesicam, pituita uersa,
soluitur morbus.

D E T I M O R E E T T R I sticia.

Si timor atq; mœstitia longo tempore
habentes, perseuerent, ex eo atra bilis
signis

significatur Lib. 6. Aph. 23.

Si timor & mœstitia longo tempore hominem habentes, perseverent, tale est melancholicum. Lib. 7. Aph. 41.

DE RATIONE MORBORUM, & morbis curandis in generali.

EXtremis morbis extrema exquisite remedia optima sunt. Hip. li. 1. Aph. 6.

De uictu exhibendo in morbis. Vide titulum, de ratione uictus ægrorum.

Item de febribus curandis uide suo titulo.

De morborum indicationibus uide infra sub titulo, de morborum iudicationibus.

Quæ relinquuntur in morbis, recidivas facere consueverunt. Lib. 2. Aph. 12.

Quicumq; morbi ex repletionem fiunt, curat euacuatio, & qui ex euacuatione, repletio, & aliorum contrarietas. Lib. 2. Aph. 22.

His qui nō ex ratione lenius se habēt, non oportet fidere, neq; multum formidare. Mala quæ præter rationem eueniunt, plurima enim talia stabilia nō sunt,

T H E S E S T O T I V S

neq; multum durare & permanere con-
sueuere. Lib. 2. Aph. 27.

Febricitantium non omnino leuiter
permanere corpus, & nihil minui, uel eri-
am plus q̄ ratio postulat contabescere,
malum, hoc enim morbi lōgitudinem,
hoc uero imbecillitatem significat. Lib. 2,
Aph. 28.

Cum morbi inchoant, si quid uideretur
mouendum, moue. Cum uero consistūt
ac uigent, melius est quietem habere. Lib.
2. Aph. 29.

Circa initia & fines omnia imbecillio-
ra, cum uero consistunt, firmiora. Eodem
Aph. 30. In quouis morbo mēte consta-
re & bene se habere, ad illa quæ offerun-
tur, bonum. Contra uero se habere, ma-
lum. Aph. 3. eodem lib.

In morbis minus periclitantur, quorū
naturæ & ætati, aut habitui, aut tempori
magis congruit morbus, quàm quibus
secundum nihil istorum congruit. Aph.
34. lib. eodem,

In quouis morbo partes ad umbilicū
& inum uentrem attinentes, crassitudi-
nem habere melius est. Multum uero ex-
tenuari ac contabescere, prauum est. Et
hoc

hoc quoq; ad inferiores purgationes, per
 iculosum. Aph. 35. Eodem.

Seniores iuuenibus plurimum aegro-
 tant minus. Qui uero ipsis accidunt lon-
 gi, maxima ex parte comitantur ad mor-
 tem. Lib. 2. Aph. 39.

Rauedines & grauedines in ualde se-
 nibus, coctionem non admittunt. Lib. 2.
 Aph. 40.

Strangulati atq; dissoluti nondū mor-
 tui, non referuntur. Lib. 2. Aph. 43.

Qui natura admodum crassi sunt, citi-
 us intereunt, q̄ qui graciles. Lib. 2. Aph.
 44.

De morbo comitiali uide infra, titulo
 eius nominis.

Qui morbi, quibus potissimum tem-
 poribus grassentur, & de eorum occasio-
 nibus uide infra, titulo de tēporum mu-
 rationibus.

Febris cholericā superflua frigiditate
 neq; reparatur, neq; quartana cum frigidi-
 tate humectante. Dam.

Si fuerit per culpam sanguinis aegritu-
 do, succurrere debes frigidis cibis, & aci-
 dis & siccis, quia sanguis calidus & humi-
 dus est & dulcis. Ex Sorano.

d 5 Si

THESES TOTIVS

Si ex cholera rubea fuerit ægritudo, da ei calidum & humidum & dulce, quia cholera amara & ignea est. Idem.

Si ex cholera nigra, da ei calidum & humidum & dulce, quia cholera nigra est, acris & frigida. Si ex phlegmate nata est ægritudo, da ei assidue dulce, & siccum & calidum, quia phlegma frigidum & humidum, & falsum est. Idem.

EX HIPPOCRATE DE natura humana.

Oportet ægritudines quæ hyeme incrementum suscipiunt, æstate desinere, & è contra, quæ ætate creuerunt, hyeme terminari, nisi intra dierum circuitum finiantur. Vide titulum de Prælagijs morborum in generali.

Vernorum morborum liberatio in autumno expectanda est.

Autumnales morbi in uete liberentur, necesse est.

Morbi alij uictus genere, alij à spiritu, quem trahentes uiuimus, proueniunt.
Hip. de natura humana.

Cum una ægritudine plures eodè homines tempore corripiuntur, causam tenere ad id debemus, quod maxime commu-

mune est, quoq; omnes utimur, id autem spiritus est, quē accipimus, reddimusq; .
Idem.

Cum uero eodē tempore diuersi morbi gignuntur, sine dubio uictus cuiusq; in culpa est. Idem.

Oportet itaq; remedia adhibere cum morbi occasione. Idem.

Morbi qui à corporis membrorum ualidissimo proficiscuntur, grauissimi sunt. Idem.

DE MORBORVM ITDI cationibus.

Acceffiones & constitutiones, morbi indicabunt, & anni tempora, & circuituū successiua incremēta, siue quotidie, siue alternis diebus, siue per maiora interualla fiant. Sed ex his quę mox apparent, iudicia sumuntur, quemadmodum in morbo laterali, si circa initia statim sputum appareat, morbum breuiat. Si uero postea appareat, producit. Et urinae & alui excrementa, & sudores, quę cumq; apparuerint, uel bonam morborū iudicationem, uel malam, uel breues aut longos fore morbos ostendunt. Hip. lib. 1. Aph. 12.

T H E S E S T O T I V S

Quibuscunq; crisis, id est, iudicatio fit, his mox grauis ante accessionem. Quæ uero subsequitur, magna ex parte leuior esse solet. Lib. 2. Aph. 13.

In profluuijs alui, mutationes excrementorum iuuant, nisi ad mala mutatio fiat. Lib. 2. Aph. 14.

Acutorum morborum non omnino sunt certæ prænuntiationes, aut salutis aut mortis. Lib. 2. Aph. 19.

Acuti morbi in quatuordecim diebus iudicantur. Lib. 2. Aph. 23.

Septenorum quartus est index, alterius septimanæ octauus principium. Est autem & undecimus contemplabilis, ipse enim quartus est alterius septimanæ. Rursum uero & decimus septimus contemplabilis, ipse siquidem quartus est à quarto decimo, septimus uero undecimus. Lib. 2.

Quibus in febris sexto die rigores fiunt, difficile iudiciū sequitur. Lib. 4. Aph. 24.

Quibuscunq; accessiones fiunt, quacunq; hora febris dimiserit, si eadem cras occupauerit, iudicium habent difficile. Lib. 4. Aph. 30.

Sudores febricitanti si inceperunt bo

hi, & 3. & 5. & 7. & 11. & 14. & 17. & 20. & 27. & 34. hi enim sudores indicant morbos. Qui uero non ita fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem & recidiuam.

DE PRAESAGIIS MORBORUM in generali.

Febriticantium non omnino leniter permanere corpus, et nihil minui, uel etiam plus quæ ratio postulat, cõtabescere, malum. Hoc enim morbi lōgitudinem, hoc uero imbecillitatem significat. Lib. 2. Aph. 29.

Circa initia & fines omnia imbecilliora, cum uero consistunt, firmiora. Lib. 2. Aph. 30.

His qui uon ex ratione lenius habent, non oportet fidere, neq; multum formidare mala, quæ præter rationem eueniunt. Plurima enim talia stabilia nō sunt, neq; multum durare & permanere consueuere. Lib. 2. Aph. 27.

In quouis morbo mente cōstare & bene se habere ad illa quæ offeruntur, bonum, è contra uero se habere, malum. Lib. 2. Aph. 33.

In morbis minus periclitantur, quorū
na

THESES TOTIVS

naturæ aut ætati, aut habitui, aut tempore
 ri magis congruit, morbus, quàm quibus se-
 cundum nihil istorum congruit. Libro 2.
 Aph. 34.

In quouis morbo partes ad umbilicū,
 & imum ventrem attinentes, crassitudi-
 nem habere, melius est. Multum uero ex-
 tenuari ac contabescere, prauum, sed &
 hoc quoque ad inferiores purgationes pe-
 riculosum. Lib. 2. Aph. 35.

Si quis febrem non habens abstinue-
 rit à cibo, & cordis morsum seu uertiginē
 patitur, & oris amaritudinem sentit, pur-
 gatione indigere per superiora significat.
 Lib. 4. Aph. 17.

Morbis quibuslibet incipientibus, si
 atra bilis, uel supra, uel infra exierit, leta-
 le. Lib. 4. Aph. 21.

Quibuscumque ex morbis acutis, aut diu-
 rurnis, siue uulneribus, siue quouis alio
 modo extenuatis, nigra bilis, siue uti san-
 guis niger de subter exierit, moriuntur.
 Lib. 4. Aph. 23.

Difficultas intestinorum si ab atra bile
 exierit, letalis est. Lib. 4. Aph. 24.

Quibuscumque resurgētibus ex morbis,
 si quid laborauerint, fiunt abscessus.

Lassitudinem habentibus in febris,
in articulos, & circa maxillas potissimū
abscessus fiunt. Lib. 4. Aph. 32.

Si à febre, habito tumore non existen-
te in faucibus, strangulatio repēte super-
uenerit, letale. Lib. 4. Aph. 34.

Si à febre habito collum peruertitur, et
nix potest deuorare sine ullo tumore, le-
tale. Lib. 4. Aph. 35.

Sudores febricitanti si inceperint, bo-
ni, & tertio die, & quinto, & 7. & 9. & 11.
& 14. & 17. & 20. & 27. & 34. hi enim sudo-
res iudicant morbos. Qui uero non ita fi-
unt laborem significant, & morbi longi-
tudinem, & recidiuam. Lib. 4. Aph. 36.

Qua parte corporis calor est, ibi signis-
ficat morbum. Lib. 4. Aph. 39.

Et ubi in toto corpore mutationes, &
si corpus refrigeretur, uel rursus calefacit,
uel calor alter ex altero fuit, longitudinē
morbi significat. Lib. 4. Aph. 40.

Præsagia morborum ex sudore nimio
aut retento. Vide titulo de sudore.

Præsagia febrium, uide titulo de febris
bus copiose, Item titulo de signis mortis
letalibus.

De prælagijs morbi comitialis, uide ti-
tulo

THESES TOTIVS

culo de morbo comitiali.

De morbo laterali uide titulo de pleur-
titide.

Quicumq; suppurati, aut aquam inter
cutem patientes, uruntur, aut secantur, si
pus aut aqua uniuersim effluerit, omnes
moriuntur. Lib. 6. Aph. 27.

In morbis acutis, frigus partium extre-
marum, malum. Lib. 7. Aph. 1.

In osse agrotante caro liuida, malum
est. Lib. 7. Aph. 2.

A vomitu singultus, & oculorum ru-
bor, malum. Lib. 7. Aph. 3.

A sudore horror, non bonum. Lib. 7:
Aph. 4.

A furore difficultas intestinorum, uel
aqua intercutem, uel mētis alienatio, bo-
num. Lib. 7. Aph. 5.

A morbo diuturno, fastidium cibi &
deiectiones syncerae, malum. Lib. 7. Aph.
sexto.

Ex multa potatione, rigor & desipien-
tia, malum. Lib. 7. Aph. 7.

A tuberculi intus ruptione exolitio, uo-
mitio, aut animi defectio fit. Lib. 7. Aph. 8.

A profluuiio sanguinis, desipientia, &
conuulsio, malum. Lib. 7. Aph. 9.

Si omentum excidit, necessario putrescit. Lib. 6. Aph. 58.

Ab ileo uomitus, singultus, desipientia, uel conuulsio, malum. Lib. 7. Aph. 10.

A morbo laterali inflammatio pulmonis, malum. Lib. 7. Aph. 11.

Ab æstibus fortibus conuulsio aut distentio, malum. Lib. 7. Aph. 14.

In capitis ictu obstupescencia & desipientia, malum. Lib. 7. Aph. 14.

A sanguinis sputo puris sputum. Lib. 7. Aph. 15.

A puris sputo phthisis & fluxus, cum uerū sputum retinetur. Lib. 7. Aph. 16.

In epatis inflammatione singultus, malum. Lib. 7. Aph. 17.

In uigilia conuulsio uel desipientia. Lib. 7. Aph. 18.

In ossis exutione erysypelas. Lib. 7. Aph. 19.

In erysypelate putredo aut suppuratio. Lib. 7. Aph. 20.

A forti in ulceribus pulsa, profluuium sanguinis. Lib. 7. Aph. 21.

A uentris dolore diuturno, suppuratio. Eodem. Aph. 22.

Quibus cerebrum sphacelatum, id est,
c. cor.

T H E S E S T O T I V S

corruptum, in tribus diebus pereunt. Si vero hos euaserint, salui fiunt. Aph. 51.

Vbi in toto corpore mutationes, et corpus refrigeratur, & rursum calefit, aut colorem alium ex alio commutat, longitudo morbi significatur. Eodem. Aph. 61.

Sudoris præfagia, uide titulo de sudore.

N O T A E E X F A C I E .

IN acutis morbis sic considerare oportet. In primis quidem ægri faciem, an sanorum faciebus, maxime uero sui ipsius similis sit. Ea enim optime censenda est, quæ uero maximo discrimine ab hac similitudine recedit, grauissimum periculum portendit, cuius hæc sunt notæ: Nasæ res acutæ, oculi concaui, collapsa temporæ, frigida, contractæque aures, & in his partibus leniter uersæ, cutis circa frontem dura, inuenta & arida, totius faciei color, aut niger aut pallidus, aut liuens aut plumbeus. Vide titulo de facie.

Notas ex oculis, uide titulo de oculis.

De decubitu eius signis, uide titulo, de cubitus.

Notas sudoris, uide Sudor.

Ex præcordijs signa, uide titulo de præcordijs.

De

De notis ex hydropisi, uide titulum,
Aqua inter cutem.

De somni præfagijs, uide titulum de
Somno.

De alui excrementis, uide titulum de
alui excrementis.

Præfagia urinæ, uide titulo de urina.

Acra ægritudines plus in senibus quàm in
iuuenibus timendæ sunt, citius enim in
bonum, malum uè firmanur. Dam.

Morbum diuturnum aut defectum me-
brorum hæreditæ filius, sed differenter,
aut minorem, si alter parentum fuerit sa-
nus, Dam.

DE SIGNIS ADVER

sæ ualitudinis ex Cornelij Cel

si Lib. 2. cap. 2.

SI plenior aliquis & speciosior, & colo-
rator factus est, suspecta habere bona
debet.

Quæ quia neque in eodem habitu subsi-
stere, neque ultra progredi possunt, serè re-
tro quasi ruina quædam reuoluuntur.

Hip. in Aph Habitus exercitatorum.

Prius tamen signum est, ubi aliquis cõ-
tra consuetudinem emarcuit, & colorem
decorem quædam amisit, quoniam in his que su-
e 2 pe

T H E S E S T O T I V S

perant, est quod morbus demat, in his
quæ defunt, non est quod ipsum morbū
ferat.

Præter hæc protinus timere debet, si
grauiora membra sunt, si crebra ulcera o-
riuntur, si corpus supra consuetudinē in-
caluit, si grauior somnus præssit, si tumul-
tuosa somnia fuerint, si sæpius expergisci-
tur aliquis, quæ affuenit, deinde iterum so-
poratur, si corpus dormientis circa par-
tes aliquas contra consuetudinem insu-
dat, maxime quæ circa pectus, aut ceruices,
aut crura, uel genua, uel coxas.

Item si marcet animus, si loqui & mo-
ueri piget, si corpus torpet, si dolor præ-
cordiorum est, aut totius pectoris, aut in
plurimis uenis capitis, si saliuæ plenū est
os, si oculi cum dolore uertuntur, si tem-
pora astricta sunt, si mēbra inhorrescūt, si
spiritus grauior est, si circa frontem inter-
tæ uenæ mouentur, si frequentes oscitatio-
nes, si genua quasi fatigata sunt, totūue
corpus lassitudinem sentit.

Ex quibus sæpe plura, nunquæ non ali-
qua febrem antecedunt.

Inprimis tamen illud considerandū
est, nunquid sæpius horum aliquid eue-

niat, ac neq; ideo corporis ulla difficultas subsequatur.

Sunt enim quædam proprietates hominum, sine quarum notitia, non facile quicquam in futuram prælagiri potest.

Facile itaq; securus est in his aliquis, qui sæpe sine periculo euasit.

Ille sollicitari debet, cui hæc noua sunt, aut qui ista nunq; sine custodia sui tuta habuit.

QVAE BONA IN AEGROTANTIBUS SIGNA SUNT.

Vbi uero febris aliquem occupat, scire licet non periclitari, si in latus, aut dextrum, aut sinistrum (ut ipsi uisum est, cubat) cruribus paulum reductis, qui ferè sani quoq; iacentis habitus est, si facile conuertitur, si noctu dormit, si interdium uigilat, si ex facili spirat, si non conflictatur, si circa umbilicum & pubem cutis plana est, si præcordia eius sine ullo sensu doloris, æqualiter mollia in utraq; parte sunt.

Quòd si paulo tumidiora sunt, sed tamen digitis cedunt, & non dolent, hæc ualendo, ut spacium aliquod habebit, sic tuta erit.

Corpus quoq; quod æqualiter molle,

THESES TOTIVS

& calidum est, quodq; æqualiter totum insudat, & cuius febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur, quando iam ad sanitatem uenit corpus.

Sternutamentum etiam inter bona iudicia est, & cupiditas cibi, uel à primo seruata, uel etiam post fastidium orta.

Neq; terrere debet ea febris, quæ eodē die finita est, ac ne ea quidem, quæ quāuis longiore tempore euauit, tamē ante alteram accessionem ex toto quiescit, sicut corpus integrum (quod *ἔιδιπνίς* Græci uocant) fieret.

Si quis autem incidit uomitus, mixtus esse ex bile & pituita debet, & in urina subsistere album, leue, æquale, sic ut etiā, si quæ quasi nubeculæ innatarint, in imū deferantur.

At uenter ei qui à periculo tutus est, reddi modo mollia, figurata eodem tempore, quo secunda ualetudine affuevit, modo conuenientia his quæ assumuntur.

Peior cita aluus est, sed ne hæc quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, & ruf

fa est, neq; fœditate odoris similem aluū
fani hominis excedit.

Ac lumbricos quoq; aliquos sub fine
morbi descendisse, nihil nocet.

Si inflammatio in superioribus parti-
bus dolorem, tumoremq; fecit, bonum
signum est.

Sonus ventris inde ad inferiores par-
tes euolutus, magisq; etiam si sine difficul-
tate cum stercore excessit.

M A L A S I G N A A E G R O
tantium. Cap. 3.

CONtra grauis morbi periculum, ubi
supinus aeger iacet, porrectis mani-
bus & cruribus, ubi residere uult in ipso
acuti morbi impetu, præcipueq; pulmo-
nibus laborantibus. Cap. 3.

Vbi nocturna uigilia præmittitur, etiã
si interdiu somnus accedit.

Ex quo tamen peior est, qui inter quar-
tam horam & noctem, q̄ qui matutino
tempore ad quartam.

Pessimum tamen est, si somnus, neq;
noctu, neq; interdiu accedit, id enim ferè
sine continuo dolore esse non potest.

Aequè uero signum malum est, etiam
somno ultra debitum urgeri, peiusque
e 4 quo

T H E S E S T O T I V S

quo magis se sopor interdium, noctuq; con-
tinuat.

Mali etiam morbi testimonium est, ue-
hementer & crebro spirare, à sexto die ce-
pisse inhorrescere, pus expuere, uix excre-
are, dolorem habere continuum, difficul-
ter ferre morbum, iactare brachia & cru-
ra, sine uoluntate lachrymare, habere hu-
morem glutinosum, dentibus inhæren-
tem, cutem circa umbilicum & pubé ma-
cram, præcordia inflammata, dolentia,
dura, tumida, intenta, magisq; si hæc dex-
tra parte quàm sinistra sunt, periculosissi-
mum tamen est, si uenæ quoq; ibi uehe-
menter agitantur.

Mali etiam morbi signum est, nimis ce-
leriter emacrescere, caput & pedes, ma-
nusq; calidas habere, uentre & lateribus
frigentibus, aut frigidis extremas partes
acuto morbo agente, aut post sudoré in-
horrescere, aut post uomitum singultum
esse, uel rubere oculos, aut post cupidita-
tem cibi, postq; longas febres hunc fasti-
dire, aut multum sudare, maximeq; frigi-
do sudore, aut habere sudores non per
totum corpus æquales, quiq; febrem nõ
finiant, & eas febres quæ quotidie tem-
pore

pore eodem reuertantur, quæue semper pares accessiones habeant, neque tertio quoque die leuentur, quæue continent, uel per accessiones increſcant, per diſceſſiones tantum molliantur, nec unquam integrum corpus dimittant.

Pessimum est, si ne leuatur quidem febris, sed æque concitata continuat.

Periculosum est etiam post arquatam morbum febrem oriri, utique si præcordia dextra parte dura manserunt, ac dolentibus his leua.

Nulla acuta febris leuiter tertere nos debet.

Timere etiam ex somno, mali morbi est. Itemque in prima febre protinus mentem esse turbatam, membrumue aliquod esse resolutum.

Ex quo casu quis uita redditur, tamen id ferè membrum debilitatur.

Vomitus etiam periculosus est, syncesæ pituitæ uel bilis, peiorque si uiridis aut niger est.

At mala urina est in qua subsidunt subsidunt subrubra aut liuida, deterior in qua quasi fila quædam tenuia atque alba, pessima ex his, si tanquam ex fursuribus factas

THESES TOTIVS

nubeculas repræsentat.

Diluta quoq; atq; alba vitiosa est, sed in phrenericis maxime.

Alius autem mala est, ex toto suppressa.

Periculosa etiam quæ inter febres fluens, conquiescere hominem in cubili nõ patitur, utiq; si quid descendit, est perlicidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans.

Præter hæc periculũ ostendit id quod excernitur, si est exiguum, glutinosum, leue, album, idemq; subpallidum, uel si est liuidum, aut biliosum, aut cruentum, aut peioris odoris, quàm ex consuetudine.

Malum est etiam, quod post febres longas syncerum est.

DE SIGNIS LONGÆ ualetudinis. Cap. 4.

Post hæc indicia notum est longum morbum fieri. Sic enim necesse est, nisi occidit.

Neq; uitæ alia spes in malis magnis est, quæ ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturq; in id tempus, quod curationi locum præstet.

Protinus tamen sigula quædam sunt,
ex

ex quibus colligere possumus morbum, & si non interemerit, longius tamen tempus habiturum.

Vbi frigidus sudor inter febres non a cutas, circa caput tantum, & ceruices oritur, aut ubi febre non quiescente corpus insudat, aut ubi corpus modo frigidum, modo calidum est, & calor alius ex alio fit, aut ubi quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non peruenit, aut ubi æger pro spatio parum emacrescit.

Item si urina modo liquida & pura est, modo habet quædam subsidencia leuia atq; alba, rubræue sunt quæ in ea subsident, aut si quædam quasi maculas representat, aut si bullulas excirat.

D E I N D I C I I S M O R B O R U M.

Cap. 5.

Sed inter hæc quidem proposito mestu, spes quidem superest.

Ad ultima uero iam uentum esse testatur, nares acutæ, collapsa tempora, oculi concaui, frigida, languidaq; aures, & imis partibus leniter uersæ, cutis circa frõtem dura & intenta, color aut niger, aut perpallidus, multoq; magis si ita hæc sũt, ut neq; uigilia præcesserit, neq; uentris res

T H E S E S T O T I V S

solutio, neq; inedia. Ex quibus cauffis interdum hæc species oritur, sed uno die finitur. Itaq; diutius durans, mortis index est.

Si uero in morbo ueteri iam triduo talis est, in propinquo mors est, magisq; si præter hæc, oculi quoq; lumen refugiunt, & illachrymant, quæq; in his alba esse debent, rubescunt, atq; in iisdem uenule pallent, pituitaq; in ijs innatans nouissime angulis inhærescit, alterq; ex his minor est, hiq; aut uehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt, perq; somnum palpebræ non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet, neq; id fluens aluus expressit, eademq; palpebræ pallent, & idem pallor labra & nares decolorat. Eademq; labra & nares, oculiq; & palpebræ & supercilia, aliquâ uel ex his peruertuntur, isq; propter imbecillitatem iam non audit, aut non uidet eadem, mors denuntiatur.

Vbi æger supinus cubat, eiq; genua contracta sunt. Vbi deorsum ad pedes subinde delabitur.

Vbi brachia & crura nudat, & inæqualiter dispergit, neq; his calor subest.

Vbi

Vbi hiat, ubi assidue dormit, ubi is qui mentis suæ non est, neq; id facere sanus solet, dentibus stridet.

Vbi ulcus qd' aut ante, aut in ipso morbo natū est, aridū & aut pallidū, aut liuidum factum est.

Illæ quoq; mortis indicia sunt, ungues, digitiq; pallidi, frigidus spiritus, aut si manibus quis in febre, aut acuto morbo uel insania, pulmonisue dolore, uel capitis, in ueste floccos legit, fimbriasue diducit, uel in adiuncto pariete, si qua minuta eminent, carpit.

Dolores etiam circa coxas, & inferiores partes orti, si ad uiscera trāsierunt, subitoq; desierunt, morrem subesse testantur, magisq; si alia quoq; signa accesserunt.

Neq; is seruari potest, qui sine ullo tremore febricitans, subito strangulatur, aut deuorare saliuam suam non potest.

Cuius in eodem febris corporisq; habitus, ceruix conuertitur, sicut deuorare æque nihil possit. Aut cui simul, continua febris, & ultima corporis infirmitas est. Aut cui febre nō quiescente, exterior pars friget, interior sic calet, ut etiam sitim faciat, aut qui febre æque non quiescente, simul

T H E S E S T O T I V S

mul & delirio, & spirandi difficultate uexatur, aut qui epoto ueratro exceptus distentione neruorum est, aut qui ebrius obmutuit. Is enim neruorum distentione consumitur, nisi aut febris accessit, aut eo tempore (quo ebrietas solui debet) loqui coepit.

Mulier quoque grauida, acuto morbo facile consumitur, & is cum somnus dolorem auget, & cui protinus in recenti morbo, bilis atra uel infra, uel supra se ostendit, cuius alterutrum modo se prompsit, cum iam longo morbo corpus eius esset extenuatum & affectum. Sputum etiam biliosum & purulentum, siue separatim ista, siue mixta proueniunt, interius periculum ostendunt.

Ac si circa septimum diem tale esse coepit, proximum est, ut is circa quartumdecimum diem decedat, nisi alia signa meliora, peioraue accesserint. Quae quo leuiora, graioraue subsequuta sunt, eo uel ferriorem mortem uel maturiorem denuntiant.

Sudor quoque frigidus in acuta febre pestiferus est, atque in omni morbo uomitus, qui uarius et multorum colorum est, praes

præcipueq̃ si malus in hoc odor est.

Ac sanguinem quoq̃ in febre uomit
se, pestiferum est.

Urina uero rubra & tenuis in magna
cruditate esse consuevit, & sæpe antequã
spatio maturescat, hominem rapit. Itaq̃
si talis diutius permanet, periculum mor
tis ostendit.

Pessima tamen est, præcipueq̃ mortif
fera, nigra, crassa, mali odoris.

Atqui in uiris quidem & mulieribus,
talis deterrima est.

In pueris uero, quæ tenuis & diluta est.

Aluus quoq̃ uaria, pestifera est, quæ
strigmentum, sanguinem, bilem uiridẽ,
aliquid modo diuersis temporibus, mo
do simul, & in mistura quadam, discreta
tamen representat. Sed hæc quidem po
test paulo diutius trahere.

In præcipiti uero iam esse denunciat,
quæ liquida, eademq̃ uel nigra uel palli
da uel pinguis est, utiq̃ si magna fœditas
odoris accessit.

Illud interrogari me posse ab aliquo
scio. Si certa futuræ mortis indicia sunt,
quomodo interdum deserti à medicis,
conualescant, quosdamq̃ fama prodides
rit

THESES TOTIVS

rit in ipsis funeribus reuixisse.

Quinetiam uir iure magni nominis Democritus, ne finitæ quidem uitæ satis certas notas esse proposuit, quibus medici credidissent, adeo illud unū reliquit, ut certa aliqua signa futurę mortis essent. Aduersus quos ne illud quidem dicam, quòd in uicino sæpe quædam notæ posita, non bonos, sed imperitos decipiunt, quod Asclepiades funeri obuius intellexit, cum uiuere qui efferebatur, ne protinus crimen artis esset, si quod professoris sit. Illa tamen moderatius subijciam: Coniecturalem artem esse medicinam, rationemq; coniecturę talem esse, ut cum sæpius aliquando respõderit, interdum tamen fallat nos. Si quid itaq; uix in millesimo corpore aliquando decipit, id notam non habet, cum per innumerabiles homines respondeat. Idq; non in his tantum, quæ pestifera sunt, dico, sed in his quoq; quæ salutaria.

Siquidem etiam spes interdum frustratur, & moritur aliquis, de quo medicus securus primo fuit.

Quæq; medendi causa reperta sunt, nonnunq; in peius aliquid conuertunt.

Neq;

Neq̄ id evitare humana imbecillitas in tanta uarietate corporum potest.

Sed est tamen medicinæ fides, quæ multo sapius, postq̄ multo plures ægros prodest.

Neq̄ tamen ignorare oportet, in acutis morbis fallaces magis notas esse, & salutis & mortis.

DE NOTIS, QVAS ALI
quis in singulis morborum generibus habere possit.

Cap. 6.

ANte febres, si caput graue est, aut ex fomno oculi caligant, aut frequentia stertuta mēta sunt, circa caput aliquis pituitæ impetus timeri potest.

Si sanguis aut calor abundat, proximū est, ut aliqua parte profluuiorum sanguis fiat.

Si sine causa quis emacrescit, ne in malum habitum corpus eius recidat, metus est.

Si præcordia dolent, aut inflammatio grauis est, aut non toto die concocta fertur urina, cruditatem esse manifestū est.

Quibus diu color sine morbo regio malus est, si uel capitis doloribus consli-

T H E S E S T O T I V S

stantur, uel terram edunt.

Qui diu habet faciem pallidam & tumidam, aut capite aut uisceribus, aut alio uo laborant.

Si in continua febre puero uenter nihil reddit, mutaturque ei color, nec somnus accedit, ploratque assidue, metuenda nervorum distentio est.

Frequens autem destillatio in corpore tenui, longoque tabem timidam esse testatur.

Vbi pluribus diebus non descendit aluus, docet aut subitam deiectionem, aut febriculam instare.

Vbi pedes turgent, longae deiectiones sunt.

Vbi dolor in imo uentre & coxis est, aqua intercutem instat. Sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet.

Idem propositum periculum est his, quibus uoluntas desidendi est, uenter nihil reddit, nisi & ægre & durum, tumor in pedibus est, idemque modo dextra, modo sinistra parte uentris, inuicem oritur atque firmitur, sed à iecinore id malum proficisci uidetur.

Eiusdem morbi nota est, ubi circa umbilicam

bilicum intestina torquentur (Græci nominant *στυφοδύ*) coxæq; dolores manēt, eaq; neq; tempore neq; remedijs soluntur.

Dolor autem articulorum, prout in pedibus, manibusue, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nerui contrahantur, aut si id membrum ex leui causa fatigatum, æque frigido calidoq; offenditur, *ποδάγρα* *χεράγρα*ue, uel eius articuli in quo id sentitur, morbū futurum esse, denūciat.

Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desijt, ij uel capitis doloribus conflētentur necesse est, uel in articulis aliquas, exulcerationes graues habeant, uel aliquo morbo etiam debilitentur.

Quibus fœminis menstrua non proueniūt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, uel quælibet alia pars morbo infestetur. Eademq; his pericula sunt, quibus articulorum uitia, dolores, tumoresq; sine podagra, similibusq; morbis oriuntur & desinunt.

Vtiq; si sæpe tempora ijsdem dolent, noctuq; corpora insudant, frons prurit,

THESES TOTIVS

lippitudinis metus est.

Si mulier à partu uehementes dolores habet, neq; præterea signa mala sunt, circa uigefimum diem, aut sanguis per nares erumpet, aut inferioribus partibus aliquid abscedet.

Quicumq; etiam dolorem ingentem circa tempora & frontem habebit, is alterutra ratione eum finiet, magisq; si iuuenis fuerit, per sanguinis profusionem, si senior, per suppurationem.

Febris autem quæ subito sine ratione, sine bonis signis finita est, ferè reuertitur.

Cui fauces sanguine & inter diu & noctu replentur, sicut neq; capitis dolores, neq; præcordiorum, neq; tussis, neq; uomitus, neq; febricula præcesserit, huius aut in naribus, aut in faucibus ulcus reperiatur.

Si mulieri ex inguine febricula orta est, neq; causa apparet, ulcus in uulua est.

Vrina autem crassa, ex qua quid desideret, album est, significat circa articulos, aut circa uiscera, dolorem, metumq; morbi esse.

Eadem uiridis, aut uiscerum dolorè, tumoremq; cum aliquo periculo subesse,
aut

aut corpus certe integrum non esse, testatur.

At si sanguis aut pus in urina est, uel uefica uel tenes exulcerati sunt.

Si hæc crassa caruncula quasdam exiguos quasi capillos habet, aut si bullat, aut male olet, & interdum quasi harenâ, interdum quasi sanguinem trahit, dolent autem coxæ, quæquæ inter has, superque pubem sunt, & accedunt frequenter rictus, interdum uomitus biliosus, extremæque partes frigescunt, urinæ crebra cupiditas, sed magna difficultas est, & quod inde excretum est, aquæ simile, uel ruffum uel pallidum est, paulum tamen in eo leuamenti est, aluus uero cum multo spiritu redditur, utique in renibus uitium est.

Aut si paulatim destillat, uel si sanguis per hanc æditur, & in eo quædam cruenta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, & circa pubem inferiores partes dolent, in eadem uefica uitium est.

Calculosi uero his inditijs cognoscuntur.

Difficiliter urina redditur, paulatimque interdum etiam sine uoluntate destillat.

Eadê harenosa est, nonnunquam aut sanguis

T H E S E S T O T I V S

guis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur. Eamque quidam promptius recti, quidam resupinati, maximeque hi qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colicam extendendo, dolorem leuant.

Gravitatis quoque cuiusdam in ea parte sensus est, atque ea cursu, omni que motu augetur.

Quidam etiam cum torquentur, pedes inter se subinde mutatis uicibus implicant.

Fœminæ uero oras naturalium suorū, manibus admotis scabere crebro coguntur. Nonnunquam si digitum admouerunt, ubi uesicæ ceruicem is urget, calculum sentiunt.

At qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone uitium est.

Mulieri grauidæ sine modo fusa aluus, elidere partum potest.

Eidem si lac ex mammis perfluit, imbecillum est quod intus gerit.

Duræ mammæ sanum illud esse testantur.

Frequens singultus, & præter consuetudinem continuus, iecur inflammatum esse significat. Si

Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idq; à tergo incidit, uel distentio neruorum, uel rigor timeri potest.

At si à priori parte id euenit, uel lateris acutus dolor, uel insania expectanda est. Interdum etiam huiusmodi casu, quæ tutissima inter hæc est, profusio alui sequitur.

Si ora uenarum sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes sequitur.

Eadem tabes subit, si in lateres dolore orta suppuratio, intra quadraginta dies purgari non potuit.

At si longa tristitia cum longo timore, & uigilia est, atræ bilis morbus subest.

Quibus sæpe ex naribus fluit sanguis, his aut lien tumet, aut capitis dolores sūt, quos sequetur, ut quædam ante oculos, tanq; imagines obuersentur.

At quibus magni lienes sunt, his gingiue malæ sunt, & os olet, aut sanguis aliqua parte proruperit. Quorum si nihil euenit, necesse est in cruribus mala ulcera, & ex his nigra cicatrices fiant.

Quibus causa doloris, neq; sensus eius est, his mens labat.

THESES TOTIVS

Si uērem sanguis confluit, ibi in pus
uertitur.

Si à coxis & ab inferioribus partibus
dolor in pectus transit, neq; ullum signū
malum accessit, supurationis eo loco pe-
riculum est.

Quibus sine febre aliqua ex parte do-
lor aut prurigo cum rubore, aut calor est,
id aliquid suppurat.

Vrina quoq; quæ in homine sano pa-
rum liquida est, circa aures futuram ali-
quam supurationem esse, denūciat.
Hæc uero cum sine febre quoq; uel latentium
uel futurarum rerum notas habeāt,
multo certiora sunt, ubi febris accessit, at-
que etiam aliorum membrorum tum si-
gna noscuntur.

Ergo protinus insania timēda est, ubi
expeditior alicuius, q̄ sani fuit, sermo est,
subitoq; loquacitas orta est, & hæc ipsa so-
lito audacior, aut ubi raro quis & uehe-
menter spirat, uenasq; concitatas habet,
præcordijs duris & tumentibus.

Oculorum quoq; frequens motus, &
in capitis dolore effusæ oculis tenebræ,
uel nullo dolore substante somnus ere-
ptus, continuataq; nocte & die uigilia,
uel

vel prostratum contra consuetudinē corpus in uentrem, sic, ut ipsius alui dolor id non coegerit, item robusto adhuc corpore, insolitus dentium stridor, insanix signa sunt.

Si quid etiam abscessit, anteq̄ suppuraret manente adhuc corpore, insolita febris subfedit, periculum adfert primum furoris, deinde interitus.

Auris quoq̄ dolor acutus, cum febre continua, uehementiq̄, sæpe mentē turbat, & ex eo casu iuniores, interdum septimum diem moriuntur, seniores tardius, quoniam neq̄ æque magnas febres experiuntur, neq̄ æque insaniunt, ita sustinet dum is affectus intus uersatur. Suffusæ quoq̄ mulieris mammae, furorē uenturum esse testantur.

Quibus autem longæ febres sunt, his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt.

Quorum faucibus in febre eliditur spiritus, instat his neruorum distentio.

Si angina subito finita est, in pulmonē id malum transit, idq̄ sæpe intra septimū diem occidit. Quod nisi incidat, sequitur ut aliqua parte suppuret.

T H E S E S T O T I V S

Deinde post alui longam resolutionē,
tormina. Post hæc intestinorum leuitas
oritur.

Post nimias destillationes, tabes.

Post lateris dolores, uitia pulmonum,
post hæc insania.

Post magnos feruores corporis, neruo-
rum rigor aut distentio.

Vbi caput uulneratum est, delirium.

Vbi uigilia torfit, neruorum distentio.

Vbi uehementer uenę saper ulcera mo-
uentur, sanguinis profluium erit.

Suppuratio uero pluribus morbis exci-
tatur.

Nam si longæ febres sine dolore, sine
manifesta causa remanent, in aliquâ par-
tem id malum incumbit in iunioribus tã-
tum, in senioribus ex eiusmodi morbo
quartana ferè nascitur.

Eadem suppuratio fit, si præcordia du-
ra dolentia, ante uigesimum diem homi-
nem non sustulerunt, neq; sanguis ex na-
ribus fluxit, maximeq; in adolescentibus.
Vtiq; si inter principia, aut oculorum cali-
go, aut capitis dolores fuerunt, sed tum
in inferioribus partibus aliquid abscedit.

At si præcordia tumorem mollem hæ-
bent,

bent, neq; habere intra sexaginta dies desinunt, hæretq; per omne id tempus febris, tum in superioribus partibus fit abscessus, ac, si inter ipsa ulcera non fuit, circa aures erumpit.

Cumq; omnis longus tumor ad supurationem ferè spectet, magis eò tendit is qui in præcordiis, q̄ is qui infra est.

Si lassitudinis etiam sensus in febre est, uel in maxillis, uel in articulis aliquid abscedit.

Interdum quoq; urina tenuis & cruda sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint, exq; eo casu, plærumq; infra transversum septum, quod *διαφραγμα* Greci uocant, fit abscessus.

Dolor autè pulmonis, si neq; per sputa, neq; per cucurbitulas, neq; per sanguinis detractionem, neq; per uictus rationem finitus est, uomicas aliquas interdum excitat, aut circa uigesimum diem, aut quadragessimum, nonnunq; etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitauit aliquis, aut inhorruit, aut grauitatem eius partis sensit. Sed hæ uomicæ modo à pulmone, modo à contraria parte nascuntur.

Quòd

THESES TOTIVS

Quòd si suppurat, si ab ea parte (quam afficit) dolorem, inflammationemq; concitat, ipsum calidius est, & si in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam expòdere aliquo uidetur.

Omnis etiam suppuratio quæ nondû oculis patet, sic deprehendi potest: Si febris non dimittit, eaq; interdum leuior est, noctu increfcit, multus sudor oritur. Cupiditas tussendi est, & pene nihil in tussi excreatur, oculi caui sunt, malæ rubent, uenæ sub lingua inalbescunt, in manibus fiunt adunci ungues, digiti, maximeq; sumi calent, in pedibus tumores sunt, spiritus difficiliter trahitur, cibi fastidium est, pustulæ toto corpore oriuntur. Quòd si protinus initio dolor & tussis fuit, & spiritus difficultas, uomica, uel ante uel circa uigefimum diem erumpet.

Si ferius ista cœperint, necesse est quidem increfcant, sed quo minus cito effecerint, eo tardius soluentur.

Solent etiam in graui morbo, pedes cû digitis, unguibusq; nigrescere. Quòd si non est mors consequuta, & reliquum corpus inualuit, pedes tamen decidunt.

Quæ

QVAE NOTAE IN QVO
que morbi genere, uel spem
uel pericula ostendant.

SEquitur, ut in quoq; morbi genere,
proprias notas explicem, quæ uel spẽ
uel periculum ostendant.

Ex uesica dolente, si purulenta urina
processit, inq; ea leue & album subsedit,
metum detrahit.

In pulmonis morbo, si sputo ipso leua-
tur dolor, quamuis id purulentum est, ta-
men æger facile spirat, facile excreat, mor-
bum ipsum non difficulter fert, potest ei
secunda ualorudo contingere.

Neq; inter initia terreri conuenit, si pro-
tinus sputum mistum est ruffo quodam
& sanguine, dummodo statim ædatur.

Laterum dolores suppuratione facta,
deinde intra quadragesimum diem pur-
gata, finiuntur.

Si in iecinore uõmica est, & ex ea fer-
tur pus purum & album, salus ei facilis.
Id enim malum in tunica est.

Ex suppurationibus uero, hæ tolerabi-
les sunt, quæ in exteriorem partem ferun-
tur & acuantur. Et ex his quæ intus proce-
dunt, hæ leniores, quæ contra se cutem
non

T H E S E T O T I V S

non afficiunt, eamq; & sine dolore esse,
& eiusdem coloris, cuius reliquæ partes
sunt, sinunt esse.

Pus quoq; quacunq; parte erumpit, si
est leue, albū, unius coloris, sine ullo me-
tu est, & quo effusio febris protinus con-
quieuit, desieruntq; urgere, cibi fastidiū,
& potionis desyderium, si quando etiā
suppuratio descendit in crura, sputumq;
eiusdem factum pro ruffa purulētum est,
periculi minus est.

At in tabe eius qui saluus futurus est,
sputum esse debet album, æquale totū,
eiusdemq; coloris, sine pituita, eiq; etiā
simile esse oportet, si quis in nates à capi-
te distillat.

Longe optimum est febrem omnino
non esse, secundum esse, tantulam esse, ut
neq; cibum impediāt, neq; crebram sitim
faciat.

Alius in hac aetudine ea ruta est, quæ
quotidie coacta, eaq; conuenientia his,
quæ assumuntur reddit.

Corpus id quod minime tenue, maxi-
miq; pectoris atq; setosi est, cuiusq; cartila-
go exigua & carnosā est.

Super tabem si mulieri quoq; suppressa
sa

sa menstrua fuerunt, & circa pectus atq; scapulas dolor mansit, subitoq; sanguis erupit, leuari morbus solet. Nam & tussis minuetur, & sitis atq; febriculae desinunt.

Sed hsdem ferè, nisi redit sanguis, uo- mica erumpit, quæ quo cruentior, eò me- lior est.

Aqua autem inter cutem minime terri- bilis est, quæ nullo antecedente morbo cœpit, deinde quæ longo morbo super- uenit. Vtiq; si firma uiscera sunt, si spiritus facilis, si nullus dolor, si sine calore cor- pus est, æqualiterq; in extremis partibus macrum est, si uenter mollis, si nulla tuf- sis, nulla sitis, si lingua (ne per somnum quidem) inarescit, si cibi cupiditas est, si uenter medicamentis mouetur, si per se excernit mollia & figurata, si extenuatur, si urina & uini mutatione, & epotis ali- quibus medicamentis mutatur. Si cor- pus sine lassitudine est, & morbum facile sustinet. Siquidè in quo omnia hæc sunt, is ex toto tutus est, in quo plura ex his sūt, is in bona spe est.

Articulorum uero uitia, ut podagræ, chiragræq; si iuuenes tentarunt, neq; cal- lum indaxerūt, solui possunt, maximeq;

T H E S E S T O T I V S

torminibus leniuntur, & ex quocumque morbo uenter fluit.

Item morbus comitialis ante pubertatem ortus, non ægre finitur, & in quo ab una parte corporis uenientis accessionis sensus incipit, optimum est à manibus pedibusue initium fieri, deinde à lateribus pessimum inter hæc à capite.

Atque in his quoque ea maxime profunt, quæ per deiectiones excernuntur.

Ipsa autem deiectio, sine ulla noxa est, quæ sine febre est, si celeriter desinit, si contracto uentre nullus motus eius sentitur, si extremam aluum spiritus sequitur.

Acria tormina quidem periculosa non sunt, si sanguis & strigmenta descendunt, dum febris, cæteraque accessiones huius morbi obsint. Adeo ut etiam grauida mulier non solum reseruari possit, sed etiam partum reseruare. Prodestque in hoc morbo, si iam ætate aliquis processit.

Contra intestinorum leuitas, facilius à teneribus ætatibus depellitur, utique si fuerit iurina & ali cibo corpus incipit.

Eadem ætas prodest, & in coxæ dolore, & humerorum, & in omni resolutione neruorum. Ex quibus coxa, si sine torpore

pore est, si leuiter friget, quamuis magis
 nos dolores habet, tamen & facile & ma-
 ture sanatur, resolutumq; membrum si
 nihilominus aliter fieri sanum potest, om-
 nis resolutio etiam, aluo cita finitur. Om-
 nisq; deiectio lippienti prodest.

At uarix ortus, uel per ora uenarum, su-
 bita profusio sanguinis uel tormina, insa-
 niam tollunt.

Humeroꝝ dolores, qui ad scapulas
 uel manus tollunt, uomitu atrae bilis solu-
 uuntur. Et quisquis dolor deorsum ten-
 dit, sanabilior est.

Singultus sternutamento finitur.

Longas deiectiones supprimit uomi-
 tus.

Mulier sanguinem uomens profusis
 mensstruis laboratur.

Quæ mensstruis non purgatur, si sang-
 uinem ex naribus fudit, omni periculo
 uacat.

Quæ locis laborat, aut difficulter par-
 tum ædit, sternutamento leuatur.

Æstiuæ quartana ferè breuis est.

Cui calor & tremor est, saluti delirium
 est.

Lienosis bona tormina sunt. Deniq;
 g ipsa

T H E S E S T O T I V S

ipsa febris (quod maxime mirum uideri potest) saepe praesidio est. Nam & precordialium dolores si sine inflammatione sunt, finit, & in iecinoris dolore succurrit, & neruorum distentionem, rigorēq; (si postea coepit) ex toto tollit, & ex difficultate urinæ morbum tenuioris intestini ortum (si urinam per calorem mouet) leuat.

At dolores capitis quibus oculorum caligo & rubor, cum quadam frontis pruriginē accedunt, sanguinis profusione, uel fortuita uel etiam petita sum mouentur.

Si capitis ac frontis dolores ex uento, uel frigore & aestu sunt, grauedine & sterilitatis finiuntur.

Febrem autem ardentem, quam Graeci *καυσόδη* uocant, subitus horror exoluit.

Si in febre aures obtusae sunt, si sanguis è naribus fluxit, aut uenter resolutus est, illud malum desinit ex toto.

Nihil plus aduersum surditatem quam biliosa alius potest.

Quibus in fistula urinæ uti minuti abscessus, quos Graeci *φύγματα* uocant, esse
coe

cœperunt, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Ex quibus cum pleraque per se proueniant, scire licet inter ea quoque, quæ ars adhibet, naturam plurimum posse.

Contra, si caput febre continenti dolet, neque quicquam reddit, malum atque mortiferum est, maximeque id periculum est pueris à septimo usque ad quartumdecimum.

In pulmonis morbo, si sputum primis diebus non fuit, deinde à septimo die cœpit, & ultra septimum mansit, periculosum est. Quantoque magis mistos, neque inter se diductos colores habet, tanto deterior. Et tamē nihil peius est quam syncerum, id est, siue ruffum est, siue cruentum, siue album, siue glutinosum, siue pallidum, siue spumans, nigrum tamen pessimum est.

In eodem morbo periculosa sunt, tussis, destillatio, etiam, quod aliàs salutare habetur, sternutamentum.

Periculosissimum est, si hæc secuta subito deiectio est.

Peruero quæ in pulmonis, eadem in lateris doloribus, et mitiora signa & asperiora esse consueuerunt.

THESES TOTIVS

Ex iecinore si pus cruentum exit, mortiferum est.

At ex suppurationibus hæc pessimæ sūt, quæ intus tendunt, sicut exteriorē quoq; cutem decolorent.

Ex his deinde, quæ in exteriorē partem prorumpit, quæ maximæ quæq; planissimæ sunt. Quod si ne rupta quidem uomica, uel pitre extrinsecus emissio febris quieuit, tamen reperit.

Item si sitis est, si cibi fastidium, si uenter liquidus, si pus est liuidum et pallidū, si nihil æger excitat, nisi pituitam spumantem, periculum certum est.

Atq; ex his quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitarunt, fere senes moriuntur, ex cæteris iuniores.

At in tale sputum mixtum, purulentū, febris assidua, quæ & cibi tempora eripit, & siti adfligit in corpore tenui, periculum subesse testatur.

Si quis etiam in eo morbo diutius traxit, ubi capilli fluunt, ubi ruina quædam araneis similia subsidentia ostendit, atq; in his odor foedus est, maximeq; ubi post hæc orta deiectio est, protinus moritur.

Vtiq; si tempus autumnus est, quo fere qui

qui cætera parte anni traxerunt, resoluntur.

Item pus expuisse in hoc morbo, dein de ex toto spuerere desisse, mortiferum est.

Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo uomicæ, fistulæq; oriri, quæ non facile sanescunt, nisi si multa signa bonæ ualitudinis subsecuta sunt.

Ex reliquis uero minime facile sanantur uirgines, aut hæ mulieres, quibus super tabem, menstrua suppressa sunt.

Cui uero sano subitus dolor capitis ortus est, dein somnus oppressit, sic ut sterat, neq; expergiscatur, intra septimum diem pereundum est, magis si eum alius citata non antecesserit.

Si palpebræ dormientis non coeunt, si album oculorum apparet. Quos tamē ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum.

At aqua inter cutem, si ex acuto morbo cœpit, ad sanitatem raro producit, utiq; si contraria his quæ supra posita sūt, subsequuntur, æque in ea quoq; tussis, spem tollit.

Item si sanguis sursum, deorsumq; erupit, aqua medium corpus impleuit.

T H E S E S T O T I V S

Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde oriuntur, deinde desinunt, deinde rursus affurgunt.

Hi quidem tutiores sunt, quam qui supra comprehensi sunt, si attenduntur, sed ferè fiducia secundæ ualitudinis opprimuntur.

Illud iure aliquis mirabitur, quomodo quædam simul & adfligant nostra corpora, & parte aliqua tueantur. Nam siue aqua inter cutem quem impleuit, siue in magno abscessu multum puris coijt, si simul id omne effudisse, æque mortiferum est, ac si quis sani corporis uulnere fractus exanguis est.

Articuli uero si sic dolent, ut super eos ex callo quædam tubercula innata sunt, nunquam liberantur, quæquæ eorum uicia uel in senectutem ab adolescentia peruenerunt, ut aliquando leniri possunt, sic nunquam ex toto finiuntur.

Morbus quoque comitialis, post annum quintum & uigesimum ortus, ægre curatur, multo quæ ægrius is qui post quadragesimum annum coepit, adeo ut in ea ætate aliquid in natura feri, uix quicquam in medicina sit.

In eodem morbo si simul totum corpus afficit, neque ante in partibus aliquis uenientis mali sensus est, sed homo ex improviso concidit, cuiuscunque is aetatis est, uix senescit.

Si uero aut mens laesa est, aut nervorum facta resolutio, medicinae locus non est.

Deiectionibus quoque si febris accessit, si inflammatio iecinoris, aut praecordiorum, aut uentris, si immodica sitis, si longius tempus, si aluus uaria, si cum dolore est, etiam mortis periculum subest, maximeque si inter haec tormina uetera esse coeperunt.

Isque morbus maxime pueros absorbit, usque ad annum decimum.

Ceterae aetates facilius sustinent.

Mulier quoque grauida eiusmodi casu rapi potest, atque etiam si ipsa conualuit, partum tamen perdit.

Quinetiam tormina ab atra bile orsa, mortifera sunt, aut si sub his extenuato iam corpore subito nigra aluus profluxit, aut intestinorum lenitas.

Periculosior est, si frequens deiectio est, si uenter omnibus horis & cum somno & sine hoc profluit.

Si similiter noctu & interdium, si quid

EXCER

T H E S E S T O T I V S

excernitur, aut crudum est, aut nigrū, & præter id etiam leue, & mali odoris sit, si tūc urget, si post portionem urina non red datur, quod euenit, quia tunc liquor omnis non in uesicam, sed in intestina descē dit, si os exulceratur, si rubet facies, et qua si maculis quibusdam colorum omniū distinguitur, si uenter est quasi fermenta tus, pinguis atq; rugosus, si & cibi cupidi tas molesta est. Inter quæ cum euidentis mors sit, multo euidentior est, si iam in longinquum quoq; id uitium est, maxi me etiam si in corpore simul est, si uero in tenuiore intestino morbus est, uomi tus, singultus, neruorum distentio, deliri um, mala sunt.

At in morbo arquato durum fieri ie cur, periculosissimum est.

Quos liens male habet, si tormina præ henderunt, deinde inuersa sunt, uel in a quam inter cutem, uel in intestinorum le uitate, uix ulla medicina periculo sub trahit.

Morbus intestini tenuioris, nisi resolu tus est, inter septimum diem occidit.

Mulier ex partu, si cum febre uehemen tibus etiam & assiduis capitis doloribus præ

præmitur, in periculo mortis est.

Si dolor atq; inflâmatio est in his partibus, quibus uiscera continentur, frequenter spirare signum malum est.

Si sine caussa longus dolor capitis est, & in ceruices & scapulas transit, rursusq; in caput reuertitur, aut à capite ad ceruices, scapulasq; peruenit, perniciosus est, nisi uomitam aliquam excitauit, sic, ut pus extuffiretur, aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit, aut nisi in capite multa prurigo, totôue corpore pustulæ ortæ sunt.

Aequè magnum malum est, ubi torpor atq; prurigo peruagantur, modo per totum caput, modo in parte, aut sensus alicuius ibi quasi frigoris est, eaq; ad summam quoq; linguam perueniunt.

Et cum in iisdem accessibus auxilium sit, eò difficilior sanitas est, quo minus sæpe sub his malis illi subsequuntur.

In coxæ uero doloribus si uehemens torpor est, frigescit crus & coxa, aluus nisi coacta, non reddit, idq; quod excernitur, mucosum est, iamq; ætas eius hominis quadragesimum annû excrescit, is morbus erit longissimus, minimeq; annuus, neq; finiri poterit, nisi aut uere aut autumno.

THESES TOTIVS.

Difficilis æque curatio est, in eadē aetate, ubi humerorum dolor, uel ad manus peruenit, uel ad scapulas tendit, torpor, remq; & dolorem creat, neq; bilis uomitu leuatur.

Quacunq; uero parte corporis membrum aliquod resolutum est, si neq; mouetur & emacrescit, in pristinū habitum non conuertitur, eoq; minus, quo uetustius id uicium est, & quo magis in corpore senili est. Omniq; resolutioni neruorum, ad medicinam non idonea tempora sūt, hyems & autumnus, aliquid separatim post, uere & æstate. Isq; morbus medioris uix sanatur, uehemens sanari non potest.

Omnis etiam dolor minus medicinæ patet, qui sursum procedit.

Mulieri grauidæ si subito mammae emarcuerunt, abortus periculum est.

Quæ neq; peperit atque grauida est, si lac habet, à menstruis defecta est.

Quarrana æstiuā breuis, autumnalis ferè longa est, maximeq; quæ coepit hyeme appropinquante.

Si sanguis profluxit, deinde secuta est dementia, cum distentione neruorum,

periculum mortis est.

Itemq; si medicamentis purgatum, & adhuc inanem neruorum distentio oppressit, aut si in magno dolore extremæ partes frigent. Neq; is ad uitam redit, qui ex suspendio, spumate ore detractus est.

Alius nigra, sanguini atro, similis repentina siue cum febre siue etiã sine, hoc est, pernitiõsa est.

Cum nullum cõmune pestilentis morbi genus grassatur, sed dispersi, dissimilesq; fuerint morbi, ij magis q̃ reliqui omnes, hominem perimere solent.

D E P R A E S A G I I S E X
decubitu.

Deprehendendus est æger, in dextrũ, sinistrumue latus cubans, brachijs, ceruice, & cruribus paulum reductis, ac uniuerso corpore molliter affecto, qui ferè sani quoq; iacentis habitus est. Quippe cum optimus sit ille decubitus, qui à sanorum consuetudine non uariat. Lib Pres. 1. Aph 16.

Sed non laudatur decubitus, quo brachia, ceruix, & crura extenduntur. Aph. 17.

Id uero grauius est, si se ipsum eger cõtinere non ualens, ad pedes subinde delabitur.

Vbi

T H E S E S T O T I V S

Vbi pedes incidat, neq; ijs calor subest, ubi brachia, ceruicem, & crura inæqualiter dispergit, ac nudat, mali morbi ægriq; signum est.

Pernitiosum est, ubi hians quis assidue dormit, aut ubi supinus iacet, cruribusq; uehementer contortis, complicatisq;.

Si pronus iacet is, qui per bonam ualitudinem sic dormire consueuit, aut delirium, aut uentris dolorē portendit. Aph. uicesimo secundo.

Vbi residere uult æger, in ipso morbi uigore, malum quidem inditium est, in omnibus acutis affectibus, sed longe pessimū pulmonibus laborantibus. Aph. 23.

Stridor dentium per febres, præter cōsuetudinem à teneris contractam, insaniam significat, et mortē. Atqui ab utrisq; futurum periculum. Aph. 24.

Si uero iam deliranti stridor quoq; accedit, uix aliam æque perniciosam inuenies notam.

Ulcus siue ante, siue in ipso morbo natum est, obseruari debet. Nam si moriturus est homo, aridum, aut liuens, aut pallidum, ante mortem apparet. Aph. 25.

Ex matutina lotionē huiuscemodi no

tas perpende, in acutis febribus, in peri-
 pneumonia, phrenitide, capitis dolore,
 si quis eas faciei admouerit, ut inde quip-
 piam superuacui uenetur, aut festucas car-
 pat, aut à ueste floccas, aut à pariete pale-
 as auellat, omnes hæ malæ, letalesq; sūt.
 Aph. 26.

Spiritus frequens, aut doloris aut in-
 flammationis, in partibus septo transuer-
 so superioribus, indicium est: magnus &
 ex longis interuallis delirium declarat,
 frigidus ex naribus & ore prodiens, leta-
 lis admodum est. Aph. 27.

Facilis spiratio in acutis morbis qui-
 bus febris copulatur, quæq; intra 40. dies
 finiri solent, magnum habet ad salutem
 momentum. Aph. 28.

DE PRÆSAGIIS EX
 somno.

IN quo morbo somnus laborem facit,
 mortale, si uero iuuat, non mortale.

Hip. lib. 2. Aph. 1.

Vbi somnus delirium sedat, bonum.

Lib. 2. Aph. 2.

Somnus atq; uigilia, utraq; si modum
 excefferunt, malum. Aph. 3.

Somnus, uigiliæ, utraq; modum exce-
 den

THESES TOTIVS

dentia, morbus. Lib. 7. Aph. 68.

Quod ad somni rationem pertinet, quemadmodum sani etiam solent, interdium uigilare, noctu uero dormire oportet, à qua consuetudine si quis aberrauerit, peior erit somnus, qui inter quartam horam & noctem, quàm qui matutino tempore, ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neque noctu, neque interdium accedit, id enim uel ob dolorem, laboremque accidit, uel delirium futurum significat. Præf. lib. 1. Aph. 11, 12.

Plura uide titulo de præfagijs morborum in generali.

DE LASSITVDINE.

SPontaneæ lassitudines, morbos prænuntiant. Hip. lib. 2. Aph. 5.

In omni corporis motu ubi laborare cœperit, quies statim lassitudinem auferret. Lib. 2. Aph. 48.

Lassitudinem habentibus in febribus, in articulos, & circa maxillas potissimum abscessus fiunt, Lib. 4. Aph. 18.

Halycæ, anxietudo, oscitatio, horror, minimum æquale æquali potum, soluit ægritudinem. Lib. 7. Aph. Aph. 57.

De

DE SIGNIS MORTIS.

IN febris non intermittentibus, si partes exteriores frigidae, interiores uruntur, & sitim habeat, letale est. Lib. 4. Aph. 48.

In febre non intermittente, si labrum uel oculus, uel nasus, uel supercilium peruertatur, uel non uideat, uel non audiat, iam debili existente corpore, quicquid horum euenerit, mors proxima est. Lib. 4. Aph. 49.

Vbi in febre non intermittente, difficultas spirandi, & delirium letale. Lib. 4. Aph. 50.

In quo morbo somnus laborem facit, mortale, si uero iquat, non mortale. Lib. 2. Aph. 1.

De malis praesagijs & tamen non letalibus, uide in titulo de praesagijs morborum in generali.

Senibus qui longi morbi accidunt, maxima ex parte comitantur ad mortem. Lib. 2. Aph. 39.

Morbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis, uel infra, uel supra exierit, malum. Lib. 4. Aph. 22.

Difficultas intestinorum, si ab atra bile

le

THESES TOTIVS

le inceperit, letalis est. Lib. 4. Aph. 26.

A difficultate intestinorum habita, si ueluti carunculæ exeant, letale. Lib. quarto Aph. 26.

Si à febre habito, tumore non existente in faucibus, strangulatio repente super uenerit, letale. Lib. 4. Aph. 34.

Si à febre habito, collum peruertatur, & uix potest deuorare, sine ullo tumore letale.

Si rigor incidat, febre non deficiente, ægro iam debili, letale. Lib. 4. Aph. 46.

Conuulsio ex helleboro letalis. Libro 5. Aph. 1.

Conuulsio ex uulnere letalis. Libro. 7. Aph. 2.

Mulierem utero gerentem capi aliquo morbo acuto, letale est. Lib. 5. Aph. 5.

A tabe habito profluuium alui super ueniens, letale. Lib. 5. Aph. 14.

Qui tabe molestantur, si sputum quod extussunt, graue olet iniectum carbonibus, & capilli à capite defluunt, letale. Libro 5. Aph. 12.

Si mulieri grauidæ in utero sit erysipilas, letale. Lib. 5. Aph. 43.

Vesica discussa aut cerebro, aut corde,
aut

aut septo, aut aliquo ex tenuioribus intestinis, aut uentriculo, aut iecore letale est. Lib. 6. Aph. 18.

Quicumq; suppurati, aut aquam inter cutem patientes, uruntur aut secantur, si pus aut aqua uniuersim effluerit, omnes moriuntur. Lib. 6. Aph. 27.

Quicumq; sani, dolore capitis repente capiuntur, & statim muti fiunt, & stertunt, in septem diebus pereunt, nisi febris apprehenderit. Lib. 6. Aph. 51.

Oportet uero considerare oculorum in dormientibus suspensiones. Nam si aliquid album commissis palpebris subinspicitur, neq; ex alui profluuio, aut medicamenti potione istud contingat, malum est & letale ualde. Lib. 6. Aph. 52.

Desipientia quæ cum risu fiunt, securiores, quæ uero cum studio, periculosiores. Lib. 6. Aph. 53.

In morbis acutis frigus partium extremarum, malum. Lib. 7. Aph. 1.

A puris sputo phthisis & fluxus, cum uero sputum retinetur, moriuntur. Lib. 7. Aph. 16.

Ex medicamenti potione cõuulsio letalis. Lib. 7. Aph. 25.

T H E S E S T O T I V S

In febribus non intermittentibus, si exteriora frigent, interiora uruntur, & febres habeat, letale.

In febre non intermittente, si labrum, aut nasus, aut oculus, aut supercilium peruertitur, si non uideat, si non audiat, & iam debilis sit, quicquid horum fuerit, mors prope est.

Quibus cerebrum sphacelatum, id est, corruptum, in tribus diebus pereunt, si uero hoc euaserint, sani fiunt. Libro . 7. Aph. 39.

Præfagia mortis ex facie, uide titulo de facie.

Præfagia ex oculis, uide Oculus.

Præfagia ex decubitu, uide de decubitu.

Præfagia lethalia ex sudore, uide sudor.

Præfagia ex præcordijs, uide præcordia.

Præfagia ex hydrope, ex somno, ex excrementis alui, ex urinis, uomitu, sputo, suppuratione, obsessibus, uesica, uide subtilis eorundem.

Multa præfagia mortis, uide sub titulo de præfagijs morborum in generali, & in

Inibi ex Cornelio Celso quædam.

EXSORANO DE SIGNIS
 nis letalibus.

Capitis dolor si fuerit, & tumor in facie subito nascitur sine ullo dolore; & si sinistra manu & in pectore suprascriptus fuerit tumor, & si nares sibi assidue scalpet, uicesimo tertio die morietur.

Phrenetico, si ambo genua rosea facta fuerint solida cum inflammatione, ipsa die morietur.

Oris uicia si fuerint nara, & buccæ in labore fuerint, & in collo uenæ sint extensæ, & papulæ fuerint super ipsas uenulas perubeas, uel albæ natæ fuerint, uel somnus tardus fuerit, & lauacrum desiderauerit, uel uaporem calidum, quinquagesimo secundo die moritur. Affectio hæc infestat illos qui satis calide amant lauare.

Vuæ cui uicia fuerint, si sub lingua papula apparuerit, instar pediculi porcini, & lauacrum siue uaporem desiderauerit, in ipsa passione morietur.

Febrientibus acutæ si inter duos digitos in manu tumor, niger in modum horribilæ uisus fuerit, & si dolor erit ab initio

hæc ægri

T H E S E S T O T I V S

ægritudinis, & lauacrum affectauerit, tertio die discedet.

Stomachus cui doluerit & acute febrerit, si in dextro pede pustula ei nascatur acerrima, & nullum desiderium habuerit, uicesimo secundo die morietur.

Peripneumoniaco si ungues de pollice manus nigrescunt, & in fronte papula sanguinea nata fuerit, & sternutatur frequenter, septimo die morietur.

Epar cui doluerit, si in collo eius natae papulae fuerint, quatuor iunctae unius coloris, & pollice pedis pruritus fuerit, & urina ueluti sanguinea exierit, intra septem dies morietur.

Ventris dolore si quis fuerit tortus, & in supercilium eius papula in modum auellanae colore atro infra cilio, intra quatuor dies morietur.

Choleribus quis laborans, si iuxta umbilicum ei natae fuerint tres papulae in modum ciceris, una alba, alia rubea, tertia subliuida, eadem die morietur.

Splenetico si furunculi multi in sinistra manu nati fuerint, & per nares sanguis quasi spumofus fluxerit, duodecimo die morietur.

Schizæ

Schiæ, coxendicisq; dolor si fuerit alicui, si in sinistra parte rubor spissus sit, & sine labore, & olera cocta desiderauerit, uicesimo quinto die morietur.

Dysentericus si post aurem sinistra papula in modum orbi nata fuerit, cum siti admodum frequente, uicesimo die morietur.

Sauia ex quacunq; causa excreantibus, si maculae ei natae fuerint, sicut solet per omne corpus instar Aegyptiae fabae, eadem die morietur.

Iteraneis causis qui laborant, si papula dura in aurem ei nata fuerit albo colore, & uenter abundans fuerit, uicesimo die morietur.

Intestinum cadés si cui doluerit, quod medici radicem dicunt, & dexter cubitus ei liuidus fuerit, & uinum satis desiderauerit, quinto die morietur.

Vesicae dolor cui fuerit, si sub axilla sinistra papula seu pustula nascitur, & quasi uideat grauitate dormire, decimo quinto die morietur.

Dysuria, hoc est, urinae difficultas cum infestari, si in sinistram aurem furunculi in modum lenticulae q̄ plures nati fuerint,

T H E S E S T O T I V S

rint, & in ipsa ægritudine oculos sibi fortiter fricauerit, undecimo die morietur. 1

Sanguinem reiicientibus si in guttore eorum ordio laniati fuerint, uel de ore eius salina, per mentum descendit, uicesima die morientur.

Hemorrhoidas habentes, si in plantis eius pustulæ multæ, nigro colore suffusæ suboriantur, uicesimo octauo die morientur.

Pustulas habentes & uulnera, aut fistulas, aut antheromata, uel quælibet apostemata, si supra ceruicem, aut supra umbilicum, aut iuxta cor, uel iuxta mammillam populæ in modum lenticulæ multæ eis natae fuerint, & dulcem cibum desiderauerint, quadragesimo die morientur.

D E A L V O D V C E N D A.

In perturbatione uentris & uomitibus spontinis, si talia purgentur qualia purgari oportet, confert & leniter ferunt, si minus contra, sic & uasorum inanitio, si talis fiat qualis fieri debet, confert & bene tolerant, si minus contra. Inspecere autem oportet regionem & tempus, & ætatem, & morbos, in quibus conueniat
aut

*Non autē
de quantitate loquitur, sed de
qualitate.*

aut non Hip. Lib. 1. Aph. 2.

Q V A N D O E X P E D I A T
euacuare.

Habitus exercitatorum, qui ad sum-
mum bonitatis attingunt, periculo-
si, si in extremo constiterunt, neque enim
possunt in eodem permanere, neque quie-
scere. Cum uero non quiescant, neque pos-
sunt proficere in melius, reliquum est igitur
ut decidant in deterius. His de causis
bonum habitum statim soluere expedit,
ut corpus rursus nutrire incipiat, neque
compressiones ad extremum ducendæ,
periculosum enim Sed qualis natura fue-
rit eius, qui debet perferre, ad hoc ducere
conuenit. Sic & euacuationes quæ ad ex-
tremum deducuntur, periculosæ. Et rur-
sum refectioes cum extremæ fuerint, pe-
riculosæ. Hip. Lib. 1. Aph. 3.

*Post huius
tituli lectio-
nem, cōsue-
le tit. de ex-
cremētis ab-
ut, nam ad
eandem rē
facit.*

Quæ ducere oportet, quo maxime na-
tura uergit, per loca conferentia eò ducere,
Lib. 1. Aph. 21.

Concocta medicari, atque mouere, non
cruda, modo non turgeant, plurima ue-
ro non turgent. Lib. 1. Aph. 22.

Deiectiones non multitudine sunt æ-
stimandæ, sed si talia deiciantur, qualia
h 4 con

THESES TOTIVS

conueniunt, & ægri facile tollerant. Atq; ubi usq; ad animi defectionē expedit durere faciendum, si æger possit tollerare.

Lib. 1. Aph. 24.

In acutis passionibus raro, & in principijs medicinis purgantibus uti, & hoc cū præmeditatione faciendum. Aph. 24.

Si qualia oportet purgari, purgentur, confert, & facile ferunt, si contra, difficulter. Aph. 25.

Quæ iudicantur & iudicata sunt, integræ, neq; mouere, neq; mouere aliquid, siue medicamentis, siue aliter irritando, sed sinere. Aph. 30.

Corpora cum quippiam purgare non uerit, oportet fluida facere. Lib. 2. Aph. 9.

Quibus iuuenibus adhuc aluus humecta est, his senescentibus exiccatur. Quibus uero iuuenibus adhuc aluus sicca est, his senescentibus, humectatur. Lib. 2. Aph. uicesimo.

Quicumq; morbi ex repletione fiunt, curat euacuatio, & quicumq; ex euacuatione, repletio, & aliorum contrarietas. Li. 2. Aph. 22.

Cum morbi inchoant, si quid mouendum uidetur, moue, cum uero consistunt

acutigent, melius est quietem habere. Li.
2. Aph. 29.

Qui salubritatem corporis habent, per
medicamenta euacuati, cito exoluuntur,
& qui prauo utuntur cibo. Lib. 2. Aph. 36.

Qui bene habent corpore, difficulter
ferunt medicationes. Lib. 2. Aph. 37.

Plurimum atq; repente euacuare uel
replere, uel calefacere, uel refrigerare, si-
ue quouis alio modo corpus mouere, pe-
riculosum. Quoniam omne nimis, natu-
ræ est inimicum. Sed quod paulatim fit,
tutum est, tum aliàs, tum cum ab altero
ad alterum transitus est. Lib. 2. Aph. 51.

In medicationibus talia educere cor-
pore, qualia & sponte prodeunt utilia,
quæ uero contrario modo prodeunt, co-
hiberi oportet. Lib. 4. Aph. 2.

Si qualia oportet purgati, purgentur,
confert, & leuiter ferunt, contraria uero
grauiter. Lib. 4. Aph. 3.

Medicari æstate superiores magis, hy-
eme uero inferiores. Lib. 4. Aph. 4.

Sub cane & ante canem, difficiles sunt
medicationes. Lib. 4. Aph. 5.

Graciles & facile uometes purgare su-
perius, cauentes hyemem. Lib. 4. Aph. 6.

T H E S E S T O T I V S

Vomentes uero difficulter, & medio-
criter bene carnosos, per inferiora cau-
entes æstatem. Lib. 4. Aph. 7.

Melancholico plenius inferiores, ea-
dem ratione contraria apponentes. Lib.
4. Aph. 9.

Tabidos uero, cauentes ad superiores
purgationes. Lib. 4. Aph. 8.

Medicari in ualde acutis, si materia tur-
get, eadem die, tardare enim in talibus,
malum est. Lib. 4. Aph. 10.

Quibus tormina & circa umbilicum
labores, & lumborum dolor, qui neq; à
medicamento, neq; aliter soluitur in æ-
quam inter cutem siccam firmatur. Lib. 4
Aph. 11.

Quorum alui intestinorum leuitate la-
borant, hyberno tempore supra purgari,
malum. Lib. 4. Aph. 12.

Ad helleboros qui nõ facile supra pur-
gantur, eorum corpora ante potionem plu-
ri cibo, atq; quiete humectanda sunt. Lib.
4. Aph. 13.

Cum biberit quis helleborum, ad mo-
tiones quidem corporum ducere magis,
ad somnos uero atq; quietem, minus.

Cum uolueris magis ducere hellebo-
rum

rum, moue corpus. Cum uero sistere so-
 mnium facito, & non moueto. Libro. 4.
 Aph. 15.

Carnes sanas habentibus helleborus
 periculosus, facit enim conuulsionem.
 Lib. 4. Aph. 16.

Si quis febrem non habens, abstinue-
 rit à cibo & cordis morsum seu uertiginē
 patitur, & oris amaritudinem sentit, pur-
 gatione indigere, per superiora signifi-
 cat. Lib. 4. Aph. 17.

Qui in medicamentis purgati non si-
 tiunt, non quiescant, priusq; sitiant.
 Lib. 4. Aph. 19.

Non febricitantibus si tormina accide-
 rint, & genuum grauitas, & lumborum
 dolor purgari inferius significatur. Lib. 4.
 Aph. 20.

Supra præcordia dolores purgatione
 indigere, per superiora significat. Quæ-
 cunq; uero inferiora molestant, per infe-
 riora. Lib. 4. Aph. 18.

Deiectiones nigræ qualis est sanguis
 niger, sponte uenientes, si cum febre, siue
 sine febre fiant, pessimæ, & quanto colo-
 res magis prauis fuerint plures, peius. Cū
 medicamento uero melius, & quāto co-
 lo-

THESES TOTIVS

fores plures, non pravi. Lib. 4. Aph. 21.

De deiectionibus nigris & melancholicis, uide plura, titulo de excrementis alui.

A tabe habito, profluvium alui superueniens, letale. Lib. 5. Aph. 14.

Quibusdam uenæ sectio uel purgatorium in medicamento conuenit, hos uere purgare, uel uenam incidere oportet. Lib. 6. Aph. 47.

Corpora oportet, ubi quis purgare uoluerit, fluida facere, et si supra sistere aluū, si uero infra, humectare.

DE ALVO DUCENDA

ex Raze & Damasceno.

Quomodo nulla est conueniētia inter aquam & calorem naturalem, ita non est ducenda aluus, nisi medicina quę absit non procul à temperamento.

Timendum est enim ne abhorrens etiam naturæ reijciat, & non misceatur humoribus.

Oportet ergo ut ad repurgandos humores in similitudinem sibi conuertatur medicina, per ingenium, ut naturam eā recipiat apte, & receptam per uenas deferat.

rat. Ita enim fiet, ut cōfortata, inimicum suum facilius expellat. Nam si in qualitate fortior fuerit, deficit natura, non contrariatur ei.

Ante uero purgationem per aliquot dies humores commouendi sunt cū medicina cibali, & sic cum presentis diei abstinentia sunt purgandi.

Ad nimiam etiam humiditatem humorum in stomacho, subtilem puluerē damus, ad intestina uero mollienda nō nunq̄ clysterem iniicimus.

Stomacho humoribus grauato, pilulæ etiam paruæ & recentes, humidæ ministrari possunt, sed à sumptione paululū inambulare, & sese mouere conuenit.

Qui 40. annos habet, aut plures in medicina eorum non est insistendum, quod choleram rubeam purget, quia ipsa per se natura id facit, & humectatio corporis fundamentum est.

Principalia membra, defecta habentes, ne nimis acutas medicinas sumant, sed in temperamento consistant.

Duæ species simul mixtæ, necessario quælibet reddit suum effectum.

Vnde in purgâdo capite, si forte sit for
ti

T H E S E S T O T I V S

ti utendum est medicina.

Pueri et senes etiam pleni humoribus,
non tamen debent solui fortiter, tempe-
rate itaq; procedendum.

E X C O R N E L I O

Celso. Lib. 2. Cap. 11.

DEiectionem antiqui uarijs medica-
mentis, crebraq;alui ductione in o-
mnibus uere morbis moliebantur, da-
bantq; aut nigrum ueratrum, aut feliculā,
aut squammas æris, quam *λεπίδοχαλκόν*
Græci uocant, aut lactucæ marinæ lac, cu-
ius gutta pani adiecta abunde purgat.

Aut lac uel asininum uel bubulum, uel
caprinum, eiq; salis paulum adijciebant,
decoquebantq; id, & sublatis his, quæ co-
ierant, quod quasi serum supererat, bibe-
re cogebant.

Sed medicamenta stomachum ferè læ-
dūt, ideoq; omnibus catharticis aloë mi-
scenda est.

Aluus si uehementius fluit, aut sæpius
ducitur, hominem infirmit.

Ergo nunq; in aduersa ualitudine me-
dicamentum eius rei causa recte datur,
nisi ubi is morbus sine febræ est.

Ut cum ueratrum nigrum, aut attra bis-
le

le uexatis, aut cum tristitia insanientibus,
aut ijs quorum nerui parte aliqua resolu-
ti sunt, datur.

At ubi febres sunt, satius est eius rei cau-
sa cibos, portionesq; assumere, qui simul
& alant, & uentrem molliant.

Suntq; ualetudinis genera, quibus ex
lacte purgatio conuenit. Plarumq; uero
alius portionibus ducenda est, quod ab
Asclepiade quoq; sic temperatum, ut ta-
men seruatum sit, uideo plarumq; saecu-
lo nostro praeteriri.

Est autem ea moderatio, quam is se-
quutus uidetur aptissima, ut neq; saepe ea
medicina tentetur, & tamen semel sum-
ptum, uel bis, aut omittatur.

Si caput graue est, si oculi caligant, si
morbus maioris intestini est (quod Grae-
ci κόλωρ nominant) si in imo uentre, aut
in coxa dolores sunt, si in stomachu que-
dam biliosa concurrunt, uel etiam pirui-
ta eos, horum uel aliquis similis confert, si
spiritus difficiliter redditur, si nihil per se
uenter excernit, utiq; si iuxta quodq; ster-
cus est, et intus remanet, aut si stercoreis o-
dorem nihil deiciens eger, ex spiritu suo
sentit, aut si corruptum est, quod excerni

T H E S E S T O T I V S

tur, aut si prima in ædia febrem non sustulit, aut si sanguinem mitti, cum opus sit, uires non patiuntur, tempusue eius rei præterit, aut si mulrum ante morbum aliquis potauit, aut si is qui sæpe uel sponte, uel casu purgatus est, subito habet aluam suppressam.

Seruanda uero illa sunt. ne ante diem tertium ducatur, ne ulla cruditate substāte, ne in corpore infirmo, diuq̄ in aduersa ualitudine exhausto, neue in ea, cui factis aluus reddit quottidie, quiue eam liquidam habet, ne in ipso accessionis impetu, quia quod tum infusum est, aluo continetur, regeſtumq̄ in caput multo grauius periculum efficit.

Pridie uero abstinere debet æger, ut aptus tali curationi sit. Eodem die ante aliquod horas aquam calidam bibere, ut superiores eius partes madescant, tum deicienda aluus est, si leui medicina contenti sumus, pura aqua, si paulo ualentiori, mulsa, si leni ex aqua, in qua fœnum græcum, uel prifana uel malua decocta sit, si reprimendi caussa ex uerbis.

Acris autem est marina aqua, uel alia sale adiecto, atq̄ utraq̄ decocta, commodior est.

Acrior si adiectio uel oleo uel nitro uel melle quoq.

Si acrior est, eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur.

Id quod infunditur, neq. frigidum esse oportet, neq. calidum, ne alterutro modo laedat.

Cum infusum est, quantum fieri potest, continere se in lectulo debet æger, ne primæ cupiditati deiectionis protinus cedere.

Vbi necesse est, tum demum desiderare. Fereq. eo modo dempra materia, superioribus partibus leuatis, morbum ipsū mollit.

Cum uero, quotiens rem coegit, descendendo aliquis se exhaust, paulisper debet cōquiescere, & ne uires deficiat, utiq. eo die cibū assumere, qui plenior an exiguus sit dandus, ex ratione eius accessionis, quæ expectabatur, aut in metu non erit, æstimari oportebit.

Cum medicamentum aliquis ebibit, mox prisana sorbitioni danda est, nō minori pene quantitate, quàm consuevit, nisi consuetudo rationi aduersetur. Hip. Li. 3. de ratione uictus in morbis acutis.

THESES TOTIVS

In media purgatione tantum sorbendum est, sed ubi ad purgationis finem deventum est, sorbitio detur, minor tamen quam pro consuetudine.

DE ALVI PROFLUVIIS.

In longis leuitatibus intestinorum, si fructus acidus fiat, qui prius non erat, signum bonum. Lib. 6. Aph. 1.

A longo alui profluvio, spontaneus vomitus superueniens, morbum soluit. Lib. 6. Aph. 15.

A morbo laterali uel pulmonia habito, alui profluvium adueniens, malum. Lib. 6. Aph. 16.

Vide supra, titulo de aluo, ducenda plura ad eandem rem.

Lippientem alui profluvio corripit, bonum. Lib. 6. Aph. 17.

Balbi ab alui profluvio maxime capiuntur. Lib. 6. Aph. 32.

Qui alba pituita detinetur, si fortis uentris fluxus superuenerit, a morbo liberatur. Lib. 7. Aph. 29.

Quibus in alui profluvijis excrementa spumosa sunt, his ex capite pituita defluit.

De

DE HELLEBORO ET
eius usu.

AD helleboros qui non facile supra purgantur, eorum corpora ante positionem pluri cibo atq; quiete humectanda sunt. Lib. 4. Aph. 13.

Cum biberit quis helleborum, ad motiones quidem corporum ducere magis, ad somnos uero atq; ad quietem minus. Indicat autē nauigatio turbare motionē corpus. Lib. 4. Aph. 14.

Cum uolueris magis ducere helleborum, moue corpus. Cum uero sistere, somnum facito, & non mouero. Libro. 4. Aph. 15.

Carnes sanas habentibus helleborus periculosus, facit enim conuulsionem. Lib. 4. Aph. 16.

Veratro & peplo si uti libuerit, daucus uel aniso, uel seseli, uel cumino, uel alio quopiam quod odoris iucundi sit, corrigere oportebit. Hip. lib. 2. de ratione uictus in morbis acutis.

Veratro purgare oportet eos, quibus a capite destillatio fertur. Quibus uero uel abscessus, uel uenæ ruptura, uel intemperantia, uel aliqua alia uehemens cū sup

THESES TOTIVS

putatione fecit, his ueratum hand quā
dādum est, quippe quod tum nihil præ
sidiij adfert. Lib. 4. eodem titulo.

DE DYSENTERIA.

IN profluuijs alui mutationes excremē
torum iuuant, nisi ad multa mutatio fi
at. Hip. Lib. 2. Aph. 14.

DE ALVI EXCREMEN tis.

IN profluuijs alui mutationes excremē
torum iuuant, nisi ad mala mutatio fi
at. Hip. Lib. 2. Aph. 14.

Urinæ & alui excrementa, & sudores
quæcunq; apparuerint, uel bonam mor
borum indicationē, uel malam, uel bre
ues aut longos fore morbos ostendunt.
Lib. 1. Aph. 12.

Vbi fauces ægrotant, aut tubercula na
scuntur, in corpore excretiones inspicere
oportet. Nam si biliosæ fuerint, corpus
nua ægrotat, si uero similis sanis, tutū est
corpus nutrire. Lib. 2. Aph. 15.

Eorum quæ uniuersim & uelociter na
triunt, ueloces quoq; sunt excretiones.
Lib. 2. Aph. 18.

Deiectiones nigræ, qualis est sanguis
niger sponte uenientes, siue cum febre, si
ue

ue sine febre, pessimæ, & quanto colores magis prauī, plures peius, cum medicamento uero melius, & quāto colores plures non prauī.

Morbis quibuslibet incipientibus, si atra bilis, uel supra uel infra exierit, letale. Lib. 4. Aph. 22.

Quibuscunq; ex morbis acutis aut diurnis, uel ex uulneribus, siue quouis alio modo extenuatis, nigra bilis, siue uti sanguis niger desuper exierit, postridie moriuntur. Lib. 4. Aph. 23.

Difficultas intestinorum si ab atra bile inceperit, letalis est. Lib. 4. Aph. 24.

Sanguis quidē supra qualiscunq; fuerit malus, infra autē bonus est. Li. 4. Aph. 25.

A difficultate intestinorū habito, si ueluti carūculæ exeūt, letale est. Li. 4. Aph. 26.

Quibus in febribus sanguinis fluxerit multitudo, quacunq; ex parte cū reficiuntur alui his humectantur Lib. 4. Aph. 27.

Quibus biliosæ deiectiones superueniente surditate cessant, & quibus surditas superuenientibus biliosis deiectionibus cessant. Lib. 4. Aph. 27.

Excretiones in febribus non intermittentibus liuidæ, cruentæ, scetidæ, omnes

T H E S E S T O T I V S

malæ, & biliofa, & si bene exeūt, siue per alui excretionem, siue per urinas, bonæ, si uero non aliquid eorum quæ iuuant, per hæc loca excernitur, malum. Libro 4. Aph. 47.

Deiectiones non multitudine sunt æstimandæ, sed si talia deijciantur, qualia conueniunt, & ægri facile tollerant. Atq; usq; ad animi defectionem expedit durere, faciendum si æger possit tollerare.

Quibus deiectiones si stare permiseris, & non moueris, ueluti strigmēta subsistant, & si pauca, paucus est morbus. Et si multa, multus. Hic confert purgatio alui, q; si aliud non purgata dederis forbitiones, quanto plures dederis, tanto magis nocebis.

Alui excremēta inter bona inditia sūt, si mollia, si figurata sunt, si eodem ferè tēpote, quo, in secunda uoletudine deijci solebant, excernuntur, si his quæ ingerūtur, proportionē respondent, utpote que inferiorem uentrem recte ualere declarant. Præf. Lib. 2. Aph. 13.

Si uero liquida fuerint, præstat ut sine stridore, neq; frequēter, neq; ex breuibus interuallis deijciantur. Etenim fatigatur æger

eger, si crebro surgit, uigilijsq; consumi-
tur, cum uero affatim saepeq; deijcit, ne as-
nimus eius deficiat, periculū est. Aph. 14.

DE ALVI CONSTRI-
ctione.

IN longis difficultatibus intestinorum
in aēdiā ex fastidio malum, & cum fe-
bre peius. Lib. 6. Aph. 3.

Vide supra in titulo, Alui profluuium.

Et titulo, de aluo ducenda.

A furore difficultas intestinorum, uel
aqua inter cutem, uel mentis alienatio,
bonum. Lib. 7. Aph. 5.

In morbo diuturno, fastidium cibi, &
deiectiones syncerae, malum. Lib. 7. Aph.
sexto.

A deiectione syncera, difficultates inre-
stinorum. Lib. 7. Aph. 73.

Ab alui profluuiio, difficultas intestino-
rum. Lib. 7. Aph. 72.

A difficultate intestinorum, leuitas in-
testinorum superuenit. Lib. 7. Aph. 73.

DE PHEBOTOMIA.

Qui in iuuentute plurimum sangui-
nem per phlebotomiam eijcere sūt
conlueri, eorum natura post sexa-
ginta annos in frigus resoluitur, & suffo-

T H E S E S T O T I V S

atur in eis naturalis calor, maxime uero si frigida fuerint complexiones. Dam.

Habitantes in quarto aut sexto clima te plus minuere sanguinem expedit, quã in septimo aut primo, secundo uel tertio: Dam.

C O R N E L I V S C E L S V S

Lib. 2. Cap. 9.

Sanguinem incisa uena mitti, nouum non est, sed nullum pene morbum esse, in quo non mittatur, nouum est.

Item mitti iunioribus & sceminis utrum non gerentibus, uetus est.

In pueris uero idem experiri, & in senioribus & in grauidis quoque mulieribus, uetus non est, siquidem antiqui, primam ultimamque ætatem sustinere non posse, hoc auxilij genus iudicabant, persuaseruntque sibi mulierem grauidam, quæ ita curata esset, abortum esse facturam.

Postea uero usus ostendit, nihil ex his esse perpetuum, aliasque potius obseruationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat.

Interest enim non quæ ætas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quæ uires sint. Ergo si iuuenis imbecillis est, aut

si mulier (quæ grauida non est) parum ualeat, male sanguis emittitur. Emoritur enim uis, si quæ supererat, hoc modo erupta est. At firmus puer & robustus senex & grauida mulier ualens, tuto curantur.

Maxime tamen in his medicus impeditus falli potest, quia ferè minus roboris illius ætatibus subest.

Mulieriq; prægnanti post curationem quoq; uiribus opus est, nõ tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum.

Non quid quid aut intentionem animi, aut prudentiam exigit, protinus faciendum est, cum præcipua in hoc ars sit, quæ non annos numeret, neq; conceptione solam uideat, sed uires æstimet, & ex eo colligat, possit nec ne superesse, quod uel puerum uel senem, uel in una muliere duo corpora simul sustineat.

Interest enim inter ualens corpus & obæsum, inter tenue & infirmum.

Tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat.

Facilius itaq; illi detractionem eiusmodi sustinent, celeriusq; ea si nimium est, pinguis adfligitur.

Ideoq; uis corporis melius ex uenis, q̄

THESES TOTIVS

ex ipsa specie æstimatur. Neq; enim solū hæc consyderanda sunt, sed etiam morbi genus, quod sit. Vtrum superas an deficiens materia læserit, corruptū corpus sit an integrum.

Nam si materia uel deest, uel integra est, istud alienū est. At si uel copia sui male habet, uel corrupta est, nullo modo melius succurritur.

Ergo uehemens febris, ubi rubet corpus, plenæq; uenæ tument, sanguinis deractionem requirit.

Item uiscerum morbi, neruorumq; resolutio, & rigor & distētio, quicquid deniq; fauces difficultate spiritus strāgular, quicquid subito supprimit uocem, quisquis intollerabilis dolor est, & quacunq; de causa ruptum aliquid intus atq; collisum est.

Itē malus corporis habitus, omnesq; acuti morbi, qui modo (ut supra dixi) nō infirmitate, sed onere nocent.

Fieri tamen potest, ut morbus quidem id desyderet, corpus autem uix pati posse uideatur.

Sed si nullum tamen appareat aliud auxilium, periturusq; sit qui laborat, nisi tēme

temeraria quoque uia fuerit, adiutus in hoc statu, boni medici est ostendere, quam nulla spes, sine sanguinis detractioe sit, fateatur quantum in hac ipsa re metus sit. Et tunc demum si exigatur, sanguinem mittere. De quo dubitare in eiusmodi re oportet.

Satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. Idque maxime fieri debet, ubi nerui resoluti sunt, ubi subito aliquis obmutuit, ubi angina strangulatur, ubi prioris febris accessio pene confecit, paucemque subsequi uerisimile est, neque eandem uidentur sustinere aegri uires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est.

Neque enim semper concoctionem res expectat.

Ergo si ex superiore parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem uomit, quamuis paulo ante sumpsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne si subsederit, corpus affligat. Idemque etiam in alijs casibus repentinis qui strangulabant, dictum erit.

At si morbi ratio patiatur, tum demum nulla cruditatis suspitione remanente id fiet.

Ideo

THESES TOTIVS

Ideoq; ei rei uidetur aptissimus aduersa
sæ ualentini dies secundus aut tertius.
Sed ut etiam aliquando primo die san-
guinem mittere necesse est, sic nunquam
utile post diem quartum est, cum iã spa-
tio ipso, materia & exhausta est, & cor-
pus corrumpit, ut detractio imbecillum
id facere possit, non possit integrum,

Quòd si uehemes febris urget, in ipso
impetu eius sanguinem mittere, hominẽ
iugulare est.

Expectanda ergo remissio est, si nõ de-
crescit, sed crescere desijt, neq; speratur re-
missio, tunc quoq; quamuis peior, sola
tamen occasio non omittenda est.

Ferè etiam ista medicina ubi necessa-
ria est, in biduum diuidenda est.

Satius est enim, primo leuare ægrum,
deinde perpurgare, quã simul omni ui ef-
fusa fortasse præcipitare.

Quòd si in cura quoq; aquæ, quæ inter-
cutem est ita respondet, quãto magis ne-
cesse est in sanguine respondeat?

Mitti uero is debet, si totius corporis
caussa fit ex brachio, si partis alicuius, ex
ea ipsa parte, aut certe quã proxima, quia
nõ ubiq; mitti potest, sed in temporibus,

in brachijs, iuxta talos.

Nec ignoro quosdam dicere, quod longissime inde, ubi lædit, esse mittendum. Sic enim auerti materiæ cursum, at illo modo in id ipsum quod grauat, euocari. Sed id ipsum falsum est, proximū enim locum primo exhaurit. Ex ulterioribus autem sanguis eatenus sequitur, quatenus emittitur, ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne uenit quidem. Videtur tamē usus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem mittendum esse.

Si quod in humero uicium est, ex altero brachio, credo, quia si quid parū cesserit, oportuniores hæ partes iniuriæ sunt, quæ iam male habent.

Auertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorumpens, alia emittitur. Desinit enim fluere qua uolumus, inde obiectis quæ prohibeant, alio dato itinere.

Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum, usum habenti, cum ignaro difficillimum est. Iuncta enim est uena arterijs, his nerui. Ita si neruum scapulum attingit, sequitur neruorum distētio,

T H E S E S T O T I V S

ea quæ hominem crudeliter consumit.

At arteria incisa, neq; coit, neq; sanescit, interdum etiam ut sanguis uehementer erumpat, efficit. Ipsius quoq; uenæ (si forte præcisa est) capita, comprimuntur, neq; sanguinem emittunt.

At si timide scapellus demittitur, summam cutem lacerat, neq; uenam incidit.

Nonnunq; etiam ea latet, neque facile reperitur, Ita multæ res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est.

Incidenda ad medium uena est, ex qua cum sanguis erumpit, colorem eius, habitumq; oportet attendere. Nam si is crassus & niger est, uiciosus est, ideoq; utiliter effunditur.

Si rubet & pellucet, integer est. Eaque missio sanguinis, adeo non prodest, ut etiam noceat, protinusq; is supprimendus est.

Sed id euenire non potest sub eo medio, qui scit ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut æque niger assidue ac primo die profluat. Quamuis ita est, tamen si iam satis fluxit, supprimendus est. Semperq; ante fenis faciendus est, quæ anima deficiat. Deligandum

dumq; brachium superimposito expres-
so, ex aqua frigida panicillo, & postero
die aduerso medio digito uena feriēda,
ut recens coitus eius resoluatur, iterumq;
sanguinem fundat.

Siue autem primo siue secūdo die san-
guis qui crassus & niger initio fluxerat, et
rubere & pellucere cœpit, satis materiæ
detractum est, atq; quod superest, synce-
rum est. Ideoq; protinus brachium deli-
gandum, habendumq; ita est, donec ua-
lens cicatricula sit, quæ celerrime in uena
confirmatur.

DE SANGVINIS DE-
tractione per cucurbitulas.

Cucurbitularū uero duo genera sunt,
æneum et corneum. Aenea altera pa-
ret, altera clausa est. Cornea altera parte
æque patens, altera foramen exiguum.
In æneam linamentum ardens conijci-
tur, ac sic os eius corpori apratur, impi-
miturq; donec inhæreat.

Cornea per se corpori imponitur, de-
inde ubi ea parte, qua exiguum foramen
est, ore spiritus adductus est, superq; cæ-
ra cauum id clausum est, æque inhære-
scit.

Vtra-

T H E S E S T O T I V S

Vtraque non ex his tantum generibus, sed etiam ex quolibet alio recte fit.

Ac si cetera defecerunt, caliculus quoque pultarius oris compressioris ei rei commode aptatur.

Vbi inhaesit, si concisa ante scalpello cutis est, sanguinem extrahit, si integra est, spiritum.

Ergo ubi materia quae intus est, laedit, illo modo, ubi inflatio, hoc imponi solet.

Vsus autem cucurbitulae precipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua initium est, quae exhauriri ad confirmandam ualitudinem satis est. Idque ipsius testimonium, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur ab ea potissimum parte, quae iam laesa est, esse mittendum, quod nemo cucurbitulam diuersae parti imponit, nisi cum profusionem sanguinis eò auerit, sed ei ipsi quae dolet, quaeque liberanda est.

Opus esse cucurbitula potest in morbis longis, quamuis & ijs iam spatium alicquod accessit, siue corrupta materia, siue spiritu male habente.

In acutis quoque quibusdam, si & leuari

corpus debet, & ex uena sanguinē mitti, uires non patiuntur. Idq̄ auxiliū ut minus uehemens, ita magis tutum.

Neq̄ unq̄ periculosum est, etiam si in medio febris impetu, etiam si in cruditate adhibetur.

Ideoq̄ ubi sanguinem mitti opus est, si incisa uena, præceptum periculum est, aut si in parte corporis etiam uicium est, huc potius confugiendum est. Cum eo tamen, ut sciamus, hic ut nullum periculum, ita leuius præsidium esse, nec posse uehemēti malo, nisi æque uehemens auxiliū succurrere.

DE BALNEIS.

Balneum, & temperata potio, inuat causam & contrariū causæ. Dam.

De balneis uide plura titulo de sudore, & ibi ex Cornelio Celso pleraq̄.

EX HIPPOCRATE DE

ratione uictus in morbis acutis Libro tertio.

Balnei usus in plærisq̄ infirmitatibus confert, in alijs minime.

Sed raro homines eo bene utuntur, q̄ ipsa præparare nesciunt.

Quippe in paucis admodum domibus

T H E S E S T O T I V S

bus uel instrumenta, uel ministri apti inueniuntur, & nisi summa cura inter lauandum adhibeatur, haud mediocre prouenerit à lauacro malum.

In balneis tegmine indiget æger, cui fumus non accedat, item aquæ abundantia, & crebra lotionē, sed quæ non sit impetuosa, nisi res ipsa ita exigere uideatur.

De ueterum lauacris & eorum usu, uide Hippocratem loco citato.

Lauacro committendus non est, qui nuper uel sorbitionem uel potionē sumpsit.

Sed ne à lauacro quoq; ilico uel sorbere uel bibere conuenit.

Magnopere tamen laboranti indulgendum est, si cum bona adhuc ualitudine esset, uel amauit lauacrum, uel elui conuenit.

Qui maiore lauacri desyderio tenentur, ij maius inde presidium ferunt, adeo q; læduntur quoq; nisi lauentur.

Peripneumoniæ magis q̄ ardoribus auxiliatur lauacrum. Namq; lateris, pectoris, & dorsi dolorem mitigat, sputum maturat, & educit, spiritum facilem reddit, fatigationem lenit, articulos & ambu

buem cutem emollit, utinam ciet, capitis grauitatem soluit, nares humectat.

Verum nisi à ministris probe instructa fuerint omnia, tantum abest, ut proffit, ut etiam uehementer noceat.

Qui aluo sunt citatiore, quàm fuerit opportunum, aut quibus supra modum aluus adstricta non ducitur, in lauacro committi non debent.

Balneis quoque committi non debent, quibus imbecilles sunt uires, qui fastidio aut uomitioni adfecti sunt, qui billosa ruftant, aut quibus sanguis è naribus profluit, nisi minus quàm occasio expedit, effluat.

Si singula commode parata sunt, si æger citra noxam lauacrum subire potest, quotidie lauandus est.

Quòd si præterea lauacro delectatur, eum si bis quoque laueris, non lædes.

DE FRITIONE.

De fritione uero & gestatione adeo multa Asclepiades tanquam inuētor eius posuit, quod in eo uolumine, quod Communium auxiliorum scripsit, cum triam tantam faceret mentionem, huius & æqui & gestationis, tamen maximam

T H E S E S T O T I V S

partem in hoc consumpserit.

Oportet autem neq; recentiores uiros in his fraudare, quæ uel teppererunt, uel recte sequuti sunt, & tamen ea, quæ apud antiquiores aliquos posita sunt, authoribus suis reddere.

Neq; dubitari potest quin latius quidē & dilucidius, ubi & quomodo frictione utendum esset. Asclepiades præceperit, nihil tamen repererit, quod non à uetustissimo authore Hippocrate, paucis uerbis comprehensum sit, qui dixit: Frictio ne si uehemens sit, durare corpus, si lenis, molliiri, si multa, minui, si modica, impleri. Sequitur ergo, ut tum utendum sit, cū aut adstringendum corpus sit. quod fluens est, aut molliendum quod induruit, aut digerendum in eo quod copia nocet, aut alendum id quod tenue & infirmū est. Quas tamen species si quis curiosius æstimet, quod iam ad medicum nō pertinet, facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quæ demit. Nam & astringitur aliquid eo dempto, quod interpositū ut id laxaretur, effecerat, & molliitur eodetracto, quod duritiem creabat, & impletur non ipsa frictione, sed eo cibo, qui

po

postea usq; ad cutem, digestionem quadā,
relaxatam penetrat.

Diuersarum uero rerum in modo causā
sa est. Inter unctionem autem & frictionē
multū interest. Vngi enim, leniterq; per
tractari corpus, etiam in acutis & recenti-
bus morbis oportet, in remissione tamē,
& ante cibum.

Longa uero frictione uti, neq; in acutis
morbis, neq; in crescentibus cōuenit, pre-
terq; cum phræneticis somnus quaeritur.
Amar autem hoc auxilium ualētudo lon-
ga, & tam à primo impetu inclinata.

Neq; ignoro quosdam dicere, omne
auxilium necessarium esse incrementibus
morbis, non cum iam per se finiuntur.
Quod non ita se habet. Potest enim mor-
bus etiam qui per se finem habiturus est,
citius tamen adhibito auxilio tolli, quod
duabus de causis necessarium est, ut &
quā primum bona ualētudo contingat,
& ne morbus (qui remanet) iterum (quā-
uis leui de causa) exasperet. Potest enim
morbus minus grauis esse, quā fuerit, neq;
que ideo tamen solui, sed reliquijs qui-
busdam inhaerere, quas ad motum ali-
quod auxilium discutit.

T H E S E S T O T I V S

Sed ut leuata quoq; aduersa ualerudine recte frictio adhibetur, si nunq; adhibenda est febre increfcente. Verum si si eti poterit, cū ex toto corpus ea uacabit, minus certe cum ea remiserit.

Eodem modo in tutis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus modo est in partibus, aut quia ipsa eius membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius.

Nam & capitis longos dolores, ipsius frictio leuat, non in impetu tamen doloris & membrum aliquod resolutum, ipsius frictione confirmatur.

Longe tamen saepius aliud perfricandum est, cum aliud dolet, maximeq; cū à summis, aut à medijs partibus corporis euocare materiam uolumus, ideoq; extremas partes perfricamus.

Neq; audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis perfricandus sit. Id enim ex uiribus hominis colligendum est.

Et si is perinfirminus est, potest satis esse quinquagies, si robustior, potest dūcenties esse faciendum. Inter utramq; deinde pro ut uires sunt. Quod fit ut etiam minus saepe in muliere, q̄ in uiro, minus saepe in
 pu

puero uel sene, quàm in iuene manus dimouendæ sint.

Deniq; si certa membra perfricantur, multa, ualentiq; frictione opus est. Nam neq; totum corpus infirmari cito per partem potest, & opus est q̄ plurimum materiæ digerere, siue id ipsum membrum, siue per id aliud leuamus.

At ubi totius corporis imbecillitas hæc curationem, per totum id exigit, breuior esse debet, & lenior, ut tantùm modo summam cutem emolliat, quo facilius capax ex recenti cibo nouæ materiæ fiat.

In malis autem ægrum esse testatur, ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, ut supra posui.

Sed tunc quoq; unicū in frictione præsidium est, quæ si calorem in cutem euocauit, potest alicui medicinæ locum facere.

ORIBASIVS EX GAL-
leno.

FRICTIO maxime necessaria est his qui paralytim incurrunt, & quibus membra stupida sunt. Ex forti confricatione soluitur corpus, de modica uero constringitur.

T H E S E T O T I V S

Quæ obstructa sunt corpora, leuius sūt
confricanda.

Modica fricatio nutrit corpus, fortis
desiccatur, & extenuat.

Quibus nec nutrire, neq; extenuare o-
pus est, leui fricatione utentur.

Fricatio apud Romanos olim sic fie-
bat, cum sindone corpus conficiebatur.
Inde nudis manibus cum oleo fricaba-
tur, donec concalesceret & molle fieret
corpus, appareretq; subrubicundum et in-
tumorem adduceretur.

D E G E S T A T I O N E.

Cel. lib. 4.
cap. 14.

Gestatio longis etiã & inclinatis mor-
bis aprissima est, utilisq; est & ijs cor-
poribus, quæ iam ex toto febre carent, sed
adhuc exerceri per se non possunt, & his
quibus lentæ morborum reliquæ rema-
nent, neq; aliter eliduntur.

Asclepiades etiam in recenti, uehemē-
tiq; febre, præcipueq; ardente, ad discutiē-
dam eam, gestatione dixit utēdum esse.
Sed id periculose fit, meliusq; quiete eius
impetus sustinetur.

Si quis tamen experiri uolet, sic experi-
atur: Si lingua non erit aspera, si nullus tu-
mor, nulla durities, nullus dolor uisceri-
bus

bus, aut capiti, aut præcordijs suberit.

Et ex toto nunq̄ gestari corpus dolēs, siue id in toto, siue in parte est, nisi tamen solis nervis dolētibus, neq̄ unq̄ in recēti febre, sed in remissione eius.

Genera autem gestationis plura sunt adhibenda, quæ sunt & pro uiribus cuiusq̄, & pro opibus, ne aut imbecillū homine nimis digerant, aut humili obsint.

Gestationum leuissima est nauis, uel in portu, uel in flumine, uehementior in alto mari, nauis, uel lectica aut scamno, acrior uehiculo. Atq̄ hæc ipsa, & intendi & leniri possunt, si nihil horum est, suspendi lectus debet & moueri, siue id quidē, at cerre uni pedi lecti funiculus subiiciendus est, atq̄ ita lectus huc atq̄ illuc manu impellendus. Et leuia quidem genera exercitationis, infirmis conueniunt.

Violentiora uero his, qui grauiū morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre uacent. Quod & in tibi & in stomachi uitijs, & cum aqua cutem subijt, & interdum in morbo regio fit.

Aut ubi quidam morbi, qualis comitalis, qualis insania est, sine febre, quāuis diu manēt. In quibus affectibus ea quoq̄

THESES TOTIVS

genera exercitationū necessaria sunt, quæ comprehendimus eo loco, quo quemadmodum sani, neque firmi homines, se gerent, præcepimus.

Omnia uectationum uel exercitiorum genera, calorem corporis præstant. Fortis exercitatio est, quæ non est citata, sed cum fatigationem fortissimam præparat, per quam muscoli & nerui restaurantur.

Citata exercitatio est, quæ fit absque uolentia, qualis est, cursus, complexio, rotatio, uel cum parua ferula lusus.

Composita exercitatio, quæ fit ex forti & citata.

Mensura uectationum res est, cum sudores mouentur, & rubor in corpore apparet.

Ventre replere uectatio molesta est, quæ omnis esca, dum cruda fuerit, si commoueat, exinde epas & splen frequenter ægrotare consueuerunt.

DE EXERCITIO.

Qui corpus exercent, per hyemem currere & colluctari debent. Aestate luctandum modice, currendū nō est.

In frigore multa ambulatio conuenit.

Qui

Qui cursu fatigantur, luctari debent, qui ex luctu fatigationem sentiunt, his currendum est.

Qui rariores cute sunt, & hirsuti magis, carnis æsum ex facili admittunt, labores magis sustinent, diuq̄ bono corporis statu fruuntur.

Qui siti premuntur, parcius ædent, minusq̄ laborabunt, uinum dilutum simul & perfrigidum bibent.

Quos dolores uiscerum infestant, uel ex labore, uel alia quadã ambulatione sine cibis recreandi sunt. Modica potio conuenit, præsertim ea quæ urinam cieat, quæ uenæ ex uisceribus prodeuntes, repleti non distendantur, nam huic inflationes, febresq̄ oriuntur.

Per hyemem celeriter ambulandum, æstate conuiescendum est, aut non in sole ambulandum.

Bleis cita ambulatio, gracilibus lenta conuenit,

Fortissimæ exercitationis finis est frequens respiratio & spissa, ita ut uix respirare possis currendo. Grabasius ex Gal.

Forti exercitationi opus habet, qui otio uacant, & humecta uidentur habere corpora.

De

THESES TOTIVS

DE CAPITIS.

L Ac dare caput dolentibus, malū, ma-
lum uero & febricitantibus. Hip. Lib.
5. Aph. 64.

Dolenti partem capitis posteriorem,
in fronte recta uena incisa, prodest. Lib. 5.
Aph. 68.

Caput dolenti, & circumdolenti pus
uel aqua, uel sanguis effluens, per nares,
aut os, aut aures, morbum soluit. Lib. 6.
Aph. 22.

Quicumq; sani, dolore capitis repente
capiuntur, & statim mori fiunt, & stertūt,
in septem diebus pereunt, nisi febris ap-
prehenderit. Hip. Lib. 6. Aph. 51.

DE CEREBRO.

Q uibuscunq; præciditur cerebrum,
his necesse febrem, & bilis uomitū
superuenire. Lib. 6. Aph. 50.

Quibus cerebrum sphacelatum, id est,
corruptum est, in tribus diebus pereunt,
si uero hos euaserint, sani fiunt.

Quibus cerebrum aliqua ex causa cō-
tūsum fuerit, necesse est statim mutos fi-
eri. Lib. 7. Aph. 59.

DE STERNUTATI

onibus.

Angultu habitum sternutatio superueniens, liberat. Lib. 6. Aph. 13.

Sternutamentum fit ex capite, calefacto cerebro, aut humectato, eo quod in capite inani, aer enim intus contentus, extra erumpit. Sonat autem, quoniam per angustum ipsi est exitus. Lib. 7. Aph. 52.

DE MANIA ET PHRENITIDE.

Desipientia, quaecumque risu fiunt, securiore quae uero cum studio periculosiores. Lib. 6. Aph. 53.

A furore difficultas intestinorum, uel aqua inter cutem, uel mentis alienatio, bonum. Lib. 6. Aph. 5.

Consule titulum de melancholia.

A profluuio sanguinis desipientia, ac conuulsio malum. Lib. 7. Aph. 9.

A pulmonis inflammatione phrenitis, malum Hip. Lib. 7. Aph. 12.

In capitis ictu obstupescencia, & desipientia, malum. Lib. 7. Aph. 14.

In uigilia conuulsio uel desipientia. Lib. 7. Aph. 18.

In ossis praecisione desipientia, si in uacuum apprehenderit. Lib. 7. Aph. 24.

Ex multa potatione, rigor, & desipientia, malum. Lib. 7. Aph. 7.

THESES TOTIVS

DE FACIE

IN acutis morbis sic consyderare oportet, in primis quidem ægri faciem, an sanorum faciebus, maxime uero ipsius, similis sit. Ea enim optime censenda est. Qui uero maximo discrimine ab hac similitudine recedit, grauissimum periculum portedit, cuius eæ sunt notæ: Nares acutæ, oculi concaui, collapsa tempora, frigida contractæq; aures, & imis partibus leniter uersæ, cutis circa frontem dura, interta & arida, totius faciei color, aut niger, aut pallidus, aut liuens, aut plumbeus.

Quod si inter morbi initia huiusmodi facies appareat, neq; ex alijs indicijs coniectura sumi possit, inquirendum est, an uigilia, an uentris uehemens resolutio, aut inædia præcesserit. Quorum si quidpiam deprehenderit, nihil periculi timendum est. Atqui si ab huiusmodi causis hæc faciei species orta est, una die, nocteq; finitur, si uero æger eas præcessisse negauerit, diutiusq; iam dicto tempore hæc forma durauerit, scire licet eum morti proximum esse. Aph. II. Præf. lib. I.

Quod si in ueteri morbo iam triduo, quattriduoq; talis est, inquirenda sunt ea signa

signa quæ supra proposui. Ad hæc reliqua quoq; iudicia, non solum ex facie, uerum etiam ex reliquis corporis partibus perpendenda sunt, præcipue ex oculis.

DE OCVLIS.

Dolores oculorum meri potio, aut balneum, aut uenæ sectio, aut medicamentum epotum soluit. Lib. 6. Aph. 31.

Dolores oculorum post meri portionē & aquæ calidæ balneum, uenæ sectione curato, Lib. 7. Aph. 47.

Si lumen refugiunt ægri, & illachrymant, idq; præter uoluntatem, aut peruertuntur, alterq; ex illis minor est, & quæ in ipsis alba esse debent, rubescunt, aut genæ pallent, atq; in ipsdem uenæ nigrant, aut lippitudo innatans tandem angulis innæret, aut frequens est oculorum motus, inq; aut uehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt, fueritq; aspectus horridus, obscurusq;, atq; uniuersæ faciei color mutatus, hæc omnia signa mala, pernitiōsaq; puranda sunt.

Quin etiam oculorum per somnium suspensiones obseruandæ sunt, ubi enim palpebræ non committuntur, sed inter hos ex albo oculorum aliquid apparet, neq;

THESES TOTIVS

nequid fluens aluus, neq; medicamenti porio, præcessit, præsertim si quis non sic dormire consuevit, prauum hoc signum letaleq; est. Præf. lib. 1. Aph. 4.

Si palpebra aut labrum, aut nasus re-
torquetur, aut pallet, aut liuore inficitur,
accedente quoq; reliquorum signo-
rum, egrum morti proximum esse, haud
dubitandum est. Præf. Lib. 1. Aph. 15.

Mortem etiam portendunt labra reso-
luta, suspensa frigida, candicantia.

DE AVRIBVS ET AV- ditu.

Quibus in febribus aures obsurdue-
runt, sanguis ex naribus fluens, aut
aluus turbata, soluit morbum. Li-
4. Aph. 60.

DE FAUCIBVS.

Vbi fauces ægrotant, aut tubercula na-
scuntur, in corpore, excretiones in-
spicere oportet. Nā si biliosæ fuerint, cor-
pus uua egrotat, si uero similes, tutum est
corpus nutrire. Hip. Lib. 2. Aph. 15.

Si febre habito tumore non existente
in faucibus, strangulatio repente superue-
nerit, letale Lib. 4. Aph. 34.

De

DE GUTTURE ET AN-
gina.

S In febre habito, collum peruertitur,
& uix potest deuorare, sine ullo tumo-
re, letale. Lib. 4. Aph. 35.

Quicumq; ab angina liberantur, his ad
pulmonem uertitur, & in septem diebus
pereunt, si uero hos effugerint, suppuran-
tur. Lib. 5. Aph. 10.

Ab angina habito, si tumor fiat in col-
lo, bonum. Libro 6. Aph. 37.

Ab angina habito, tumor & rubor in
pectore superueniens, bonum, extra es-
tim uertitur morbus. Lib. 7. Aph. 50.

DE LINGUA.

S I lingua repente incontinens fiat, aut
s aliqua pars corporis stupore exanguit-
tale est melancholicum. Lib. 7. Aph. 40.

DE DENTIBVS.

O Mnia ossa humani corporis confir-
mantur, curantur, & ad locum suū
reuocantur, exceptis dentibus, qui extra-
sti nuncq; restituantur. Sor.

Omnia ossa medullam habent, denti-
bus exceptis. Sor.

Qui dentes nostros uiciat humor, ne-
quissimus est.

T H E S E S T O T I V S

D E A P O P L E X I A .

Soluere morbum, quem apoplexiam
uocant, fortem, impassibilem, debilem
uero non facile. Hip. Lib. 2. Aph. 42.

Apoplexiæ autem fiunt maxime à 40.
anno usq; ad 60.

D E M O R B O C O M I T I A
ali.

Quicunq; iuuenes morbo comitiali
laborant, mutatione maxime estas-
tis, & temporum & locorum, &
uictum liberabuntur. Hip. Lib. 2. Aph. 45.

Quibuscunq; morbi comitiales fiunt,
ante pubertatem, mutationem accipiunt.
Quibuscunq; autem 25. commotiuntur.
Lib. 5. Aph. 7.

D E P L E V R I T I D E E T
morbis pectoralibus.

IN morbo laterali, si circa initia statim
sputum appareat, morbum breuiat, si
uero postea appareat, producit. Hip. Lib.
1. Aph. 12.

Quicunq; morbo laterali laborantes,
in quatuordecim diebus non repurgan-
tur, ij ad suppurationem uertuntur. Li. 5.
Aph. 8.

Quicunq; ex morbo laterali suppurati
sunt,

nt, si in quadraginta diebus purgantur,
 a die qua fit ruptio, liberantur, si uero nō
 ad tabem transeunt. Lib. 5. Aph. 15.

Dolores qui sunt in lateribus & pecto-
 ribus, atq; alijs partibus, si multum disse-
 rant, perdiscendum. Lib. 6. Aph. 5.

Qui acidum ructant, non ualde mor-
 bo laterali corripuntur. Lib. 6. Aph. 35.

A morbo laterali inflammatio pulmo-
 nis, malum. Lib. 7. Aph. 11.

Quicumq; spinnosum sanguinem ex-
 spuunt, his ē pulmoneeductio fit. Hip.
 Lib. 5. Aph. 13.

Vide plura, titulo de tabe.

A pulmonis inflammatione phreni-
 tis, malum. Lib. 7. Aph. 12.

In peripneumonia & pleuricide, quā
 acuta sit febris considerandum est. Li. 4.
 de morbis acutis.

Item, ambo ne latera, an unum dunta-
 xat dolor infestet, an ægre spiritus redda-
 tur, an tussis eruet, an sputum educatur,
 sitq; uel ruffum uel liuidum, uel tenue,
 uel spumofum, aut floridū, aut alias dif-
 ferentias habeat.

Si dolor ad superiores partes extendi-
 tur, ut iugulum, mammillam, brachiū,
 l. 2 in 2

De pecto-
 ris & pul-
 monis ui-
 tijs, siue
 peripneuo-
 monia.

THESES TOTIVS

ternam brachij uenam secare oporteat, in loco ubi fuerit dolor.

Si uero sub pectore pleureticum dolor uehementer excruciat, uenter purgandus est, atq; inter purgandum nihil, à purgatione uero acetum, mulsum dare conuenit.

Porro quarto die purgandus est, sed tribus ab initio diebus clysteres exhibere, quibus si dolor leuatus non est, tū demum purgare oportet.

Cæterū nihil prohibet ad alios quoq; laterum dolores tepida fomenta & ceromata adhibere, atq; crura & lumbos, calido unguento ungeri, & pinguedinem illinire, præcordijs uero ad mammillas usq; ex lini semine cataplasma imponere.

Cum ad uigorem iam peruenit peripneumonia, nisi expurgetur, in nullo auxilium alio sperandum est.

In peripneumonia, si difficulter spirat æger, fuerintq; urinæ tenues, & acres, atq; sudores in capite, ceruiceq; oriuntur, malum.

Contra sputa matura, urinæ crassæ, bonum.

DE PRÆCORDIIS.

Inter optima indicia sūt præcordia, ubi sine ullo sensu doloris in utraq; parte, & qualiter mollia sunt. Inflammata uero, dolentia & intenta, uel ubi aliter in sinistra parte afficiuntur, suspecta haberi debent. Præf. Lib. 1. Aph. 30.

Præcordiorū uenæ si pulsent, aut turbationem aut delirium portendunt. Sed eorum qui sic affecti sunt, oculos aspicere oportet, quippe frequens eorum motus insaniam comminatur. Aph. 31. 32.

Præcordia tumida, dura, dolentia, si in uniuersum sic affecta sunt, maximum malum portendunt, si uero altera parte duntaxat, ex sinistra minus periculū est. Aph. 33.

Cæterum huiusmodi tumores in principio quidem proximam mortem denuntiant. Vbi uero uiginti dies excesserunt, neq; febre quiescente, neq; tumore remisso, ad suppurationem conuertantur. Atq; inter primos arcuitus, sanguis è naribus fluens, non mediocri ipsis præsidio est. Sed tamen sanguinis eruptio expectari debet, cum interrogati, aut caput dolere, aut oculos caligare fatentur, id

T H E S E S T O T I V S

nero iunioribus uidelicet circa quintum
& trigefimum annum plarumq; euenire
solet. Aph. 34. 35. 36.

Mollis tumor dolorem non inferens,
& digitis cedens, longiori tempore fini-
tur, sed non ita graue periculum, ab eo pe-
det. Quod si intra sexaginta dies, neq; fe-
bris definit, neq; tumor resedit, suppara-
tionem expectare oportet. Idem haud se-
cus in reliquis quoq; uetris partibus per-
penditur. Aph. 38. 39.

Itaq; durus, magnusq; tumor dolore
crucians, mortis periculum non multo
post fore denuntiat. Mollis uero & sine
dolore, quiq; prementi digito cedit, lon-
gus esse solet. Aph. 40.

Ventris tumores non tam crebro ut in
qui in praecordijs oriuntur, abscessum ef-
ficiunt. Quod si umbilico efficiantur, ne-
quaq; ad suppurationem conuertentur.
Sed ex superioribus maxime sedibus san-
guinis fluorem expectare oportet, in qui-
bus omnis tumor diuturnus ad suppara-
tionem ferè spectat. Aph. 41. 42. 43.

Itaq; suppurationum observatio sic ac-
cipienda est. Eorum enim quae in exteri-
orem partem erumpunt, optimae sunt par-
uae

uæ, admodum eminentes, atq; in acutū fastidium. Pessimæ uero sunt, quæ maxime, quæq; planissimæ sunt. Aph. 44.

Sed illarum quæ intus excitantur, optimæ censentur, quæ exteriorem cutem non decolorant, & contrahuntur, nulloq; dolore cruciant, atq; ubi exterioris cutis color manet uniformis. Aph. 45.

Pus illud optimum est, quod album & leue est, & haud quæq; foeret. Quod uero ab hoc uariat, pessimum est. Aph. 46.

DE VENTRE.

IN forti dolore uentris, partium extre-
marum frigiditas, malum.

Quibus inter uentriculum & septū pituita reposita est, & dolorem affert, non habens exitum, neq; ad alterum uentrē, his per uenas ad uellicam pituita uersa, soluitur morbus. Lib. 7. Aph. 55.

Destillationes in uentrem superiorem suppurantur intra 20. dies. Lib. 7. Aph. 38.

DE EPATE.

IN epatis inflammatione singultus, malum. Lib. 7. Aph. 17.

Quicumq; epas circumdolent, his febris superueniens, soluit dolorē. Lib. 7. Aph.

53.

T H E S E S T O T I V S

Quorum epar suppuratum adurit, si pus purum fluxerit & album, euadunt. In tunica enim his pus continetur, si uero qualis amurca fluat, pereunt. Lib. 7. Aph. 46.

Quibus epar aqua plenum in uentrum eruperit, his uenter aqua repletur, & moriuntur. Lib. 7. Aph. 56.

D E H Y D R O P E.

Aqua inter cutem laborantibus, ulcera in corpore facta, difficulter sanantur. Hip. Lib. 6. Aph. 8.

Adiuturnis sanato hemorrhoidibus, si uua non seruetur, periculum est aquam inter cutem, uel tabem aduenire. Lib. 6. Aph. 12.

Ab aqua inter cutem habito, si aqua a uenis in uetrem defluerit, soluitur morbus. Lib. 6. Aph. 14.

Quicumque suppurati, aut aquam inter cutem patientes, uruntur, aut secantur, si pus aut aqua uniuersim effluxit, omnes moriuntur. Lib. 6. Aph. 27.

Aqua inter cutem laborantibus, tussis superueniens, malum. Eo. Aph. 35.

Aqua inter cutem laborans, si a tussi habeatur, desperatum est. Lib. 7. Aph. 45.

A pituita alba aqua inter cutem super
uenit. Lib. 7. Aph. 72.

Aqua inter cutem, si ex acuto morbo
cœpit, periculosa est, neq; enim febrē sol-
uit, sed doloribus torquet atq; interficit.
Oritur uero magna ex parte, uel ab ilibus
uel lumbis, uel à iecinore. Præf. Libro. 3.
Aph. 1.

Sed ubi ab ilibus, lumbisq; ortum con-
traxit, pedes tumidos reddit, fluorem dia-
urnum inducit, qui neq; lumborum, ili-
umue dolorem soluit, neq; uentrem effi-
cit molliorem. Aph. 2.

At quibus à iecinore, aqua inter cutem
proficiscitur, ij tussi uexantur, sed quia pe-
ne nihil excreatur, pedes tument. Aph. 3.

Deiectio dura, coactaq; est, circa uentrē
tumores, modo in dextra, modo in sini-
stra parte attolluntur, deinde desinunt.

Mali etiam morbi signum est, caput &
pedes, manusq; frigiditas habere, uentre et
lateribus calentibus. Securitatem pollice
tur corpus, quod æqualiter molle, & cali-
dum est, quodq; facile conuertitur & sur-
git. Aph. 4. 5. 6.

Gravitas uero, quæ uel manus uel pe-
des, uel reliquum quoq; corpus premit,
l 5 peria

T H E S E S T O T I V S

periculum significat. Quòd si cum graui-
tate, ungues quoq; ac digiti, tum pedes,
manusq; liuentes, periculum portendit,
sed tunc ad reliqua signa refugere oportet,
etenim si facile æger malum sustinet,
ad suntq; alia quædam iudicia, quæ secu-
ritatem polliceri solent, suppurationem
sperabis, atq; superstes manebit æger, sed
denigratæ corporis partes decider. Aph.
7.8.9.

Testiculi, pudendaq; retracta uehemẽs-
res dolores, atq; letale periculum signifi-
cant. Aph. 10.

D E T A B E.

TAbes fiunt maxime ætatibus, à deci-
mo octauo anno, usq; ad trigessimũ
quintum. Hip. Lib. 5. Aph. 9.

Quicumq; ab angina liberantur, his ad
pulmonem uertitur, & in septem diebus
pereunt, si uero hos effugerint, suppurati
tur. Lib. 5. Aph. 10.

Qui in tabe molestatur, si sputũ quod
extufferint graue olet, iniectum carboni-
bus, & capilli à capite defluunt, letale. Lib.
5. Aph. 11.

Quibuscunq; tabe laborantibus, capil-
li à capite defluunt, his alui profluuius su-
per

perueniente, moriuntur. Lib. 5. Aph. 13.

Quicumq; spumofum sanguinem ex-
puunt, his è pulmone eductio fit. Libro
5. Aph. 13.

A tabe habito, profluum alui super-
ueniens, letale.

Quicumq; ex morbo laterali suppuran-
tur, si in quadraginta diebus purgantur,
à die qua fit ruptio liberantur. Si uero nò,
ad tabem transeunt.

DE MORBO REGIO.

Quibus in febribus morbus regius,
septimo, uel nono, uel undecimo,
uel decimoquarto superuenerit,
bonum. Nisi dextrum ilium obduruerit,
si uero non bonum. Hip. Lib. 4. Aph. 64.

Qui regio morbo laborant, non mul-
tum uentosi sunt. Lib. 5. Aph. 72.

Morbo regio laborantibus, si fiat epar-
durum, malum. Lib. 6. Aph. 42.

Si ante septimum diem febricitanti su-
perueniat morbus regius, simul cū hor-
rore, soluitur febris, si uero sine horrore,
atq; extra occasiones, siue extra tempora
acciderit, pernitiem denuntiatur. Hip. Li.
4. de regimine acutorum.

DE SINGVLTV.

A

T H E S E S T O T I V S

A Vomitu singultus, & oculorum rubor, malum. Lib. 7. Aph. 3.

Ab ileo, uomitus, singultus, desipientia, conuulsio, malum. Lib. 7. Aph. 10.

In epatis inflammatione singultus, malum. Lib. 7. Aph. 17.

Si senioribus supra modum purgatis, singultus superuenerit malum.

D E P V R E E T S P U T O .

A Puris sputo pthisis & fluxus, cum uero sputum retinetur, moriuntur. Li. 7. Aph. 16.

De sputo uide plura, titulo de sanguine, titulo de tabe, titulo de morbo laterali, titulo de uitijs pulmonis.

A sanguinis sputo, puris sputum. Li. 7. Aph. 15.

Excreationes in febris non intermittentibus liuidæ, sanguineæ, biliosæ, & foetide, omnes malæ. Cum uero bene excernitur, bonum est, & per uentrem, & per uesicam, & ubi aliquid secedens steterit, non purgatum, malum.

Pus illud optimum est, quod album & leue est, & haudquaquam foetet, quod uero ab hoc uariat, pessimum est. Praef. Lib. 4. Aph. 46.

Vide

Vide plura, titulo abscessus, & titulo de suppuratione.

In pulmonis, costarumq; doloribus, oportet ut sputum celeriter, facileq; creetur, & cruor sputo uehementer miscetur. Etenim si multo post, doloris uitiū, aut cruentum, aut ruffum, aut non sine multa tussi aut adeo commixtum expuitur, uitiosum censeatur. Præf. Lib. 2. Aph.

43. 44. 45.

Quippe cruentum si syncerum quoq; fuerit, periculum subesse testatur, album uero, uiscidum & rotundum inutile est. Aph. 46. Eodem.

Mali etiam morbi testimonium est, quod admodum uiride, quodq; spumosum est. Aph. 47. Eodem.

Id uero omnium aliorum deterius est, quod sic est syncerum, ut nigrum quoq; uideatur. Nam tutum est sputum, quod non expurgatur, nec proijcit ipsum pulmo, sed ob nimiam plenitudinem feruet in pectore. Aph. 48.

In omnibus morbis pulmonis destillatio, sternutamentumq; siue præfuerunt, siue superuenerunt, periculum ostendūt, quanq; in cæteris morbis, uel periculosis
simis

THESES TOTIVS

simis utilitate non carent. Aph. 49.

Sputum cruentum, cui paulum sanguinis admixtum est, in morbi principio, in flammato pulmone proiectum, securitatem atq; auxilium pollicetur. Quod uero ad septimum usq; diem, longioris spatii tale apparet, non adeo tutum est. Eodem Aph. 50.

Omne sputum quod dolorem non mitigat, malum est. Nigrum, ut supra demonstrauimus, pessimum est, sed longe saluberrimum est, id quod dolorem placat. Aph. 51.

DE OSSIBVS

IN offe ægrotante caro liuida, malum est. Lib. 7. Aph. 2.

Li. 7. Aph. 2.
12.

In offis exutione erysypelas. In offis præcisione desipientia, si in uacuum apprehenderit. Lib. 7. Aph. 24.

Quando os aut carthilago aut neruus abscinduntur, in corpore non augetur. Lib. 7. Aph. 28.

A corruptione abscessus offis. Libro 7. Aph. 74.

DE INTESTINIS.

Siquid intestinorum gracilium discindatur, non coalescit. Lib. 6. Aph. 24.

Vide

Vide titulum de uulneribus.

DE LYENE.

LYenosis difficultas intestinorum superueniens, bonum. Lib. 6. Aph. 48.

Quicumq; lyenosi à difficultate intestinorum capiuntur; his superueniente longa difficultate intestinorum, aqua intercutem, aut leuitas intestinorum aduenit, & moriuntur. Lib. 6. Aph. 43.

DE RENIBVS ET VESICA.

RENum & uesicæ uitia in senioribus difficulter sanantur. Lib. 6. Aph. 6.

Vesica discissa, letale est. Lib. 6. Aph. 8.

Urinæ stillicidium, & mingendi difficultatem uini potio, & uenæ sectio soluit. Incidere autem interiores. Libro 7. Aph. 49.

Quæ per uesicam excernuntur, inspicere oportet, si talia, qualia sanis excernuntur. Quæ igitur minime similia sunt his, hæc morbosiora, quæ uero sunt sanis similia, hæc minime morbosa. Libro septimo Aph. 64.

Qualia fuerint uesicæ, aut alui excrementa, & ex carnibus, & sicubi alibi à natura corpus exierit, si parum, paucus est mor

T H E S E S T O T I V S

morbis, si multum, multus, si ualde multum, letale Lib. 7. Aph. 76.

Vesica dura, dolens, graue periculum, letaleq; cōminatur, idq; si cōtinuo quoq; febris accesserit Nam uesicæ dolores ualidam necandi uim obtinent, quo tempore aluus etiam nihil reddit, nisi dura, quædam, ac ne ea quidem nisi cogatur. Præf. Lib. 2. Aph. 71.

At uero urina purulenta procedens, in qua residet album, metū detrahit. Aph. 71.

Quod si ab huiusmodi urina dolor leuatus non est, neq; uesica mollior effecta est, neq; febris conquieuit, laboratē per primos morbi circuitus moriturum, denuntiandum est. Aph. 73.

Id uero pueris a septimo anno, ad decimum quartum præcipue accidere solet. Aph. 74.

D E H E M O R R H O I D I -
bus.

A Trabile uexatis, & renum passionibus, hæmorrhoides superuenientes, bonum. Lib. 6. Aph. 11.

A diuturnis sanato hæmorrhoidibus, si una nō seruetur, periculum est, aquam

inter cutem, uel tabem aduenire. Libro 6.
Aph. 12.

In insanientibus, si urtrices uel hæmor-
rhoides superuenerint, intestinae solutio.
Lib. 6. Aph. 21.

DE VRINA.

Quibus urinæ crassæ, grumosæ, cras-
sæ, non sine febre, multitudo ueni- Titulo de
ens ex his tenuis iuuat. Præcipue uesicae
uero tales ueniunt, quibus ab initio uel remibus.
breue sedimen inest. Lib. 4. Aph. 69.

Quibus urinæ perturbatae, quales sunt
lumentorum, his dolor capitis uel adest,
uel aderit.

Quibus septima indicatur, is nubecu-
lam habet, quarta die rubeam, & alia ex
ratione. Lib. 4. Aph. 70.

Quibus urinæ albæ, & perspicuæ, ma-
læ, præsertim si in delirantibus appareât.
Lib. 4. Aph. 71.

Quibus speratur abscessum futurum,
ad articulos, liberat ab abscessu urina
multa, crassa & alba facta, qualis in labo-
riosis febribus, quarto die quibusdam in-
cipit fieri. Si uero etiam ex naribus sang-
uis fluxerit, breui admodum solutio fiet.
Lib. 4. Aph. 74.

m Si

THESES TOTIVS

Si sanguinem aut pus mingat, aut re-
num aut vesicæ ulcerationem significat.
Lib. 4. Aph. 75.

Quibus in urina crassa existente carun-
culæ parvæ, aut veluti capillum, una exe-
unt, his à renibus excernitur. Lib. 4. Aph.
76.

Quibus in urina crassa furforea quædã
simul exeunt, his vesica scabie laborat. Li-
bro 4. Aph. 77.

Quicumq; sponte sanguinem mingūt,
his à renibus uenulam ruptam significa-
tur. Lib. 4. Aph. 78.

Quibus in urina arenosa insidunt, his
vesica laborat calculo. Lib. 4. Aph. 79.

Si sanguinem mingant aut grumos,
uel stillicidium urinæ habeant, & dolor
inimum incidat ventrem, & pectinem
& semen, circa vesicam dolor est. Lib. 4.
Aph. 80.

Si sanguinẽ aut pus minxerit, aut squã-
mulas, & grauis odor adsit, vesicæ exulce-
rationem significat. Lib. 4. Aph. 81.

Quibus urinaria fistula tubercula inna-
scuntur, his suppuratione facta & erupti-
one solutio. Lib. 4. Aph. 82.

Mictio noctu plurimafacta, parvã sig-
nificat

nificat deiectionem. Lib. 4. Aph. 83.

Quibus ex stillicidio urinæ ileos super
uenerit, in septem diebus pereunt, nisi fe-
bre superueniente. Lib. 6. Aph. 44.

Quibuscunq; febricitantibus in urinis
fiunt sedimina, ueluti farina crassior, lon-
gam ægritudinem ferè significat. Lib. 7.
Aph. 31.

Quibus autem biliosa sedimina supra-
tenuia, acutum morbum significant. Lib.
7. Aph. 32.

Quibus urinæ distantes sunt, his tur-
batio fortis in corpore fit. Lib. 7. Aph. 33.

Quibus in urinis bullæ subsistunt, mor-
bum renalem & longum significant. Li-
7. Aph. 34.

Quibus insidens pingue, ac simul to-
rum, his renum uicium acutum significa-
tur. Lib. 7. Aph. 35.

Qui per uesicam excernuntur, inspice-
re oportet, si talia, qualia sanis excernun-
tur. Quæ igitur minime similia sunt his,
hæc morbosiora, quæ uero sunt sanis si-
milia, hæc minime morbosa. Lib. 7. Aph.
64.

Urinæ stillicidium, & mingendi diffi-
cultatem uini potio, & uenæ sectio sol-
uit.

THESES TOTIVS

uit, incidere autē interiores · Lib. 7. Aph.
4^o.

Urina illa optima est, in qua per totū morbi decursum residet album, leue, æquale, hæc nimirum securitatem, leuēq; morbum significat, quod si aliquid horū deest, ut modo liquida sit, modo album leueq; resideat in ipsa, hæc ut longiorem morbum denūciat, ita securitatem minorem pollicetur. Præf. Lib. 2. Aph. 26.

Subrūbra urina, in qua subrubrum, leueq; residet, q̄q; superiorem morbum diuturniorem, eundem tamen salubriore declarat. Aph. 27.

Mala urina est, cū id quod residet, partim farinae crassiori simile est, peior uero si lamis. Ac uituperat quoq; alba, tenuisq; quanc̄ longe maius periculum illa portendit, in qua quædam tanquā furfuræ resident. Aph. 28.

Nebulæ in urina suspensæ, albæ quidē bonæ, nigræ uero malæ sunt. Aph. 29.

Cæterum quoad urina ruffa, tenuisq; apparuerit, crudum morbum significat, q̄ si diutius talis permanserit, ne priusq; morbus quiescat, æger uicibus destitutus succumbat, periculum est. Periculosissima
ma

ma est urina, quæ mali odoris & diluta,
& tenuis & nigra & crassa. Aph. 30. 31. 32.

In uiris quidem & mulieribus nigra,
in pueris uero tenuis & diluta, deterrima
est. Aph. 33.

Si urina tenuis & cruda sic diu fertur,
ut reliqua signa salutaria sint, plærumq;
infra septum transuersum abscessus oriri
solet. Aph. 34.

Neq; leuiter terrere nos debet urina, cui
pinguedo telis araneorum similis inna-
tat, quippe quæ hominem tabe consumi
significat. Aph. 35.

Nubecularum positum, supremumue
locum, an infimum obseruare oportet.
Nam quæ in ima parte constituuntur, cū
coloribus quos supra proposui bonæ sūt,
atq; laudantur, quæ uero lursum attollū-
tur, malæ. Aph. 36.

Sed caue ne uesica quoquo modo affe-
cta (si huiusmodi reddit urinas) te decipiat,
tales enim non ad uniuersum corpus,
sed ad ipsam dūtaxat uesicam referri de-
bent. Aph. 37.

Quibus in urina ad arenularum simi-
litudinem aliquid subsidet, siue potius id
est, tophilapilli, his tubercula ad crassam

T H E S E S T O T I V S

uenam enatata sunt atq; suppuruerunt.
Hip. de Natura humana.

Si urinæ cruentæ sunt, in uenis uicium est. Idem.

Si urina quæ crassa est, habuerit ad effigiem capillamenti carunculas admodum minutas, signo est uicium esse renibus, & articularibus. Idem.

Si pura & in summa urina ueluti fursus res huc, illucq; natent, scire licet uesicæ scabiem esse. Idem.

D E S V D O R I B V S.

Sudores febricitantibus, si inceperunt, boni, & 3. & 5. & 7. & 9. & 11. & 14. & 13. & 20. & 27. & 34. hi enim sudores indicant morbos, qui uero non ita fiunt, laborem significant, & morbi longitudinem & recidiuam.

Frigidi sudores cum acuta quasi febre, mortem, cum mitiori autem longitudinem morbi significat.

Qua parte sudor corporis est, ibi significat morbum.

Sudor multus ex somno factus absque causa manifesta, corpus uti pluro cibo significant. Si uero cibum non accipienti hoc accidat, scire oportet, quod euacuatione indiget.

Su

Sudor multus uel frigidus, superfluens, frigidus magis, calidus minus, significat morbum.

Febricitanti sudor superueniens, febre non deficiente, malum, prorogatur enim morbus, & multam significat humiditatem.

A sudore horror non bonum.

Sudor multus, calidus, uel frigidus, sepe fluens, humorē adduci, robusto quidem supra, debili uero infra, significat.

Sudores saluberrimi censentur in omnibus acutis morbis, si in diebus decreto rursus orientur, febremque finiant, aut ubi toto corpore æqualiter insudate, æger morbum facilius sustinere uidetur. Contra inuitiles qui id efficere non ualent. Pessimi omnium sunt frigidi, & ubi caput duntaxat, aut facies, aut ceruix insudat, quippe qui in acuta quidem febre mortem, in minore uero morbum diuturnum fore significat.

CORNELIUS CELSUS

Lib. 2. Cap. 16.

Sudor duobus modis elicitur, aut sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, & harenæ calidæ, & laconici, & clibani,

m 4 &

T H E S E S T O T I V S

& quarundam naturalium sudationes, ubi è terra profusus calidus uapor, ædificatio includitur, sicut super baias in myrtis habemus. Preter hæc sole quoq; & exercitatione is mouetur. Vtiliaq; hæc genera sunt, quoties humor intus nocet, isq; digerendus est. Ac neruorum quoq; quedam uitia sic optime curantur, sed cætera infirmis possunt conuenire. Sol & exercitatio tantum robustioribus, qui tamè sine febre, uel initio morbi, uel etiam grauius morbis tenentur. Cauendum autè est, ne quid horum uel in febre uel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. Nam modo discussis febribus initiũ cibi plenioris, uiniq; firmioris ualentinè facit, modo febrim ipsam tollit, foreq; adhibetur, ubi summam cutem relaxari, euoariq; corruptum humorem, & habitum corporis mutare expedit. Antiqui timidius eo utebantur, Asclepiades audacius. Neq; terrere autem ea res, si tempesta est, debet, & ante tempus nocet.

Quisquis febre liberatus est, simul atq; ea uno die non accessit, eo qui proximus est, post tempus accessionis, tuto lauari potest. At si circuitum habere ea febris so-

lita est, sic ut tertio, quartoue die reuertatur, quando cunq; non accessit, balneum tutum est. Manētibus uero adhuc febribus, si hæ sunt lentæ, lenesq; iam diu male habent, recte medicina ista rētatur. Cū eo tamen, ne præcordia dura sint, neue ea tumeant, neue lingua aspera sit, neue aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, neue tum febris increascit. At in his quidem febribus, quæ certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt, alterū ante horrorē, alterum febre finita. In ijs uero qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex toto recessit accessio, aut si id non solet, certe lenita est, iamq; corpus tā integrum est, quā maxime in eo genere ualētudinis solet.

Imbecillus homo iturus in balneum, uitare debet ne ante frigus aliquod experiatur. Vbi in balneū uenit, paulisper residere, expeririq; num tempora astringantur, et an sudor aliquis oriatur. Illud si incidit, hoc non securum est, inutile eo die balneum est, perungendus est is leniter, & referendus est, uitandumq; omni modo frigus, & abstinentia utendum. At si temporibus integris, primum ibi, dein

m 5 de

T H E S E S T O T I V S

de alibi sudor incipit, fugédum os aqua calida, tum in solo desidendum est, atq; ibi quoq; uidendum, num sub primo cō tactu aquæ calidæ summa cutis inhorrescat, quod uix tamen fieri potest, si priora recte accesserunt.

Certum autem id signum inutilis balnei est. Ante uero à posteaq; in aquam calidam se demittat, aliquis perungi debet at, ex ratione ualitudinis suæ cognoscat. Ferè tamè nisi ubi nominatim, ut postea fiat, id præcipietur, moto sudore leuiter corpus perungendum, deinde in aquam calidam demittédum est. Atq; hic quoq; habenda uirium ratio est. Neq; committendum ut per æstum anima deficiat, sed materius is auferendus, curio seq; in uestimentis inuoluendus est, ut neq; ad eum frigus aspiret, & ibi quoq; anteq; aliquid assumat, insudet. Fomenta quoq; calida sunt, milium, sal, harena, quodlibet eorū calefactum, & in linteum coniectum. Si minore ui opus est, etiam solum linteū, at si maiore extinctiones, inuolutiq; panniculi, & sic circumdati. Quinetiam calido oleo replentur utriculi, & in uasa fictilia, ad similitudinem quas lenticulas uocant,

tant, aqua conijcitur, & sal sicco linteo excipitur, demittiturq̄ in aquam bene calidam, tum super id membrum (quod fovendum est) collocatur, iuxtaq̄ igne feramenta duo sunt, capitibus paulo latioribus, alterumq̄ ex his demittitur in eum salem, & aqua super leuiter aspergitur. Vbi frigere cœpit, ad ignem refertur, & idem in altero fit, deinde inuicem in utroq̄, inter quæ descendit salsus & calidus succus, qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est digerere id quod uel præcordia operat, uel fauces strangulat, uel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus dicitur.

DE CALORIBVS.

Calidum ubi quis sæpius eo utatur, hæc mala adfert, carniū effœmiationem, neruorum incontinentiam, mentis torporem, profluvia sanguinis, animi defectionem, hæc ad quæ mors. Hip. Lib. 5. Aph 16.

Est autem ubi in distentione sine ulceratione, iuvene bene carnosæ ætate media, frigidæ aquæ multa perfusio, calorẽ reuo-

THESES TOTIVS

reuocat, calor autem hæc soluit. Libro 3.
Aph. 22.

Calidum suppuratorium non in omni ulcere, magnum ad securitatem inditum, cutem mollit, extenuat, dolorem sedat, rigores, conuulsiones & distentiones mitigat, & ex his quæ ad caput attinent, eius soluit grauitatem, plurimum autem confert ossium fracturis, sed nudis præcipue, eorumque maxime qui in capite ulcera habent, & quæcunque à frigore moriuntur, uel ulcerantur, & repentibus commotis sede purgandis, utero, uesicæ, ijs calidum amicum & iudicans, frigidum inimicum & perimens. Eodem Aph. 22.

Aqua quæ cito calet & refrigeratur, leuissima est. Eod. Aph. 26.

DE FRIGORIBVS.

FRigidum autem, conuulsiones, distentiones, liuores, rigores febriles. Eodem Aph. 17.

Frigidum inimicum, ossibus, dentibus, neruis, cerebro, spinali medullæ, calidum uero utile. Eod. Aph. 18.

Quæcunque refrigerata sunt, excalfacere oportet, exceptis his quibus sanguis fluit, aut fluxurus est. Eod. Aph. 19.

Vices

Ulceribus frigidum quidem mordax,
cutem obturat, dolorem insuppurabilem
facit, liuorem obducit, rigores febriles,
conuulsiones, distentiones. Eod. Aph. 20.

Frigida qualis nix est & glacies, pectori
inimica, tusses mouent, & sanguinem,
& distillationem. Eod. Aph. 24.

Aqua quæ cito calet, & cito refrigeratur,
leuissima est. Eod. Aph. 26.

Tumores articulorum atque dolores,
absque ulcere, & podagricos quoque & con-
uulsa, horum plurima frigida aqua large
effusa, leuat & extenuat, soluitque dolorem.
Nam modicus torpor dolorem soluit.

Homo ut primo die est calidissimus,
ita nouissimo est frigidissimus. Hip. Li-
de natura humana.

DE GERENTIBVS IN
utero.

Vtero gerentes sunt medicandæ, si
materia turget, quarto mense, & us-
que ad septimum, sed has minus. Iunio-
ra autem & seniores uereri oportet. Libro
4. Aph. 2.

Vide titulum de foetu. Item titulum de
semine humano & de conceptu.

Grauidas purgare turgente materia, à
quar

T H E S E S T O T I V S

quarto mense usq; ad septimum, minus uero has, recentiores autem & seniores uereri oportet. Lib. 5. Aph. 29.

Mulierem utero gerentem capi ab aliquo morbo acuto, letale est. Eodē. Aph. 30.

Mulier utero gerēs sanguine misso ex uena abortit, & magis si fœtus sit maior.

Mulierī in utero gerenti, si aluus plurimum profluat, periculum est, ne abortiat. Eodem. Aph. 34.

Mulierī quæ uterinis molestatur, aut difficulter parit, superueniens sternutatio, bonum. Eodem. Aph. 34.

Mulierī utero gerenti, si altera mamma gracilis fiat, geminas habenti alterā abortit. Et si quidem mām dextera gracilis fiat, marem, si uero sinistra, fœminā. Eodem. Aph. 38.

Si mulier quæ neq; grauida est, neq; conceperit, lac habet, huic menstrua defecerunt. Eod. Aph. 39.

Si uolueris nosse an conceperit mulier, cum dormitura est, ei aquam mulsam porandum da, & si alui tormina patitur, concepit, si minus, non concepit. Eodē. Aph. 41.

Mulier si marem concepit, bene colorata est, si uero fœminam, male colorata. Eodem. Aph. 42.

Si mulieri grauidæ in utero sit cræspelas, letale. Eodem. Aph. 44.

Quæcunq; præter naturam tenues existentes, utero gerunt, abortiunt, priusquã cræscant. Eodem.

Quæcunq; mediocriter corpora habentes abortiunt, secundo aut tertio mense, sine occasione manifesta, his acerbula uteri plena mucoris sunt, ut non possint ex pondere fœtum cõtinere, sed disrumpuntur. Eodem. Aph. 45.

Quæcunq; præter naturam crassæ, nõ concipiunt utero, his omentum os uteri comprimit, & priusq; extenuentur, non concipiunt. Eod. Aph. 46.

Si uterus in coxam uergens suppuratur, necesse est iuuamentum fieri. Eodem. Aph. 47.

Fœtus mares quidem in dexteris, fœminæ uero in sinistris magis. Eodẽ. Aph. 48.

Ut secunda procidat, sternutatorio apposito, & nares apprehendito & os. Lib. 5. Aph. 49.

Quæ

THESES TOTIVS

Quæ utero gerūt, his uteri os cōprimi
tur. Eodem. Aph. 51.

Mulieri utero gerenti, si lac multum ē
mammis effluet, fœtum imbecillum sig
nificat, si uero mamme solidæ fuerint, fœ
tum significat saniozem. Eodem. Aph. 52.

Quæ corrupturæ sunt fœtus, his mam
mæ extenuantur, si uero rursus duræ fi
ant, dolor, aut mammas, aut coxas, aut
oculos, aut genua infestabunt, & nō cor
rumpent. Eodem. Aph. 53.

Quibus os uteri durum est, is uteri os
comprimi est necessarium. Eod. Aph. 54.

Quicunq; utero gerentes & à febris
torrapiuntur, & fortiter calefiunt sine oc
casionē manifesta, difficulter pariunt, &
eum periculo, aut abortum facientes, pe
riclitantur. Eodem. Aph. 55.

Si mulier non concipit, scire autem ue
lis, an conceptura sit, pannis circum tectis
de super suffias, & si odor uideatur per
corpus ire ad nares & os, scito q; ipsa nō
ex se ipsa sterilis est. Eodem. Aph. 59.

Si mulieri utero gerenti purgationes
eant, impossibile est fœtum esse sanum.
Eodem. Aph. 60.

Quæcunq; frigidos & spissos uteros
ha

habent, non concipiunt, & quæcunque præhumidos uteros habent, non concipiunt, exinguitur enim in eis genitura. Et quæcunque siccos magis & adurentes, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen. Quæcunque uero ex utrisque mediocrem habent temperaturam, hæc fecundæ sunt. Eodem. Aph. 62.

Mulieri utero gerenti, si tensio superuenit, facit abortum. Lib. 7. Aph. 27.

DE MULIERIBVS.

Mulier ambidextra nõ fit. Mulier post dagra nõ laborat, nisi mēstrua defecerint. Lib. 7. Aph. 44.

Mulieribus sicciõs uictus ex usu est. Etenim cibus siccus, potio merator, carne mollibus idonea est, ad hæc secundas, et fœtui nutriendo potior est. Pol. de ratione uictus priuatorum.

Mulieribus acerum longe magis quã uiris aduersatur, utpote quarum uterum dolore cruciat. Hip. de ratione uictus in morbis acutis, Lib. 3.

DE MENSTRUIS.

Suffitus aromatum muliebria ducit, sepius uero & ad alia utilis esset, nisi capitis faceret grauitatem. Lib. 5. Aph. 28.

T H E S E S T O T I V S

Mulieri sanguinem euimenti, menstruis erumpentibus, solutio. Lib. 7. Aph. 32.

Menstruis deficientibus, sanguis ex naribus fluens, bonum. Lib. 5. Aph. 33.

Mulier menses decolores, nec per idem semper tempus uenientes, purgationem indicant esse necessariam. Lib. 5. Aph. 36.

Si mulier neque grauida est, neque peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt. Lib. 5. Aph. 39.

Mulieri si uelis menstrua cohibere, cucurbitulam quam maximam ad mammam appone. Lib. 5. Aph. 50.

In fluxu muliebri si conuulsio & animi defectus aduenerit, malum. Eodem. Aph. 56.

Si menstrua plura fiant, accidunt morbi, & si non fiant, ex utero morbi contingunt. Eodem. Aph. 57.

Si mulieri cessent purgationes, neque febris neque rigor superueniat, & fastidia incidant, iudica ipsam in utero habere. Eod. Aph. 61.

Si mulieri in utero gerenti purgationes eant, impossibile foetum esse sanum; Lib. 5. Aph. 60.

Mens

Menstruorum retentio sequentes morbos gignit, conceptum impedit, corpus calefacit, uenas implet atq; distendit, uericam premit, urinam prohibet, dolorē lumborum & suffocationem excitat, coxendicem molestat, interdum putrescit & suppurat. Hip. Lib. de fœtu.

Mulier ubi conceperit, menses non defluunt.

A menstruis repurgatæ, concipiunt facillime.

DE FOETV ET SECVNDIS.

Certo tempore mulier concipit, aut incipiente sanguine, aut deficiente. Sor.

Vide plura, titulo de gerentibus in utero, & grauidis.

Infans in utero sic continetur: Summa pars clunibus continuatur, genua oculis sunt apposita. Vnde & concaui exeunt, & genæ dicuntur.

Mulieres quæ in nauibus pariunt, multos ædunt.

Infans q̄ diu dentes non habet, uagit, ubi duos uel tres habuerit, balbutit, ubi completos habuerit, loquitur.

T H E S E S T O T I V S

Saltus in primis septem diebus perimit semen in lacellis, & eijcit. Hip. Libro de foetu.

Primiparæ, & quæ rarius pariunt, plurimum in partu & puerperio laborant, quæ uero crebrius patiunt, minus.

D E S E M I N E E T C O N
ceptu.

Quæcunq; frigidus & spissos uteros habent, non concipiunt. Et quæcunq; perhumidos uteros habent, non concipiunt, extinguitur enim genitura. Et quæcunq; siccos magis & adurentes, nam ex defectu alimenti corrumpitur semen. Quæcunq; uero ex utrisq; mediocrè habent temperaturam, hæc foecundæ sūt. Lib. 5. Aph. 62.

Similiter autè & in maribus, aut enim propter corporis raritatem spiritus extra fertur, ut semen non transmittatur ad os, uel propter spissitudinem, humor non exit foras, uel propter frigiditatem non concalescit, ut ad hunc colligatur locum, uel propter caliditatem hoc idem accidit. Lib. 5. Aph. 63.

Quibus nares natura humidiores & genitura humidior, minus integra sa
uita

nitate fruuntur, quibus uero contra, salu-
brius degunt. Lib. 6. Aph. 2.

Castrati non coeunt, nec semen emit-
tunt, Veneris insomnia patientes, coire
sibi uidentur, & semen eliciunt, quia hu-
mor, labore uel forti imaginatione cale-
factus, spumescit atq; dispergitur. Hip. Li-
de semine.

Quibus secundum aures secantur ue-
næ, coeunt quidem ac emittunt, sed pau-
lum quid & minime fœcundum.

Pueri cum uenulas tenellas, easq; ple-
nas habeant, semen non emittunt.

Semen genitale de corporis omnibus
partibus excernitur.

Et fœminæ ipsæ sperma emittunt, mo-
do in locellos, modo foras.

Vide Aristotelem in Probleumatis, &
Alexandrum.

Si crebro mares uiris misceantur, ma-
gis ualent, si raro, minus.

Et in uiro & in muliere semen marinū
& fœmineum est.

Cum ex uiri corpore plus in semen, q̄
fœminæ ueniat, partus ille pulchrior est,
patriq; similis. Cum uero plus fœminæ
uenerit, partus ille pulchrior corpore est,
matriq; similis.

T H E S E S T O T I V S

Infans nisi latum locum habeat, quo nutriatur, agitetur, crescat, macilentum fieri necesse est, utpote qui satis amplū locum ad incrementum non habeat.

Eadem ratio est, cur modo parui, modo magni nascuntur infantes.

Semper ferè sani & integri ex mutilis generantur.

Quemadmodum cucumeres & arbores, & alia quædam germina, si comprimantur & in angustis creuerint locis, partim mutilæ, partim tortuosæ proueniunt. Ita & fœtus in utero, iuxta ea quæ matri contingunt, uel mutilatur, uel non recte crescit.

Mulier cum concepit, semen extra locos non exilit. Hip. Li. de natura pueri.

Fœmina cum conceperit, menses non deflunt, siquidem fœtus sanus futurus est, præterquæ pusillum quibusdam primo mense.

Mulier à mensibus purgata est, uacua quæ eo sanguine, tum potissimum concipere idonea est.

D E A B C E S S I B V S.

Quibuscunq; resurgentibus ex morbis, si quid laborauerit, ibi fiunt abscessus.

scellus. Lib. 4. Aph. 32.

Lassitudinem habentibus in febribus in articulos et circa maxillas potissimum abscessus fiunt.

Quibus speratur abscessum futurum ad articulos, liberat ab abscessu urinamul-
ta, crassa & alba facta, qualis in laborio-
sis febribus quarto die quibusdam inci-
pit fieri, si uero etiam ex naribus fluxerit
sanguis, breui admodum solutio fit.

Quicumq; suppurati, aut aquam inter
cutem patientes, uruntur aut secantur, si
pus aut aqua uniuersim effluxerit, om-
nes moriuntur. Lib. 5. Aph. 27.

Quibuscunq; suppuratio in corpore
existens, non innotescit, his ob crassitudi-
nem puris aut loci, non innotescit. Libro
6. Aph. 41.

Quibus ob laborantem pulmonē ab-
scellus secundū aures oriuntur, & in par-
tibus infernis suppurantur, ac fistulam ef-
ficiunt, ijs secunda ualerudo contingere
solet. Præf. Lib. 2. Aph. 64.

In quibus huiuscemodi notas obser-
uabis: Si febris non conquiescit, neq; do-
lor mitigatur, si sputum non pro ratione
eijcitur, si aluus neq; biliosa, neq; liuida,

neq; sincera excernit, si in urina admodum exigua multa resident, ac reliqua quoq; signa omnia securitatem pollicentur, eiusmodi abscessus expectandi sunt.

Qui alijs quidem eueniunt in partibus, si quodammodo inflamata fuerint praecordia, alijs uero in superioribus, si praecordia neq; tumore, neq; dolore infestantur, sed accedit pro tempore spiritus difficultas, quae deinde sine ulla euidenti occasione quiescit. Aph. 66.

In uehementi periculo saeq; peripneumonia, non inutiliter in cruribus nascuntur abscessus, nec potest aliud quicquam melius accidere, praesertim si mutato sputo sic appareant. Siue autem tumor, siue dolor sentitur, sputo cruento in pus iam conuerso, excretoq; tutissimum id iudicium est. Nam & aeger a periculo liberatur, & abscessus doloris expers, celerrime acquiescit. At si neq; sputum probe excernitur, nihil residet in urina quod bonam spem fulcire uideatur, nec ex eo articulo claudicat aeger, uel plurima certe sustineat negotia, periculum est. Aph. 67.

Si uero subsederunt abscessus, sed rursus repetunt, non prodeunte sputo, ac per seue

feuerante febre, grauis tumor est, ne delirium subeat æger, aut moriatur. Aph. 68.

Sane ex suppurationibus quas pulmonum morbi concitarunt, ferè senes moriuntur, & in cæteris iuniores. Aph. 62. 69.

Lumborum, inferiorumq; partium dolores, quibus febris quoq; accidit, si ad septum transuersum eunt, relictis inferioribus, admodum perniciosi sunt. Animi ad uertenda tamè reliqua quoq; inditia sũt, si enim periculosum aliquid accesserit, hominem à spe deponit, cum urũtur suppurati, si pus fluxerit purum, candidum & sine fœtore, seruantur. Si uero subcruentum, cerosumq; pereunt, si ad septũ trãuersum ostenderit, nullo reliquorum signorum periculum ostendente, futurę supurationis indubitata spes est. Aph. 70.

Apostema in membro principali si nõ doluerit, inueterauit. Dam.

Apostema senibus non repercutiatur, ne forte non sufficiat, nam ad repercutiendum illud & digerendum. Extrahendũ autem est leui medicina, ne natura cum eo exiēs, corpus exinaniat. Est nãq; quod deperditur in senibus multum ad differentiam illius quod instauratur. Similiter &

THESES TOTIVS

in pueris, uis namq; medicinæ fortior est
natura eorum. Dam.

DE VVLNERIBVS.

Si uulneribus fortibus & prauis tumor
non appareat, ingens malum. Hip. Li.
5. Aph. 66.

Vulnera circa glabra, praua sunt. Lib. 6
Aph. 4.

Vesica discissa uel uulnerata, aut cere-
bro, aut corde, aut septo, aut aliquo ex te-
nuioribus intestinis, aut uentriculo, aut ie-
core, letale est. Lib. 6. Aph. 18.

Cum discissum fuerit os, aut carthila-
go, aut neruus, aut genæ particula tenuis,
uel præputium, neq; augetur, neq; coale-
scit. Lib. 6. Aph. 19.

Si quod intestinorū gracilium discin-
datur, non coalescit. Lib. 6. Aph. 24.

Quādo os aut carthilogo, aut neruus,
abscinditur in corpore, non augetur. Lib.
7. Aph. 28.

DE PODAGRA.

EUnuchi neq; podagra laborant, neq;
calui fiunt. Lib. 6. Aph. 28.

Mulier podagra non laborat, nisi men-
strua defecerint. Eodem. Aph. 29.

Puer podagra non laborat ante usum
uene

uenerorum. Lib. 6. Aph. 30.

Quicumq; morbi podagrici fiūt, hi se-
data in 40. diebus inflammatione, fini-
unt. Lib. 6. Aph. 49.

Dolores podagrici, uere & autumno,
magna ex parte mouentur. Lib. 6. Aph.
55.

DE ERESYPILATE.

Eresypilas ab exterioribus uerti ad in-
teriora, non est bonum, ab interiori-
bus uero ad exteriora, bonum. Libro. 6.
Aph. 25.

Ab eresypelate putredo, aut suppurati-
o. Lib. 7. Aph. 20.

In offis exutione, eresypelas.

DE FEBRIBVS.

Aestiuæ quartanæ magna ex parte bre-
ues. Autumnales longæ, & maxime
quæ hyemem attingunt. Hip. Lib. 2. Aph.
25.

Febrem conuulsioni superuenire meli-
us est, q̄ febrī conuulsionem. Eodē. Aph.
26.

Febricitantium cum omnino leuiter
permanere corpus, & nihil minui, uel eti-
am plus q̄ ratio postulat, contabescere,
malum, hoc enim morbi lōgitudinem,
hoc

THESES TOTIVS

hoc uero imbecillitatem significat.

Dum pus conficitur, dolores ac febres accidunt magis. Lib. 2. Aph. 47.

Quibus in febribus sexto die rigores fiunt, difficile iudicium sequitur. Libro 4. Aph. 29.

Quibuscunq; accessiones fiunt, quacūque hora febris dimiserit, si eadē cras occupauerit, iudicium habent difficile. Eodem. Aph. 30.

Lassitudinem habentibus in febribus, in articulos, & circa maxillas, potissimū abscessus fiunt. Lib. 4. Aph. 31.

Sudores febricitanti, si inceperint boni, & 3. & 5. & 7. & 9. & 11. & 14. & 17. & 20. & 27. & 34. hi enim sudores indicant morbos. Qui uero nō ita fiunt, laborem significant, & morbi lōgitudinem & recidiuam. Eodem. Aph. 36.

Frigidi sudores cum acuta quidem febre mortem, cum mitiori autem longitudinem morbi significant. Eod. Aph. 37.

Febres quacūq; non intermittentes, tertia die fortiores fiunt magis periculosa. Quocumq; autem modo intermiserint, periculum abesse significatur. Eod. Aph. 43.

Qui

Quibus febres longæ, his tubercula uel labores in articulis fiunt. Eod. Aph. 46.

Si rigor incidat febre non deficiente, ægro non debili, letale est. Eod. 46.

Excreationes in febribus non intermittentibus, liuidæ, cruentæ, foetidæ, omnes malæ & biliosæ, & si bene exeunt, siue per alui excretionem, siue per urinas, bonæ. Si uero non aliquid eorum, quæ iuuant, per hæc loca excernitur, malum. Eodem. Aph. 47.

In febribus non intermittētibz, si partes exteriores frigidæ, interiores uruntur, & sitim habeat, letale est. Eod. Aph. 48.

In febre non intermittente, si labrum uel oculus, uel nasus, uel supercilium perueratur, uel non uideat, uel non audiat, iam debili existente corpore, quicquid horum euenerit, mors proxima est. Eodē. Aph. 49.

Vbi in febre non intermittente, difficultas spirandi, uel delirium acciderit, letale. Eodem. Aph. 50.

In febribus abscessus qui ad primas iudicationes non soluunt, longitudinem morbi significant. Eod. Aph. 51.

Quicumq; in febribus uel in alijs morbis,

T H E S E S T O T I V S

bis, sponte illachrymant, nihil absurdū,
qui uero non sponte absurdus. Eodem.
Aph. 52.

Quibus circa dentes in febribus quidā
lentotes nascuntur, his fortes sunt febres.
Lib. 4. Aph. 53.

Quibus plurimum sicca tusses, leuiter
irritates in febribus ardentibus fiunt, nō
multum siti infestantur. Eod. Aph. 54.

Exinguinū tumoribus febres, omnes
malæ. Eodem. Aph. 55.

Febricitanti sudor superueniens, febre
nō deficiente, malum, prorogatur enim
morbus, & multam significat humidita-
tem. Eodem. Aph. 56.

Qui à conuulsione aut distēione ner-
uorum tenetur, febre superueniente libe-
ratur. Eodem. Aph. 57.

Febre ardente habito, rigore superue-
niente, solutio. Eodem. 58.

Tertiana exquisita septenis circuitibus,
quod longissimum est, iudicatur. Eodē.
Aph. 59.

Quibus in febribus aures obsurduerūt,
sanguis ex naribus fluens, aut alius tur-
bata, soluit morbum. Eodem. Aph. 60.

Febricitantem nisi diebus imparibus
fe

febris reliquerit, solet recidiuare. Eodem
Aph. 61.

Quibus in febribus morbus regius an
te diem septimum accidit, malum. Libro
4. Aph. 62.

Quibus in febribus quotidie rigores fi
unt, soluuntur. Eodem Aph. 63.

Quibus in febribus morbus regius, se
ptimo uel 9. uel 11. uel 14. superuenerit, bo
num, nisi dextrum ilium obduruerit. Si
uero non, bonum. Eodem Aph. 64.

In febribus circa uentriculum fortis æ
stus, & cordis morsus, uel dolor, malum.
Eodem Aph. 65.

In acutis febribus conuulsiones, & cir
ca uiscera dolores fortes, malum. Eodem
Aph. 66.

Quibus speratur abscessum futurum
ad articulos, liberat ab abcessu urina mul
ta, crassa & alba facta, qualis in laborio
sis febribus, quarto die quibusdam inci
pit fieri, si uero ex naribus fluxerit sanguis
breui admodum solutio fit. Eodem.

Quibus ilia suspensa, murmurantia, lū
borum dolore superueniente, ijs alui hu
mectantur, nisi flatus corrumpant, aut u
tina multitudo proueniat, hoc uero in
fe

T H E S E S T O T I V S

febris. Lib. 4. Aph. 73.

Quæcunq; utero geretes à febris corripuntur, & fortiter calefiunt, sine occasione manifesta difficulter pariunt, & cū periculo, aut abortum facientes periclitantur. Lib. 5. Aph. 55.

Lac dare caput dolētibus malum, malum uero & febricitantibus, malum item quibus in febris acutis biliosæ sunt deiectiones, & quibus sanguinis multi facta deiectio est. Conuenit autem & tabidis dare, qui non ualde multum febricitant, & in febris lōgis & paruis, si multum ex supradictis signis affuerit, & præter rationem consumptis. Eod. Aph. 64.

A quartanis capti non admodum à cōuulsionibus capiuntur. Lib. 5. Aph. 70.

Qui in febris ardentibus tremores fiunt, delirio soluantur. Lib. 6. Aph. 26.

Quibus dolor circa ilium fit absq; inflammatione, his febris superueniens, morbum soluit. Lib. 6. Aph. 40.

In acutis passionibus quæ cum febre sunt, luctuosa suspiria, malum. Eodem. Aph. 54.

Quibuscunq; febricitantibus in urinis sunt sedimina, ueluti farina crassior, longam

gam ægritudinē fore significat. Libro 7.
Aph. 31.

Quibus autem biliosa sedimina, ut supra tenuia, acutum morbum significat.
Lib. 7. Aph. 32.

In febribus ex somnis tumores uel conuulsiones, malum. Lib. 4. Aph. 67.

In febribus spiritus offendēs, malum, conuulsionem etiam significat. Libro 4.
Aph. 68.

Si febris non ex bile habeat, multa aqua calida capiti superinfusa, solutio fit febris. Lib. 7. Aph. 43.

Si quis cibum febricitanti dederit, ut sano robur, sic laboranti morbus. Lib. 7.
Aph. 63.

Excreationes in febribus non intermittentibus, liuidæ, sanguineæ, biliosæ, foetidæ, omnes malæ. Cum uero bene excernuntur, bonum est, & per uentrem & per uesicam, & ubi aliquid secedens steterit, non purgatum, malum.

In febribus non intermittentibus, si exteriora frigent, interiora uruntur, et febris habeat, letale. Lib. 7. Aph. 69.

In febre non intermittente, si labrum aut nasus, aut oculus, aut supercilium per
o uerti

T H E S E S T O T I V S

uertitur, si non uideat, si non audiat, & iã debilis sit, quicquid horũ sit, mors prope est. Lib. 7. Aph. 70.

Febres, siue sanus quis ab ipsis euadat, siue pereat, æquali dierum numero finiuntur. Præf. Lib. 3. Aph. 1.

Vt enim saluberrimæ febres quæ uide licet tutissimis fulciuntur notis, die quarto uel antea quiescere solent, ita pessimæ quæq; & quibus periculosissima adsunt signa, die quarto uel citius interficiant. Aph. 2. 3. Eodem.

Primus itaq; eorum insultus ita finitur, alter in septimum diem producitur, tertius in undecimum, quartus in decimum quartum, quintus in decimumseptimũ, sextus in uigesimum. Igitur accessiones ex acutissimis morbis per quatuor, in uiginti auctæ finiuntur. Verum huiuscemodi suppuratio, per dies integros nimirũ fieri non potest, quippe cum nec annus, nec menses ipsi, integris numerentur diebus. Aph. 4. 5.

Deinde eadem ratione atq; additione, primus circuitus, ad quatuor & triginta, alter ad quadraginta, tertius ad sexaginta dies perueniet. Aph. 6.

Sed

Sed huiusmodi morbos, qui longiori spatio finire debent, ab initio perq̄ difficile est discernere, q̄ similia sint eorū principia. Animaduertere tamen à prima die oportet, atq; singulos dierum quaterniones obseruare, sic enim haud obscure scies, quo se cōuersurus sit morbus. Ac quatenus quoq; conditio hunc seruat ordinē. Aph. 7. 8.

Morbi autem tempore breuissimo finem attingentes facilius dignoscuntur, utpote, qui maximis protinus ab initio distinguuntur differentijs. Si quidem ad sanitatem tendentes facile spirant, nō dolent, dormiunt noctu, ac reliqua quoq; signa, maximam eis securitatem pollicentur. Perituri uero difficulter spirant, delirant, uigilant, ceteraq; id genus pessima signa eis accedunt. Aph. 9. 10.

Ut igitur, his sic se habētibus, morbos, ac iudicium tendentes, coniectura confecti oportet, & ex tempore, & ex singulis additionibus, ita eadem quoq; ratione, in mulieribus, morborum iudicia, à paratu numeranda sunt. Aph. 11. 12.

Capitis in febre uehementes, perpetuiq; dolores, accedente letalium notarum

THESES TOTIVS

aliqua, ualde sunt perniciosi. Si uero nullo tali signo apparente, diem uigesimum dolor excefferit, neq; febris conquiescat, ex naribus sanguinis fluorem, aut in partibus inferioribus abscessum expectabimus. Similiter dolori etiam recenti, sanguinis profusio ex naribus, aut suppuratio superuenire solet, præcipue si dolor, & tempora & frontem infestauerit. Aph. 13. 14.

Maxime uero sanguinis fluxio expectanda est in iuuenibus, qui quintum & trigessimum annum nondum superauerunt. Nam maioribus nati, suppuratio ferè oritur. Aph. 14.

Auris dolor acutus cum febre non intermittente, uehementiq; graue periculum minatur. Nam & mentem turbat, & hominem rapit. Quum igitur anceps sit huius rei exitus, à primo protinus die, omnibus signis accurate animum adhibere oportet. Nam ex eo casu, iuniores quidem intra septimum diem, seniores uero multo tardius moriuntur, quippe qui non eoque magnas febres experiuntur, neq; adeo insanunt. Proinde sustinere possunt, donec sustinetur affectus. Quòd si morbus

in

in hac ætate reuertatur, magna ex parte interficere solet. Sed iuniores anteq̃ auris suppuretur, pereunt, nisi pus candidū ab ea diffluens, securitatem polliceatur, præsertim ubi salutarium quoq̃ signorū aliquid apparet.

Neq̃ leuiter terreri debemus, ubi febricitanti fauces exulcerantur, cui si aliud quoq̃ ex malis signis quæ supra declarauimus, accesserit, in periculo hominem uersari, denuntiandum est. Aph. 17.

DE ANGINA.

Angina periculosissima est, celeriterq̃ enecat, si neq̃ in faucibus, neq̃ in ceruice quicq̃ apparet, si dolor uehemens est, si uix spiritus trahitur. Etenim eodem die iugulat, licet interdum usq̃ ad secundum, aut tertium, aut etiam quartū protrahitur. Præf. Lib. 3. Aph. 18.

Quæ uero in reliquis quidem non minore dolore afficit, in faucibus uero tumorem, ruboremq̃ excitat, superiori non minus periculosa est, sed lōgius spatium habebis, præcipue si uehemens fuerit rubor. Aph. 19.

Sed tum præcipue malum prolongatur, quum non solum fauces, sed ceruices

THESES TOTIVS

quoque rubor occupat, maxime uero potest secunda ualetudo contingere, si rubor simul & ceruicem & pectus comprehendat, neque ad interna reuertatur erysipelas. Aph. 20.

Cum uero deletur erysipelas, sed non in decretorijs diebus, neque in exteriores partes conuertitur tumor, neque pus screeatur, sed leuis & à dolore immunis uideatur, id aut mortem significat, aut dolorem reuersum. Aph. 21.

Turcius est & tumorem & ruborem, in externas maxime partes conuerti. Si uero ad pulmonem conuersio fiat, dementia excitabit, quanquam nonnulli sic affecti, magna ex parte suppurantur. Aph. 22.

Gurgulio si cum rubore tumescit, sine periculo præcidi non potest, etenim inflammatio, sanguinisque profusio ei accidit. Proinde satius est, alijs quibusdam auxilijs uti, quibus extenuare possit. Quum uero pallidior efficitur, uua nominari solet, quod si tum una eius pars crassa & rotunda, summa uero tenuis uideatur, intrepide præcidi debet. Satius tamen fuerit, antea quam manus adhibeatur, alium uacuare si tempus id ita permittat, ut interim suffocatur.

focatio hominem non preoccupet. Aph.
23.

Quibus febres neq; salutaribus notis
apparentibus, neq; in diebus decretorijs
conquiescunt, ij reuersionem timere de-
bent. Aph. 24.

In longa febre, ex qua tamen æger libe-
rari potest, si neq; ob inflammationem,
neq; ob aliam ullam manifestam causã,
dolor infestat, aut tumidum aut doloro-
sum in articulis abscessũ expectare oportet,
præcipue in imis partibus, maxime
uero in his ætatibus, quæ triginta annos
non excefferunt, eiusmodi abscessus na-
sci consueuerunt, idq; in tempore breui-
ori. Aph. 25. 26.

Non tamen expectandus est abscessus
donec uigesimam diem febris præterie-
rit, is natu maioribus raro accidit, quãuis
longo spatio duret febris. Aph. 27. 28.

Solet etiam continuis febribus absces-
sus superuenire. Interpellata uero febris,
eodemq; errabunda, in quartanam mu-
tabitur, præcipue si autumnus proximus
est. Aph. 29.

Atq; ut abscessus oriuntur in his, qui tri-
ginta annis minores sunt, ita quartana e-

T H E S E S T O T I V S

os qui trigessimum annum aut agunt aut
excesserunt, præcipue corripit. Aph. 30.

Igitur scire licet, abscessus hyeme ma-
gis accidere, serius finire, sed nõ facile re-
uerti. Aph. 31.

Si cuiquam in non letali febre, caput
dolet, aut ante oculos obscura quædam
obuersantur, aut cordis dolor accidit, is-
tilem euomet. Si uero horruerit, & inferi-
ores præcordiorum partes frigore affici-
antur, citius ad uomitionem properabit.
Quòd si eo tempore quippiam aut bibe-
rit, aut æderit, id quoq; cælestrime euo-
met. Aph. 32.

Quibus itaq; à primo protinus die do-
lor superuenerit, ijs quarto & quinto die
ingrauescit, mox in septimo liberantur.
Sunt non pauci qui tertio die dolere inci-
piunt, quinto maxime molestantur, de-
inde nono uel undecimo tuti euadunt.
Sed quos dolor quinto die uexare cœpe-
rit, reliqua ex proportione respondeat,
ijs decimoquarto die finitur morbus.
Hæc tum uiris, tum mulieribus, sed in ter-
tianis maxime contingere solent. Iunio-
ribus uero cum in ijs ipsis, tum præcipue
in continuis febribus, atq; tertianis synce-
ris

ris. Aphor. 33. 34.

Itaq; quibus in huiuscemodi febre ca-
put dolet, oculi uero obscuras illas imagi-
nes non uident, sed caligatione hæbetan-
tur, aut splendètia quædam cernere se pu-
tāt, ac pro cordis dolore, in alterutra par-
te præcordia tenduntur, ac neq; dolor in-
festat, neq; inflammatio, ijs pro uomitu
sanguis è naribus profluat, id quod præ-
cipue iunioribus accidit. Si uero, trigesi-
mum annum uel agunt, uel superauerūt,
uomitum potius q̄ sanguinis fluorem ex-
pectabimus. Aph. 35.

Si pueris in acuta febre alius nihil deij-
cit, neq; somnus accedit, sed terrètur, flēt,
color mutatur, ut modo pallidus, modo
liuidus, aut ruber efficiatur, neruorum di-
stentio timeri debet. Vtpote quæ pueros
qui septimum annum nondum excesser-
unt, quàm promptissime inuadit. Gran-
diusculos uero pueros atq; adultos, non
adeo in febribus neruorum distentio præ-
hendit, nisi uehementis admodum ma-
litiæ signum aliquod adfuerit, qualia ui-
delicet in phreneticis uidentur. Aph. 36.

Ergo ex omnibus signis, ut de singulis
morbis singula præscripta sunt, & mori-

T H E S E S T O T I V S

turos, & eos qui ad bonam ualitudinem redire poterunt, siue pueri sint, siue uatu maiores, sic conijcere oportet. Aph. 37.

Atq; hæc de acutis morbis, atq; de ijs quæ ab eis nascuntur, dixisse uelim. Aph. 39.

Cæterum si recte discernere uolueris; & morituros, & eos qui à periculo tuti sunt, & quis morbus longo, & quis breui ori spatio finietur, disce omnium signorum inter se collatorum uires (ut supra demonstrauimus) accurate iudicare, tum aliorum, tū præcipue urinæ, ac sputi, quum scilicet simul & pus & bilem æger creat. Item superuenientium quoq; morborum impetum, ac temporum anni conditionem accurate obseruare oportet. Aph. 39. 40.

Postremo quod ad coniecturas, reliquaq; signa pertinet, haud quæ uel ignorandum uel negligendum est, quod quouis anno, & quouis anni tempore, mala signa timorem, utilia uero bonam spem denuntiant. Etenim in Libya & Delo, atq; Scythia, proposita iam signa, uera esse comprobauimus. Aph. 41. 42.

Vnde scire licet, in ijsdem terris, mul-

to plura quæ supra proposuimus, illum facile assequi posse, qui ea recte & iudicare et perpendere didicerit. Aph. 43.

Sed nullius morbi hic non descripti, nomen desiderandum est. Nam omnes qui in dictis temporum spatijs morbi fiunt, isdem quoque inditijs discernuntur. Aph. 44.

Febbris cholericæ superflua frigiditate ne repercutiatur, neque quartana cum frigiditate humectante. Dam.

Magna ex parte febres à bile sunt. Hip. Lib. de natura humana.

Continens febris à copiosissima atque meracissima bile fit, & per quæ breui iudicatur, quoniam corpus à uehementi calore, firmefactum, dum nullo temporis intervallo refrigescit, celeriter soluitur et absimitur.

Quotidiana à secundum continentem à largissima bile fit, & ex omnibus alijs citissime euincitur, longior est continente, quo pauciore ex bile uenit, tum quia corpus propter intermissionem requiescit.

Tertianæ diuturnior est quæ quotidiana, quia à minore bile accedit, quanto plus in tertiana quæ in quotidiana corpus requiescit,

T H E S E S T O T I V S

escit, tanto diuturnior est q̄ quotidiana.

Quartana diuturnior tertianis est, tum quia minus bilis habens æstum afferentis, tum quia corpus amplius refrigerat, quod ab atra bilie id superantis materiae proficiscitur, ac difficulter euellitur.

Humor quartanae febris occasio, quia lentissimus est & glutinosissimus, diuturnioresq̄ quoq̄ sedes constituit.

Homines autumnali potissimum tempore, & in ætate uiginti quinque annorum usq̄ ad quadragesimum quintum annu, qua ex omnibus ætatibus, maxime atrabile detinetur, corripuntur quartanis.

Quibus ultra id tempus, citraue ea febris accesserit, pro comperto habere debes minime diurnam fore.

Si febris aliquem inuadit, uetere nondum deiecto stercore, aut nuper accepto cibo, is siue lateru dolor infestet, siue non quieti permittendus est, donec ad imum uentrem cibus primo descenderit, ac sub inde acetum mulsum in potu sumat. Hip Lib. 4. de ratione uictus in morbis acutis.

Cum uero grauitas ad lumbos usq̄ descenderit, tum uel clysterem adhibere, uel medicamento purgare conuenit, mox a
purg

purgatione uictum instituire.

Cum à uacuatione sorbitiones exhibere uolueris, obserua februm accessiones, ut neq; cum adsunt, neq; cum uenturae sunt, eas ingeras, sed cum iam finitae sunt, aut conqueuerunt, & cum maxime ab initio distare uidentur.

Pedibus frigore affectis, neq; sorbitionem, neq; aliud quicq; dato, sed maximū te praesidiū attulisse putato, si donec percalefacti fuerint, expectaueris, deinde sic utile quippiam exhibueris. Siquidem refrigerati pedes, magna ex parte, affuturae febris accessionem significant, quo tempore si cibum ingesseris, omnia maximo errore turbabis, ut quo non parum auxeris morbum.

Cuius in pedes calor rursus descendit, nisi sudare uideatur aeger, emissio prius lotio, sorbitionem dare oportet.

Quibus per febres aluus assidue solutio est, his utilius est pedes calefacere, ceromata adhibere, et fasciis inuoluere, nec unq; committere, ut reliquo corpore ipsi sint frigidiores, ubi uero calent, calorificis opus non est, sed ne refrigescant, cauedum.

T H E S E S T O T I V S

Febricitantes non pauci, quibus alius
liquida est, & mens turbata, floccos de-
cerpere, nares fodere, interrogati parum
respondere, neq; sua sponte quicquam a-
ptum dicere solent.

Quibus inter febrium initia, uertigi-
nes & capitis pulsationes accidunt, fue-
rintq; urinæ tenues, ijs febris imperus a-
pud iudicationem expectanda est, quod
si tum delirent, nihil mirandum est.

Quibus incipiente morbo, urina cras-
sa est, ac ueluti nubeculæ in ipsa suspen-
duntur, eos purgare conuenit, si nihil ali-
ud obtiterit.

Qui uero tenues urinas ab initio min-
gunt, medicamento purgandi nõ sunt,
sed clysterem adhibendo tractandi sic
sunt. Vide inibi loco citato quædam pul-
chra.

Quibus molestæ febres sunt, & precor-
diatenduntur, & in cubili eodem se posi-
tu continere nequeunt, atq; extremæ mem-
brorum partes infrigidantur. Hi accurat-
ta obseruatione indigent, & ad quietem
impellendi sunt.

Inconstantes febres sinere oportet, do-
nec in ordinem redigantur, deinde & ui-
tus

ctus rationem, & aptam curationem eis adhibere oportet.

Si hyemali febricula laboranti, lingua scabra sit, animusq; deficit, quamq; quietior febris uideatur, nihilominus tamen imperare debet in aëdia, ab aqua quoque & aqua mulsa arcendus est.

Cum terrificum quidpiam febribus superuenerit, fuerintq; ipsæ quintanæ, & aluus de repete liquida, accedit animi defectio & taciturnitas, & neruorum distentio & singultus, his angor euenire solet ac sudor circa mustacem frontem & ceruicem, & ab occipitio, paulo postq; inflati, moriuntur.

DE TUBERCULIS.

Vbi fauces ægrotant, aut tubercula nascuntur in corpore, excreationes inspicere oportet. Nam si biliosæ fuerint, corpus uia ægrotat, si uero similes sanis, tutum est corpus nutrire.

Quibus febres longæ, his tubercula uel labores in articulis fiunt. Lib. 4. Aph. 44.

Quibus tubercula, uel in articulis labores fiunt, ij pluribus utuntur cibis. Lib. 4. Aph. 45.

Exinguium tumoribus febres omnes malæ

THESES TOTIVS

malæ, præter diarias. Lib. 4. Aph. 55.

Tumores articularũ atq; dolores absq; ulcere, & podagricos quoq; atq; conuulsa, frigida aqua large effusa, leuat & extenuat, soluitq; dolorẽ. Nam modicus torpor dolorem soluit. Lib. 5. Aph. 25.

Quibus tumores in ulceribus apparẽt, non conuelluntur maxime neq; insaniunt. Verum hijs euanescentibus de repente quibusdam in tergo conuulsiones & distentiones fiunt, quibusdam aut̃ insania, uel dolor laterum acutus uel suppurationo uel difficultates intestinorum si tumores sunt rubicundi. Lib. 5. Aph. 65.

Si uulneribus fortibus & prauis tumor non appareat, ingens malum. Lib. 5. Aph. 66.

Lata pustulæ non admodũ pruriunt. Libro 6. Aph. 9.

At tuberculi intus rptione expolatio, uomitus aut animi defectio fit. Li. 7. Aph. 8.

Ab angina habito tumor & rubor in pectore superueniens bonũ, extra enim uertitur morbus.

Tumoris cordis præsagia, uide titulo de præcordijs. Lib. 7. Aph. 50.

DE DOLORE.

Quicumq; dolentes parte aliqua corporis, omnino dolorem non sentiunt, his mens agrotat. Hip. Lib. 2. Aph. 6.

Duobus doloribus simul eundem locum infestantibus, uehementior alterum obscurat. Lib. 2. Aph. 46.

Dum pus conficitur, dolores ac febres accidunt magis, quã non confecto. Lib. 2. Aph. 47.

In omni corpore ubi laborare coeperit, quies statim lassitudinem aufert. Lib. 2. Aph. 48.

Quibus tormina & circa umbilicum labores, & lumborum dolor, qui neq; à medicamento, neq; aliter soluitur, in aquã aut inter cutem siccam firmatur. Libro 4. Aph. 12.

Non febricitantibus si tormina acciderint, & genuum grauitas, & lumborum dolor purgare inferius oportere significat. Lib. 4. Aph. 20.

Super præcordia dolores, purgatione indigere per superiora significat, quicumq; uero per inferiora molestant, inferiora. Li. 4. Aph. 18.

Quibuscumq; resurgētibus ex morbis,

THESES TOTIVS

si quid doluerit, hic fiunt abscessus. Libro
4. Aph. 32.

Sed & si ante morbū aliqua parte do-
luerit, hic morbus firmatur. Eodem. Aph

33.
Si à febre habito collum peruertitur, &
nix potest deuorare sine ullo tumore, le-
tale. Eodem. Aph. 35.

In febribus circa uentriculum, & fortis
æstus, & cordis morsus, uel dolor, malū.
Eodem. Aph. 55.

In acutis febribus convulsiones, & cir-
ca uiscera dolores fortes, malum. Eodem
Aph. 66.

Dolores uentris sublimes, tenuiores, qui
uero non sublimes, fortiores. Li. 6. Aph. 7

Dolores qui sunt in lateribus & pecto-
ribus, atq; alijs partibus, si multum diffe-
rant, perdiscendum. Li. 6. Aph. 5.

Quibus dolor circa ilium fit absq; in-
flammatione, his febris superueniens,
morbum soluit. Eod. Aph. 40.

Dolores podagrici, uere & autumnno
magna ex parte moriuntur. Eod. Aph. 31.

De dolore coxendicum, uide titulo
Coxendix.

Auentris dolore diuturno, suppuratio

No. Libro septimo Aph. 22.

In forti dolore uentris, partium extre-
marum frigiditas, malum. Lib. 7 Aph. 26.

Lateris dolores, non abs te fuerit tepi-
dis fomentis dissoluere, uidelicet aqua
calida in utre, uel uesica, uel uasculo aereo
adhibita, uel spōgia mollis ex aqua cali-
da repressa. Hip. de ratione uictus in mor-
bis acutis.

Vbi fomentis dolor sedatus non est,
non diutius calorificis utē dum est, ne uel
pulmonem exiccent, uel suppurationem
excitent.

Cum ad iugulum dolor extenditur,
aut grauitas, uel brachium uel mammil-
lam, aut partes quæ supra transuersum se-
ptum sunt, infestat, interna cubiti uena se-
canda est.

At si eas partes quæ sub transuerso se-
pto sunt, dolor afficit, sed ad iugulū non
ascēdit, tum uel nigro ueratro uel peplo
aluis dūcenda est.

Dolores qui ab itinere proueniunt, uel
in lateribus, aut in dorso, aut lumbis, aut
coxis, ac si quis inter spirandum dolet, a-
liqua habita occasione (nam sæpenumē-
ro, lumborum, coxarumq; dolores ex cra-

THESES TOTIVS

pula, & cibis infantibus peruenire solent
itaq; qui huiusmodi accidentibus affici-
untur, urinam difficulter reddunt. Horu
enim caussa est iter, ac præterea distillati-
onum quoq; & taucedinis.

DE SPASMO.

Qui à conuulsione aut distentione
neruorum tenetur, febre superueni-
ente, liberatur. Lib. 4. Aph. 57.

In acutis febribus conuulsiones, & citè
ca uiscera dolores fortes, malum. Eodè.
Aph. 57.

In febribus spiritus offendens, malum,
conuulsionem enim significat. Eodem.
Aph. 68.

In febribus ex somnis tumores, uel cō-
uulsiones, malum. Eodem. Aph. 67.

Conuulsio ex helleboro, letalis. Lib. 5.
Aph. 1.

Conuulsio ex uulnere letalis. Eodem.
Aph. 2.

Vbi sanguis plurimus fluxerit, singul-
tus aut conuulsio superueniens, malum.
Eodem. Aph. 3.

Vbi ex superflua purgatione conuul-
sio, aut singultus superueniens, malum.
Eodem. Aph. 4.

Si ebrius quispiam repente obmutue-
rit, conuulsus moritur, nisi febre corripia-
tur, aut ubi ad horam peruenerit, qua sol-
nuntur crapulæ, uocem recuperet. Eodē.
Aph. 5.

Quicumq; à distentione corripuntur,
in quatuor diebus pereunt, si uero has ef-
fugerint, sani fiunt. Eodem. Aph. 6.

Frigidum, conuulsiones, distentiones,
liuores, rigores febriles. Eodem. Aph. 17.

Vbi in distentione siue ulceratione, iu-
uene bene carnosio, æstate media, frigide
aquæ multa perfusio, calorem reuocat,
calor autem hæc soluit. Eodem. Aph. 21.

In fluxu muliebri si conuulsio & ani-
mi defectus aduenerit, malum. Eodem.
Aph. 56.

Quibus tumores in ulceribus apparēt,
non conuelluntur maxime, neq; insani-
unt. Eodem. Aph. 65.

Verum his euanescentibus, de repente
quibusdam à tergo conuulsiones & distē-
tiones fiunt, quibusdam autem insania,
uel dolor laterum acutus, uel suppara-
tio, uel difficultas intestinorum, si tumo-
res sunt rubicundi.

A quartanis capti non admodum à cō

T H E S E S T O T I V S

convulsionibus capiuntur, si uero prius capi-
antur, & quartana superuenerit, liberantur.
Eodem Aph. 70.

Convulsio fit uel ex repletione, uel in-
anitione, ita uero & singultus. Li. 6. Aph.
39.

A profluuio sanguinis desipientia uel
convulsio, malum. Lib. 7. Aph. 9.

Ab ileo, uomitus, singultus, desipientia,
ac convulsio, malum. Eod. Aph. 10.

Ab æsculis fortibus convulsio aut diste-
tio, malum. Eodem Aph. 13.

In uigilia convulsio uel desipientia.
Eodem Aph. 18.

Ex medicamenti potione convulsio,
letalis est. Eodem Aph. 25.

Mulieri uero gerenti si tensio superue-
nerit, facit abortum. Eodem Aph. 27.

D E S O M N O E T V I G I L I A .

Somnus, uigilia, utraq; modum exce-
dentia, morbus. Li. 7. Aph. 68.

Quod ad somni rationem pertinet,
quemadmodum sani etiam solent, inter
diu uigilare, noctu uero dormire oportet,
in qua consuetudine si quis aberrauerit,
peior erit somnus, qui inter quartam ho-
ram

tam & noctem, q̄ qui matutino tempo-
re ad quartam. Pessimum tamen est, si so-
rnus neq; noctu, neq; interdiu accedit,
id enim uel ob dolorem, laboremq; acci-
dit, uel delirium futurum significat.

Præs. Lib. 1. Aph. 11. & 12.

D E S U P P U R A T I O N E .

DE suppuratione uide plura titulo de
Abscessibus & tumoribus. Item titu-
lo de præcordijs.

Suppurationum obseruatio sic accipi-
enda est: Earum enim quæ in exteriorem
partem erumpunt, optimæ sunt parua,
admodum eminentes, atq; in acutum fa-
stigiata, pessimæ uero sunt quæ maxime,
quæq; planissimæ sunt. Præs. Lib. 1. Aph.

44. Sed illarum quæ intus excitantur, opti-
mæ censentur, quæ exteriorem cutem nõ
decolorant, & contrahuntur, nulloq; do-
lore eruciant, atq; ubi exterioris cutis co-
lor, maxime uniformis. Præs. Lib. 1. Aph.

45. Pus illud optimum est, quod albū &
leue est, & haud quaq; foetet, quod uero
ab hoc uariatur, pessimū est. Eodem. Aph.

46. Pus illud optimum est, quod albū &
leue est, & haud quaq; foetet, quod uero
ab hoc uariatur, pessimū est. Eodem. Aph.

T H E S E S T O T I V S

Vide supra de pure & sputo.

Dolores in dictis sedibus, quos neque sputi purgatio, neque soluta aluus, neque sanguinis missio, neque medicamentum, neque uictus ratio, sedare potuit, scire licet, eos ad suppurationem tendere. Præf. Li. 2. Aph. 52.

Suppuratio erumpens, sputo adhuc bilioso apparente (siue bilis seorsum, siue una cum pure expuatur, admodum perniciosa est, præsertim si à die morbi septimo incœperit, pus ab huiusmodi sputo pure procedere. Aph. 53. 54. 55.

Itaque timendum est, ei qui sic expuit, ne decimoquarto die moriatur, nisi salutiferum aliquod iudicium interea superueniat. Consule titulum de uitijs pulmonis.

Porro bonæ spei signa sunt, si ager bene sustinet morbum, si facile spirat, si dolor leuatus est, si sine difficultate sreat, si corpus æqualiter molle & calidum est, neque sitis infestet, præterea urina, alui sedimina, somni, sudores, ut de singulis supra demonstrauimus, probe respondet, quorum si nullum deest, haudquaquam eger morietur. Contra si intollerabilis est morbus, si halitus magnus & frequens est,

est, neq; mitigatus est dolor, uix sputū red-
ditur, litis uehementer cruciat, febris inæ-
qualiter corpus afficit, si deniq; uenter &
latera uehementer calet, fronte, manus et
pedibus frigore affectus, atq; urina & al-
ui excrementa, & somni & sudores, ex su-
pra positis notis periculum minitantur.

Quicquid horum iam dicto sputo super-
uenerit, aut 9. aut 11. die ægrum moriturū
significat, ita ut 14. non queat attingere.

Huiusmodi coniectura letale sputum cō-
sequi oportet, q̄ uidelicet ad 14. diem æ-
grum uiuere non permittit. Ex prædictis
itaq; signa tum bona tum mala propen-
dere, ac subinde futura prædicere oportet.
Aph. 56.

Reliquæ autem uomice magna ex par-
te rumpuntur, sed aliæ in die 20. aliæ 30.
aliæ 40. nonnullæ ad 60. usq; perueniūt.
Aph. 57.

Proinde suppurationis initium obser-
uare oportet, quod ab eo die putandum
est, quo primum quis aut febricitauit, aut
inhorruit, aut pro dolore grauitatem, illi-
us partis sensit, quam antea dolor infesta-
bat. Nam talia in suppurationum initio
incidere solēt, ab hoc igitur tempore, usq;

T H E S E S T O T I V S

ad iam definita spacia uomicarum eruptiones expectanda sunt. Aph. 58.

An uero alteram duntaxat partem uomica occupet, ex his ferè notis perpendere licet, si alterum latus dolore cruciatur, & altero calidius est. Atq; ubi partem sanam aliquis decubuit, interrogatus onerari eam, ueluti ex pondere aliquo respondeat. Aph. 59.

Suppuratos omnes hoc pacto deprehendes, si febris non dimittit, eaq; interdum lenior est, noctu increfcit, multus sudor oritur, tussendi cupiditas est, sed nihil pene excreatur, oculi cauantur, malæ rubent, ungues in manibus, digitum maximeq; summi calent, pedes tument, cibi fastidium est, pustulæ toto corpore nascuntur. Atq; diurnarum uomicarum hæ notæ sunt, quibus haud dubia fides adhibenda est. Sed quo breviori spatio duratura sint, ex iisdem notis deprehenduntur, itaque ex his quoq; quæ in principio adparere solent, simul si spiritus maiori cum difficultate trahitur. Aph. 60. 61.

Celeriore, tardiorémue eruptione ita conicies, si protinus ab initio cussis fuerit, & spiritus difficultas, atq; sputi excretio

tio, uomica inter 20. diem erumpit. Cate-
raq̄ illi ex proportione respondeant, feri-
us ruptura sequetur, quo tempore & do-
lorem, & spirandi difficultatem minui,
atq; sputi sreatum increfcere, ante uideli-
cet puris eruptionem necesse. Aph. 62.

Cæterum a periculo tuti sunt, quibus
eodem die, quo eruptio facta est, febris
conquieuit, desieruntq; urgere, cibi fasti-
dium & sitis, alius exigit quædam & si-
gurata reddit, pus album, leue, simplici
colore, & sine pituita est, atq; sine dolore
leni tussicula eijcitur. Hæ sunt notæ per-
quàm salubres, quæ celeriter liberant ho-
minem, ab ijs securitatem quoq; pollicen-
tar, quæ ad ipsam proximè accedunt. At
certum periculum est, si febris non quie-
nit, aut pus quietem repetit. Item, si sitis
est, si cibi fastidium, si uenter liquidus, si
pus est liuidum, uel pallidum, si nihil nisi
si spumantem pituitam æger sreat. Itaq;
seruari non possunt, quibus omnia hæc
accidunt. Quibus uero non omnia, ali-
quidem moriuntur, ali- uero post longa
temporum interualla sani euadunt. Ex
omnibus autem iam propositis conie-
cturis, reliquarum quoq; affectionũ signa
considerare oportet.

ALEXAN

DRI BENEDICTI MEDICI
ci doctissimi, Sententiæ medicinales,
prioribus Hippocratis
Aphorismis responden
tes.

DE MEDICO ET EIUS
officio: Item de ratione medi
caminum ministrando
rum, & de ægrotis
quædam.



BONI primū Me
dici est, præter ea
quæ religioni neces
saria sunt, nō mul
tos ægros suscipe
re. Varijs enim
morbis & mēs op
primitur, & cor
pus fatigatione continua languet.

2 Prudētis medici est, insanabiles ac des
peratos morbos non curare, ne hominē
occidisse, qui sorte sua interiturus erat, exi
stimeretur.

3 Dubias ualetudines, sine certa tamen
desperatione, suscipias, necessarijs tamē
in

indicare oportet rem in difficili esse, alioquin uel artem malo uinci, uel te errasse inditio sit.

4 Satius est tamen omnibus in rebus anceps auxilium experiri quàm nullum, plurimorum sententia est.

5 Vehementi malo, uehementi omnino auxilio opus est.

6 Si ecurrendum semper parti maxime laboranti.

7 Cauendum est in secunda uale tudine, ne aduersæ auxilia consumantur.

8 Occursurus morbo, nullus est qui originem ignorat.

9 Histriõnis est exigui momenti morbum attollere, quod plus ex inde præstitisse uideatur.

10 Morbus quandoque qui per se exiguus est, maior curantis negligentia fieri solet.

11 Non omnibus eadem remedia conueniunt, acciditque ut quos ratio non restituit, temeritas quandoque adiuuat.

12 Medici officium est, ut tute, ut celeriter, ut iucunde curet, uerum periculosam esse constat nimiam festinationem & uoluptatem.

13 Peregrina remedia semper querere, & Nota præ

T.H.E.S.E.S.T.O.T.I.V.S

præciosa duntaxat, impudens est ostentationis.

14 Catharticis uti uenenati periculosum est, unde ad testamentorum insidias sæpe oboritur occasio, in qua re & officinarum fides necessaria est.

15 Aegrotantis proprietates nosse oportet, cuiusq; amica, quæue inimica sint, intelligere.

16 Remedia naturæ munera non ostendere, & in arcanis habere, nõ decet, perfidia atq; auaritiæ crimine manifesto.

17 Alienam miseriam pudoris sortiam indicare nefas est.

18 Magni medici se quãdoq; errasse simplicius confitentur, ne qui eodem errore, quo illi decepti sunt, decipiantur.

19 Cetera præsidia superat ægri gaudiũ, atq; animi securitas, & si in pudore medicina quandoq; inueniatur.

20 Aeger obsequens esse debet domesticis, medicoq; præcipue, qui falli nullo modo debet. Occulta enim intemperantia soli ægro periculum imminere certũ est.

21 Nec cuius præsidium profitenti, ualitudinis desyderio statim credatur, solis medicis occidendi impunitate relicta.

- 22 Carnificis est, pendentibus fatis, et inter ipsos cruciatus, ingens prætium exposcere, uel morbum protrahere, uel duntaxat euomere, ubi extrahere omnino opus est.
- 23 Barbari benemerentibus gratiam non referunt, & ualitudine conflictantes multa promittunt, ad uitam exinde reuocati, conuictis inuicem prosequuntur.
- 24 Famosi ueneni uires, aut abortiendi modum, uel quæ conceptum inhibeant, indicare scelus est.
- 25 Dubie ualitudini assidere medicus debet, & uenarum pulsu uires sæpe perquirere, cæterasque notas inspicere, qui & syderalis scientiæ haud ignarus sit, necesse est.
- 26 Ergo quæ bona sunt auguria denuntiare debet, si quid tamen mali minatur infirmitas, necessarijs tantum significare fas sit.
- 27 Simplitijs effectus teneri summa cura debet, ex quibus composita & nobilitatis & plebis auxilia, inuentu etiam facilia habentur.
- 28 Periti medici, manum non protinus, ut ueniunt, apprehendunt, sed primum hilari uultu resident, sermone leni

THESES TOTIVS

leni sollicitudinem submouent, nam & medici conspectus, ac alia multa de facili uenarum rationem turbant.

29 A recta ratione nunq̄ discedendū est, & si nihil prodesse uideatur, sic ab incœptis pariter peruersis statim, & si nihil obfuisse cernantur.

30 Varijs auxilijs morbus expugnandus est, alioquin consuetudo naturam facit.

31 Prodest deniq̄ egro in medēdo, spesq̄ fidesq̄.

DE CVRA MORBORVM

in generali, deq̄ conferentibus & nocentibus. Cap. 2.

Morborum contrariæ qualitates, cōtrarijs expelluntur.

2 Intemperantem morbi qualitatem uehementi, & mediocrem mediocri auxilio curare debemus.

3 Vehementiora medicamenta, mēbris remotioribus conueniunt.

4 Superiora intestina superne, inferiora iniecto clystere, commode sanantur.

5 Validissima causa est, quæ morbū habitudini corporis contrarium excitat.

6 Vbi natura repugnat, parum medicina prodest.

7 In acutis morbis ægre proficitur, nam & profectus omnis tempore expletur.

8 Ex multa fame nimia satietas, aut ex multa facietate fames damnatur.

9 Ex nimio quoq; labore subitum oriũ, aut ex nimio otio subitus labor sine periculo non est.

10 Cum quis mutare aliquid uolet, paulatim affuescere debet.

11 Ex itinere fatigatis, uel laborantibus, aut à balneo ueniẽtibus, frigidi potus pernitiosissimi sunt.

12 Ex tempestatibus pessimæ sunt, quæ uariat maxime, obiter autumnus plurimos opprimit.

13 Corpora æstate relaxata subito frigore excipiuntur.

14 Senectutem longiores morbi exercẽt, acutis adolescentia implicatur.

15 Si quis plenior, speciosiorq; ac coloratior supra consuetudinem factus est, sine suspitione esse non debet, quando quidẽ neq; in eodem habitu subsistere, neq; ultra progredi potest, ferè igitur ruina quadam reuoluetur.

16 In omnibus corporis affectibus longior distantia tutiorem curationem pro-

q mit

T H E S E S T O T I V S

mittit. Si uero materia omnis effusa est,
propinquitas præfertur.

17 Priusq̃ in diuersum materiam abdu-
cas, membri dolores sedato. Cauendūq̃
ne ad principalia uiscera eadem superfe-
ratur.

18 Principalia corporis membra medica-
mentis de facili læduntur.

19 Cerebro ac iecori frigidiora non sunt,
non sine metu imponuntur, quæ & ner-
uos offendunt.

20 In periculosis morbis in quibus uiriū
deliquium timemus, dilatis auxilijs à ue-
hementiori cathartico incipiendum est,
aliàs leniori utendum est.

21 Locorum transitus ex graui in salubrē
utilis est.

22 Media hyeme aut æstate aluum tra-
here, aut secare, aut adurere, malum est.

23 Maxima in medendo difficultas est,
cum caussa, eiusq̃ affectus contraria auxi-
lia requirant, ut colicis cruciatibus contin-
git.

24 Senibus tremulis nihil profunt me-
dicamenta.

25 Scamonium medicinas omnes exa-
cuit, quod & stomacho inimicum perhi-
betur.

Frige

26 Frigefaciendi & calefaciendi, par tēpus est. In illo metus, in hoc audacia maior, calidis enim natura gaudet.

27 Humectandi atq; exiccandi uires pari motu feruntur, uerum hoc uelocius euenit.

28 Natura caliditas humido temperato gaudet.

29 Sponte exiccare corpora non mirū est, calefieri uero naturale non est.

30 Vehementior caliditas materiam in lapidem conuertit, si corporis meatus introclusi sunt.

31 Habitum corporis frigidum calefieri haud facile est, si iam constitit, si increuit q̄ facillime.

32 Frigida rursus habitudo initio celerius cedit calidis, q̄ caliga frigidis.

33 Calida corpora ægre frigefiunt, ægrius uero frigidiora calidis uincuntur.

34 Immodicus calor siccitatem contrahit, frigus uero humiditatem.

35 Ocium ac balneorū usus corpus humidum reddit, quod & uinum modice epotum efficit.

36 Immodica corporis frigiditas, mortis imaginem refert.

THESES TOTIVS

DE SANGVINE ET

sanguinis detractioe, quibusq; conueniat, & quo potissimum tempore. Cap. 3.

Tenuioribus magis sanguis, plenioribus uero caro magis abundat.

2 Tenuiores detractioem sanguinis facilius sustinent, pinguiores læduntur.

3 Vires corporis magis ex uenis quam ex ipsa specie dignoscuntur.

4 Mittere sanguinem usum habenti expeditissimum est, ignaro uero difficillimum.

5 Ex omni humore nihil sanguinis dimissione nocentius.

6 Arteria incisa neq; coit, neq; sanescit, ut sanguis uehementer erumpat, efficit.

7 Ex larga sanguinis detractioe, mali generantur humores.

8 Missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam interdum maxime noceat.

9 Eadem si quam largissima sit, aluum sapius sistit.

10 Interest non quæ ætas sit, neq; quod in utero geratur, sed quæ uires sint, imbecillo enim cuiq; male sanguis emittitur.

11 Integra atq; exigua sanguinis materia

celi

reliquis uiciatis humoribus, male demittitur.

12 Venifex qui partius aut timide uenā incidit uires tuetur, uerum quandoq; crassior materia intus retinetur.

13 Qui confidentius latum uulnus infert, serius id sanescit, uelociusq; animę defectum inducit, uerum magis expurgat.

14 Latiores scapellus hyeme, æstate acutiore esse debet.

15 Supinis uena incidenda est, ne anima deficiat.

16 In febre ardenti, detractio sanguinis quandoq; obest.

17 In febribus quibus neruorum contractiones accidunt, à sanguinis detractioe abstinendum est, ut si necessaria aliquin uideatur.

18 In periodica febre modicus demittitur sanguis, si rigores præsertim uehementissimi sunt.

19 Bilis furor atq; pituitæ cruditas importunam sanguinis missionem sequitur.

20 Certum tempus non circumscribit sanguinis dimissio, obiter ruptis, conuulsis, ex alto delapsis, qui & si paulo ante ci-

T H E S E S T O T I V S

bum sumperint, protinus demenda ma-
teria est.

21 Adulescentibus exiguum sanguinis
mitti cōuenit, neq; nulli post lōgos mor-
bos, aut à crapula.

22 Ventriculo alioq; astricta, metus est
sanguinem extrahere.

23 Fastiditis tædium abstergendum est
penis ex, priusq; uenā incidas, ex qua largi-
us profluium, & si rarum est, quotidiana
na extractione, quæ modica sit, nocenti-
us est.

24 Hyeme austro perflante sanguis re-
cte mittitur.

25 Tardius sanescit ictus, quo quis ma-
gis dolet.

26 Post sanguinis dimissionē cibo mo-
dico utendum est, in qua uehemēter de-
ligare, & præteritos ictus non uitari, im-
portunum est.

27 Obæsis deligenda brachia sunt uehe-
menter, macris laxius.

28 Profluente sanguine rato, suppresso
frequenter anima deficit, nisi largius edu-
catur.

DE MINISTRATIONE

pharmacorum. De aluo ducenda, & circumstantijs, quæ requiruntur ad eam rem.

Cap. 4.

Humecta atq; calida corpora, alui deiectionem haud difficulter ferunt.

² Aluus cita macris, tenuibus, mēbrisq; mollibus nocet.

³ Biliosis alui deiectio grauis est, ac per parce uiuentibus.

⁴ importuna deiectio, neruorum contractionem minatur.

⁵ Pueris, senibusq; temerarium est aluū soluere.

⁶ Hyeme ac æstate ægre uenter soluitur.

⁷ Insuetis plurimum obest deiectio.

⁸ Materiæ motus modum indicat stomachi namq; fastidium uomitum sua det, uentris punctiones alui ductionem inuitant.

⁹ Membris certi meatus sunt, uesica, iecoris gibbo cauo intestina respondent.

¹⁰ Immodica exanctio quàm plurimum malas febres excitat.

¹¹ Ventre à fluxu præmature confirmato, ac morbo aliquo ob id superueniente

THESES TOTIVS

aluum concitare rursus oportet.

12. Materia quæ unius naturæ, in uentre facillime continetur, atq; perficitur, quæ uero uaria sunt, uario uentris motu contrahuntur.

13. Qui recta uictus ratione uixerit, nec uomitu, nec alui ductione æget.

14. Assumpta sæpius medicamenta ubi sanguinis missio necessaria fit, febres faciunt, ob id prepostere usu sunt, modo qui à prima purgatione non quieuerunt.

15. Biliosis, uomitus, catharticūq; mox otium prodest.

Cum bilem ruffam trahimus, & scamonio opus est, quod myrabolanium dicunt, addimus, ut uirus auferat.

17. Ventrem deijcere, ubi intestina apostemata sunt, damnatur.

18. Febre correptis aluus soluta salubrior est uomitu.

19. In uentris fluore, cum incocta profluent, uomitus nocet.

20. Ventrem aut uomitum concitare, cui corpus integrum est, uertigines, uentrisq; dolores facit, maleq; materia soluitur.

21. In uomitu aut alui deiectione uno ex
ina

inanito humore & alio incipiente, corpus recte purgari, indicium est.

22 A purgationibus somnus plenior, ægrum magnifice exonerasse ostendit.

23 Sitis quoque uehementior, bene purgati infirmi nota est.

24 Quæ ex naribus medicamine extrahuntur, hydropises extenuant.

25 Torri, hoc est, inexplanatæ linguæ, uehementiora medicamenta male sustinent.

26 Qui catharticis non assueuere, ijs uti non debent, neque stomacho defecti, quibusque humor lentus est & tenax.

27 Si præcordia tenta sunt, cathartica assumpta nocent.

28 Inflammatis humoribus, oppilatisque meatibus, medicamenta non dantur, donec corrigantur uitia.

29 Qui ex stagno aquam bibunt, quique liene non laborant, medicamento facilius ferunt.

30 Ante uentris purgationem somnus prodest, uires enim intendit.

31 Ab imbecilibus catharticis uigiliæ præferuntur, somno enim medicaminis uis remittitur.

THESES TOTIVS

32 Epoto medicamento exercitationes malæ sunt.

33 Qui calidæ atq; infirmæ habitudinis sunt, crudiq; stomacho, prisana rhorion ijs conuenit, mox medicamento tutius utuntur.

34 Cathartico syrio ardente febres afferunt, à quarum potu comedere aut bibere siue dormire, nisi exacto opere nocet, aliàs uentrem contrahunt.

35 Pillulæ cum ijs quæ eiusdem effectus sunt, cogi debent.

36 Oris resolutio aluo cita sanatur.

37 Duobus uti catharticis in die, temerarium est.

38 Longinuior materia difficilior attrahitur.

39 Salis plurimus usus, ante catharticū nocet.

40 Senectuti ac quibus infirma ilia sūt, deiectiones obsunt, quæ interdum aluo cita tentantur.

41 Iecoris dolor, qui à sanguinis dimissione aut uentris purgationibus accidit, aqua calida pota sanatur.

42 Quotidiano medicamentorum potu natura uitatur, obiter qui ijs assueuere quam

quàm citissime periclitari certum est.

43 Siccae habitudinis corpora acriori medicamento læduntur.

44 Si alius leui medicamento nõ molitur, quies indicanda est.

45 Vbi sanguinis missio sola mederi potest, medicamentum super addere malũ est, inflammationes enim facit.

46 Pillulæ uetustate induratae, pessime sunt, nec nimium recentes laudantur.

DE RATIONE VICTVS

sanorum & ægrorum.

Cibi, potusq; crassæ materiæ damnantur, uias enim corporis intercludunt.

2 Nihil ægrotantibus uilius tempestantia abstinentia, quæ tempore & modo et genere queritur.

3 Aeger neq; superuacua materia onerandus est, neq; imbecillitate perdendus.

4 Cibus simplex laudatur, sapes et cõdimenta perniciosi.

5 Plurimo cibo indiget qui increscit.

6 Qui nimio cibo utuntur, corpora nõ augent.

7 Valentissimæ materiæ cibus uti debet athletæ, agricolæq;.

8 Valetudo ignota, aut inedia uincitur, indicatur.

Om

THESES TOTIVS

9 Omnis curatio contrarijs præsidijs curatur, ueruntamen abſtinentia, uictus gratia, ſine periculo plærumq; ſanat.

10 A fame, cibo plurimo ac malo uti penitioſum eſt.

11 Quo acutiores morbi ſunt, eò minus cibo indigent.

12 Si quis in acuta ualetudine linquit a nimus, ab inbecillitate reſecimus, nec largis quidem.

13 Quæ genitale ſemen augent, lactis quoq; abundantiam faciunt, quæ eductio genituram extinguunt, huius quoque inhibent copiam.

DE FEBRIVM CVRATIONE.

IN febre ardenti frigidum dari largius uetamus, ſi ſtomachus inbecillus eſt.

2 Si inter morbi initia materia nimium ſeruet, ſtatim ducenda, alioquin digerenda.

3 Instantibus quartanis theriaca præclarè medetur.

4 Instantibus quartanis nunq̄ nervorū contractiones fiunt, in quibus & diaueratrum datur, & in tertianis diaſcamoniū, circuitus enim ſoluunt.

- 5 Panis frigida madens, febricitantibus appetentiam excitat.
- 6 In acutis febribus uehementes dolores periculum minantur.
- 7 Alba urina in causode, dolorem capitis nunciat.
- 8 Causodem subitus horror resoluit.
- 9 Senectutem ardens febris raro solet offendere, alàs pernitiōsa.
- 10 Ipso accessionis die, nihil præter uomitum tentandum.
- 11 In febribus offerendus cibus nō est, nā quod non integro corpori infertur, de facili corrumpitur, inter omnia tamen tempora, inclinante febre minus damnatur.
- 12 Instante morbo satius est q̄ incipiente, omni tamen tempore defectis subueniendum est.

DE MORBIS QUI CA

piti accidunt, interni & externi, & de cura eorundem.

Capillorum defluuium quod ætate contingit, nunq̄ restituitur.

1 Seruari non potest cui cerebrum, mēbranae q̄ incisæ sunt.

2 Percusso cerebro uel membrana, bilis osus uomitus insequitur, ac nerui distenduntur.

Urina

T H E S E S T O T I V S

4. Urina ueterinariae similis, praeteritos
capitis dolores ostendit.

5. Frontis dolore, quod ob similitudine
ouum dicitur, in faciem dormiunt.

6. Ventrem mollire, capitis doloribus
utile est.

7. Immodicis uigilijs tussis intercedens,
mortifera est.

8. Obliuio quae sanis sponte prouenit,
comitiales morbum, aut lethargiam,
aut apoplexiam denuntiat.

9. Ulcera quae insanientibus accidunt,
pestifera sunt.

10. Vertiginosis senibus apoplexia facile
imminet.

11. Si in comitali morbo mens laesa est,
aut neruorum facta resolutio, ualitudini
spes non est.

12. Morbus comitalis ante pubertatem
ortus, quandoque finitur.

13. Apoplexiam praenuntiant noctur-
nae suppressiones, quae & morbum comi-
tiales, uel insaniam praesagiunt.

14. Dementia saepe in comitiales mor-
bum uertitur, aut contra.

15. Morbus comitalis frequens, exitialis
est, quem neruorum contractiones antea
cedunt,

16 Melancholicis sanguinem frequenter dimitti, apoplexiam uel similem morbum portendit.

17 Apoplexię si febris accedit, ubi abscessus causa non fuerit, triduo æger insepultus esse debet, q̄ decretorio quandoq̄ tempore morbus finitur.

18 Neruorum uicia tolluntur plurima, si occipitio studes.

19 Ebrietas neruis nocet, & conceptum inhibet.

20 Qui colicis sæpe laborant, ij neruorum resolutionem incurrunt.

21 Infantium urina uiridis, neruorũ contractionem uel resolutionem prædicat.

22 In uulnere neruorum contractiones exitiales sunt, & quæ ex arefaciente causa oriuntur.

23 Frigida estate superiniecta membris, frigidam neruorum materiam discutit, si uires adsunt.

24 Cum stupent crebro membra, exitiũ denuntiãt.

25 Cum membri stupor perseverat, neruorum uicia præfagit.

26 Timere ex somno, mali morbi indiciũ est.

Somnũ

THESES TOTIVS

27 Somnus statim à crapula, aurium vitij nocet.

28 Distillationes frigidaë febre maturantur, calidaë accenduntur.

29 Quibus capitis distillationes fluunt, raro pleuretici fiunt.

30 Austris caput humorẽ sæpe recipit, q̄ mox a glone sine intermissione distillat.

31 Sternutamenta partum adiuuant, conceptum uero expellunt.

32 Vbi sternutamenta frustra tentantur, vires corporis inualidaë sunt.

DE VITIIS AVRIVM
& oculorũ, deq̄ cura eorundem. Cap. s.

Sicut oculorum vitij capitis dolores sunt, hi prius discutiendi, mox oculorum malis mederi oportet.

2 Nihil oculis coitu nocentius.

3 Crapula nocet oculis, magisq̄, qui à cibo statim dormiunt.

4 Supinus somnus, ac uigiliaë moderate oculis profunt.

5 Sanguinis frequens dimissio, oculorum claritati obest.

6 In epiphoris oculorum, uel eorum vitij omnibus, caput oleo perungere, aut auribus instillare, perniciosum est.

- 7 Lippienti medetur deiectio.
 8 Frequentiores in cibo lactuæ, claritas
 oculorum nocent.
 9 Surditati ueteri difficulter succurritur.
 10 Surdi quandoq; fiunt, ubi biliosus
 fluxus uentris subfiterit.
 11 Surditati aurium nihil biliosa aluo
 utilius.
 12 Faucium tumoribus sub lingua uena
 utiliter secatur.
 13 Angina in peripneumoniam quan-
 doq; uel in præcordia tendit, ac perimit.
 14 Qui anginæ morbo intereunt, ijs pri-
 us nerui contrahuntur.
 15 Aurium purulentia importune per-
 sanat, uerrigines oculorum excitantur,
 redeunte haud dubie tolluntur.

DE PASSIONIBVS PE-
 ctoris, & cordis, & præcordio-
 rum, & eorum cura,

Cap. 9.

COr nullo abscessu afficitur, quod si
 diu mala habitudine adfligatur, nū-
 quam sanatur.

- 1 Defecti uino statim recreantur.
 2 Vinum dilutius pueris, senibus mera-
 tius

THESES TOTIVS

tius conuenit.

4 Crocum, cordis uitalibus medicamentorum uires defert, stecae uero capiti.

5 Febres putridæ cordis caliditatem & humiditatem arguunt.

6 Materia quæ peripneumoniam aut pleuresim facit, si ad cordis uitalia pertinet, protinus necat.

7 Humor omnium superuacua exinanitio, cordis uires offendit.

8 Corde sponte frigefacto aut calefacto, arefactoq; prisus certam originem habet.

9 Cor humectum febre putrida sæpe periclitatur.

10 Circa præcordia ortis ulceribus, sanguis ex sinistra nare profluens, mortem subitam prænuntiatur.

11 Immodicus cordis tremor, animi prius defectum, mox interitum adfert.

12 In cordis affectibus auferre causam, ac quæ hilaritatem custodiunt, addere oportet.

13 Odorata omnia cordi conueniunt, scædique odoris locorum cruciatibus.

14 Animi defectio, si perseverat, insana bilis est.

15 Concitatae uomitiones, animæ extirpatione

æ speciem reuocāt, nisi sudore deliquē-
rit, in quo casu etiam extremorum liga-
turæ obsunt.

16 Asthma senibus difficilius est.

17 In laterum doloribus, si materia in
4. diebus non excreatur, uomica obori-
tur, quæ rursus si 40. diebus non purga-
tur rabes subit.

18 Prægnantibus, senibusq̄, laterum do-
lores letales sunt.

19 Aquilonibus, uere pleuretici fiunt, et
state item ac autumno pluuioso.

20 Pleuresis quæ exercitationibus san-
guinis non leuatur, suppurationes inteti-
ores, ut diximus, aut exitium porrendit.

21 Pulsus arteriæ distensus, pleuretico
periculum minatur, præsertim si uires nõ
sunt.

22 Salua nigra in 8 die incipiens, pleure-
ticis malum præfagium indicat.

23 Pthificis autumnus contrarius.

24 Infantes à pthisi facilius liberantur.

25 Pthificis pustula in spatulis orta fabæ
magnitudine, ultra 52. diem mortem mi-
natur.

26 Pleureticis nihil utilius sanguinis
missione, quibus medicinæ stupefacien-

T H E S E S T O T I V S

tes plurimum nocent.

27 Pleuretici qui conualuere, si rursus errore seu temeritate reciderint, haud dubio moriuntur.

D E P A S S I O N I B V S S T O M A C H I, singultibus, fame, siti, uomitu, dolore, & id genus alijs.

Cap. 10.

C Alliditas stomachi non naturalis, lactuca commanducata conciliatur.

2 Stomacho æquales medicinæ propitiæ sunt.

3 Inexpertis aut dubijs leues primo uomitiones dari debent.

4 Exercitationes ante uomitum laudantur.

5 Ad uomitiones si uinum datur, copiosius bibi debet.

6 Biliosi æstate & meridie præsertim, tuto uomunt.

7 Cholera utiliter macris per uomitiones effunditur.

8 Qui leuamentum non præstat uomitus, inutilis est.

9 Crebræ uomitiones grauidis auribus, dentibus, oculisq; nocent.

10 Sanguinem per uomitum emitte, malum est.

Sto

- 11 Stomachi uulnus non sanatur.
- 12 Ad stomachum infirmum uarij humorum effunduntur.
- 13 In uentre calido bilis generatur plurima, præsertim si cibus biliosus assumatur.
- 14 Frequens medicamentorum usus, stomacho officit.
- 15 Stomachus qui faciliter sentit, temere quoq; læditur.
- 16 Mens commota nimia crapula, de facili discutitur.
- 17 Morbi uentriculi inextricabiles, imbecillum hominem reddunt, obiter agere sanantur.
- 18 Ventris prospera habitudo, pinguiam adamat, quæ & firmissimæ materiæ cibum facilius concoquit.
- 19 Veratro optime uere purgamus, autumnino tollerabiliter si id in usu est.
- 20 Ante ueratri potum, pinguibus & humidis uescendum est.
- 21 Veratrum egris non semper prodest, sanis semper nocet.
- 22 Pura corpora ueratro læduntur, nervorum enim contractiones facit.
- 23 In omni stomacho chatartico aliqd

THESES TOTIVS

stipticum addendum est.

23 In affecto stomacho, ubi materia du-
bia est, hiera composita prodest.

24 Stomacho calido aqua gelida no-
cet, usum non habenti.

25 Cum stomachum cataplasmatibus re-
frigeras, ne pulmonem aut iecur lædas,
cauendum est.

26 Oleosa & pingua stomacho inimi-
ca sunt.

27 Qui Venerem coarguunt, stomacho
consulunt.

28 Difficili uomitu, stomachus uexatur.

29 Dolor stomachi ex aqua frigida in-
terdum letalis est, ex quo & colicus do-
lor exoritur.

30 Si stomachi dolore pustula in dextro
crure innascatur, in 27 die ægri exitū por-
tendit, in quo tempore dulcia supra mos-
dum adamant.

31 Si uentris affectu pustula in superci-
lio orta nigra, fabæ magnitudinis, quæ
in ulceris genus mutetur, mortifera est.

32 Morborum ferè omnium causa est
stomachi infirmitas.

33 In longis morbis languens appetitus
damnatur.

Sicim

- 34 Sitim sedat somnus.
- 35 Stomacho sicco corpus arefit, humido hydropises prænunciantur.
- 36 Stomachi habitudo sicca, diutina, nix corrigi potest.
- 37 In fortiori stomacho cibus tenuissima materia uiciatur.
- 38 In stomachi affectu, si super oculo ulceris magnitudine, parum rubens, parum uiride, superueniatque mentis delirium in 17. die mortem portendit.
- 39 In leua dormire stomacho utile est, in dextra materiam per aluum educit.
- 40 Pueri amplexus citra sudorem, stomachum confortat.
- 41 Vomica stomachi calida siliqua ægyptia sæpe data medetur.
- 42 Ventris & intestinorum in fluxionibus acida eructare, securitatis nota est.
- 43 Aluus nigra, sanguini atro similis, repentina, periculosa est, si etiam sine febre sit.
- 44 Nauseæ in pestilentia, malum præsagium est.
- 45 In decretorio tempore uomitus ægrum à spasmo liberat, idem & comitiales morbos & lethargiam sanat.

T H E S E S T O T I V S

46 Contra singultus infinitos uomitus prodest, idem & nephreticis utilis est.

47 Corporis uires proterit mœror, fa-
mes, dolor, nec minus grauis odor.

48 Sanguinis uomitiones, & nigrae bi-
lis malæ dijudicantur, deteriores quæ ua-
riant.

49 In febre sanguinem euomere pericu-
losum est, aliàs quandoq; iuuat.

50 Vehementis clysteris infusio, uomi-
tum sedat.

51 Si uomitus materia caussa est, uomiti-
ones medentur.

52 Calida pedes lauati, ac extrema frica-
ri, uomitiones sedant. Idem præstat so-
mnus.

53 Ex febre ardenti uel inædia, frequens
singultus, malum augurium est.

54 Singultus infiniti, ex ictu capitis leta-
les sunt.

55 Singultus crebri, circa crismum tem-
pus, neq; spem, neq; metum promittunt.

56 Singultus sternutamento finitur.

57 Si uomitu singultus nõ discutiuntur,
ac rubescunt oculi, stomachi aut cerebri
apostema significant.

58 Singultientibus suppuratio in lateri-
bus

bus nata, in ortu solis mortem presagit,

D E A E G R I T V D I N I =

bus hepatis & quæ illi accedunt. De hydrope & de Eiectionibus.

Inicoris remedijs ducere ventrem, ubi Urina cienda sit, uel cōtra, maxime dānatur.

2 Iecoris medicamenta, uehementer cōtrita, dari debent.

3 Abscessibus iecoris dulcia nocent, presertim calida.

4 Epaticos stomaticosq; faciei color per se indicat.

5 Iecore male coquente, facies oculiq; tument.

6 Ventris fluxus initio carnis loturæ similis, cum cibi appetentia frigora indicat, cum stomachi uero tædio, humorū corruptorum nota est.

7 Ventris corpus ubi corpus calidæ naturæ est, in uirulentiam, mox in fecem cōmutatur, qui sanguis adustus dicitur, cū plurimum hæc omnia præcedit cholericæ deiectionis.

8 Ventris profluuium, si corpus frigidū est, in congelatum sanguinem, exinde in

THESES TOTIVS

diuersam materiam transformatur.

9 Deiectio rursus saniosa uel carnis lotura similis, infirmam iecoris concoctione ostendit.

10 Alba excrementa, uixq; confecta, digerendi & attrahendi uim inualidam significant, uaria uero corruptam digestionem ostendunt.

11 Retrimentoꝝ leuitas albedoq; attractricem uirtutem nitiatam indicat.

12 In fluxu sanguinis styptica remedia interdum nocent, obiter aperientia ac recreantia aromatis, exiguo addito ex merito præferuntur.

13 Iecoris dolore pruritus occipitiꝝ, pollicisq; pedis, ac pustula circa colum nata, ægri perniciem die quarto prælagit, quod augurium urine difficultas si affuerit, magis confirmat.

14 Abscessus iecoris si ad lienem transfertur, laudatur, ediuerso periculosus est.

15 Abscessus si calidus est, siue in dextro siue in sinistro latere, ægrum plurimum inquietat.

16 In morbo arcuato durum fieri iecur, perniciosissimum est.

17 Puro iecoris apostemati, nullum præsidium

fidium est, si uetus malum est.

18 Passum iecorariam uentris deiectionem facit.

19 Ventris profluuium quo corpus affligitur, si contrahitur, leuat, si profluit, lædit, ac ediuerso.

20 Senibus in longa ualitudine, fluxus metum facit.

21 Aqua intercus uirio iecoris semper oritur.

22 Lienis magnitudo hydropa minatur, uel corporis maciem.

23 Hydropisis nocentior est quæ ex acuto morbo oritur, uel quæ in calido ac sicco corpore incepit.

24 Hydropici ex lienis quæ ex iecoris duritie facilius sanantur.

25 Ex longa hydrope dyspnoema, aut crebri anhelitus, uentrisque profluuium, tri duo interitum prænuntiât.

26 Gingiuarum & oris ulcera in hydrope, mortem minantur.

27 Aqua quæ cutem subierit, si simul omnis effunditur, letalis.

28 Hydrops quæ iecoris apostemati superuenit, difficulter sanatur.

De

THESES TOTIVS
DE DYSENTERIA, TOR-
minibus, Colica, Stranguria,
& Hæmorrhoidibus.

Dysentericis post aurem sinistram e-
nata pustula erui magnitudine, si-
tisq; interueniens, in 20. die mortis præsa-
gia sunt.

2 Intestinorum & stomachi leuitas, quæ
torminibus oritur, ægram præcipitat.

3 Alui deiectiones ex atra crassaq; bile,
non sanantur.

4 Aquosa deiectio, quæ mox unctio-
nis similis profluit, damnatur.

5 In dysentericis neruorum contractio-
nes, uomitiones, singultus crebri, ac de-
mentia deniq; dira auguria sunt.

6 Balbi uentris fluxu facile periclitatur,
aliàs (ut diximus) ægre medicamētis pur-
gantur.

7 Si in pueritia mollis est aluus, eadem
in senectute contrahitur, & ediuerso.

8 Qui uentris profluuio moriuntur, ijs
primum uena formicās percipitur, mox
intermoritur pulsus.

9 Iliacus morbus, nisi resolutus est intra
septimum diem, letalis est.

10 Colicus dolor ui pestifera quandoq;
rez

regiones & prouintias occupat, letiferaq̄
 contagia imitatur.

11 Febricula colicos dolores sanat, si ex
 spiritu & phlegmate oriuntur.

12 Ex iliatis doloribus uomitiones &
 singultus crebri ac deliratio, dirum augu-
 rium faciunt.

13 Ex stranguria iliatus dolor in 7. homi-
 nem rapit, nisi febris cum sudore præsi-
 dium afferat.

14 Prægnantibus tenasmus exitialis est.

15 In febris initio mortuæ tinea, in re-
 missione uero uiuæ per aluum transmis-
 sæ spem prænuntiant.

16 Cum hæmorrhoidas ressecamus, sin-
 gulatim eas auferimus, in qua curatione
 uua demum dimittenda, alioqui ægro
 exitium minari.

17 Ani fistula interius secanda non est,
 alioquin in uoluntario excrementa emit-
 tuntur.

DE VESICA, CALCVLIS,

urina, Venere, menstruis, &

& prægnantibus.

Senum exulcerationes q̄ uesicæ, facillè
 sus sanantur.

2 Vesicæ calculi pueritiam, renum uero
 fe

THESES TOTIVS.

senectutem infestant.

3 Calculi morbus ad posteros transit, ideo hæreditarium malum dicitur.

4 Pinguiores renum calculi, uesicæ uero maciem sollicitant.

5 Urinæ difficultatibus si tenasmus superueniet, in 7 die exitium portendit, nisi profluuium malo subueniat.

6 Melancholicos iuuat moderata Venus.

7 Nimia Venus corpus eneruat, & febres acutas & ardentis excitat, colicosque dolores irritat.

8 Oris graueolentia nimia quandoque oboritur Venere.

9 Infirmi stomacho, tutius Venerem negligunt.

10 A crapula uel inædia libido damnatur.

11 Corruptitur nimia salacitate foecunditas.

12 Ebrietas conceptum inhibet.

13 Pedes oleo feruentis naturæ peruncti, Venerem stimulant.

Viri hyeme, foeminae æstate salatiores sunt.

14 Qui nudis pedibus ambulant, libidinem

nem extinguunt.

16 Veneris imaginationes nocturnas,
leuat semen lactucae ex uino potum.

17 Vuluae uicijis iecoris habitus corrumpitur, unde aqua intercus saepe oritur.

18 Steriles foeminas infirmas esse, uerum foecundas celerius senescere haud dubium est.

19 Si nidor foeminarum naturalibus subditus ori respondet, foecunditatis nota est.

20 A mensibus si natura humens est, coceptus non admittit.

21 Vbi hyemem notus, ac Ver aquilo perflant, abortiendi periculum est.

22 Mamis cucurbitula imposita, mulierum menstrua sistit.

23 Si grauidis ubera emoriuntur, abortus imminet.

24 Vbi gemini in utero sunt, si alterum uber emoritur, alterum partuum enectum esse inditium est.

25 Pregnantem citra quartum aut ultra septimum mensem purgare metus est.

26 Quibus menses in totum praemature subsistunt, citius moriuntur.

27 Vuluae strangulationes, quae retardatis.

THESES TOTIVS

dati mensibus fiūt, minoris periculi sūt,
quā que retento genitali semine accidūt.

28 Vulvæ strāgulatus magis sentiūtur,
autumno.

29 Suffusæ sanguine mamme, furorem
uenturum esse testantur.

30 Mulier sanguinem uomens, profu-
sis menstruis liberatur.

31 Quæ mensibus nō purgatur, sangui-
nis ex naribus profluio tuta est.

32 Locis laborantibus, aut difficulter pa-
tientibus, sternutamenta profunt.

DE PODAGRICIS ET
articulorum doloribus, Ca. 14.

Vinum ieiunis potum articulis nocet.
2 Podagrici morbi à maioribus sæ-
pe contrahuntur.

3 Ver podagras magis incitat, autum-
nus minus incitat.

4 Podagræ ueteres, quæ uario humo-
re proueniunt sanari non possunt.

5 Podagras quandoq; uarices ortæ se-
dant.

6 Coxæ dolor ex cruditate oritur, uerū
& locorum dolore sæpe contrahitur.

7 Articularius morbus mēbra resoluit.

8 Ischiadicos inurere summū præfidiū
est.

Bilio

9 Bilioſa podagra, quæ medicamentoſum uſu nimio præmitur, pernitiem miſnatur.

10 Hinc item uomitus magis quæ deiectione ſubuenit.

11 Articulorum uitia, ſi iuuenes tentarunt neque callum induxerunt, ſolui poſſunt, maximeque torminibus aut alui deiectione.

12 Infaniam emendant uarices enatæ, aut per ora uenarum ſubita ſanguinis profuſio, aut tormina.

13 Membra quæ reſoluuntur, ſi non mouentur & macreſcunt, in priſtinum habitum non reuertuntur, magisque ſi uetus malum eſt, uel ſenectuti acciderit.

DE VLCERIBVS ET

Suppurationibus Cap. 15.

Omnia exiccantia non mordentia, carnem alunt.

2 Ulcera in alia parte corporis quæ in carne ſita, omniaque quæ rotunda ſunt, difficulter complentur.

3 Inſtans ſuppuratione diſcutienda eſt, ſubiſtens reſoluenda, increſcens utroque modo oppugnanda eſt.

4 Cera inter unctiões additur, ne rerum

f ui

T H E S E S T O T I V S

uites protinus elanguescant.

5 Gulæ ulcus ex uulnere cum plurimum
letale est.

6 Viscida atq; stiptica ui cicatricem in-
ducimus.

7 Vlcera exiguo nutrimento uincun-
tur, balneoq; initio laeduntur.

8 Suppuratis, ulceribusue nervosis, lin-
mento opus non est.

A L E X A N D R I B E N E D I
cti Physici, collectionum me-
dicinalium, finis.

Scito

SENTENTI

ARVM MEDICINALI

um Arnoldi Neocomensis de
morborum curationi
bus, Liber primus.DE FONTE OMNIS ME-
dicinæ.

Omnis medicina pro-
cedit à summo bo-
no.

DE MEDICO.

Conuenit medi-
cum efficacem esse
se in opere, non lo-
quacem, quia mor-
bi nō uocibus, sed

terum essentijs aut uiribus expelluntur.

Medicus fidelis & sapiens, cognitis co-
gnoscendis, quanto celerius poterit, sub-
ueniat ægotanti.

DE RATIONE ET ELE-

ctione medicamentorum.

Utando nociua, & utendo iuuanti-
bus, prosperatur in ægris opus cu-
rationis.

f. An

THESES TOTIVS

Anteq̃ ægritudinis species aut proxima
caussa cognoscantur, tēporatis, aut
neutris regendus est patiens.

Tutoribus medicamentis utere.

Optimæ medicinæ sunt, quæ naturæ
sunt magis amicabiles.

Primum uictus ratione, in medicamē-
tis medicator.

Frustra quærantur peregrina medica-
mina, cum ea interdum salubriora sunt,
quæ optimus quisq̃ coenat.

Pharmaca adhibe rarius.

Difficilius ferunt pharmaca, pueri, des-
crepiti, nonnunq̃ & iuuenes.

Creber usus pharmacorum, idq̃ in pri-
mis annis, celerem inducit senectutem.

Pereat, qui cum possit mederi simpli-
cibus, ad compositiones confugit.

Simplicibus morbis, simplicia quoq̃
congruunt medicamina. Compositis cō-
tra pulmone laboranti opem laturo, quæ
pulmoni imprimis congruāt, miscemus,
atq̃ in eum modum reliquis membris
omnibus.

Acetum & uinum distillatum penetrā-
di tantum gratia interdum adhibemus
medicamentis.

Pluraq; corrigendi atq; emendandi tātum gratia miscemus, ut in pharmacis solutiuis correctoria.

Quanto plura confunduntur in compositione medicamina, tanto hæbetior, haud dubium, eius redditur effectus.

Quemadmodum medicinae compositæ basim permutare non licet, sic neque medicinae eius, à proprietate iuuantis eā, & eius malitiam corrigentis.

Quorumcunq; componentium sunt plura iuuaementa, uel pauciora, conuenienter eorum pondera extenduntur.

Quæ naturæ amica sunt medicamina, copiosiora, & liberalius, quæ uero aduersaria, administrato partius.

Est enim medicus adiutor tantum naturæ, non destructor.

Sicut medicamenta quæ propinqua membra respiciunt, in minori, ita quæ remota concernunt, in maiori quantitate donantur.

Propinqua membra uocamus, os, dentes, linguam, guttur, uentriculum. Remota, uesicam, renes, matricem, iuncturas, pulmonem.

Eodem modo quæ aut uehementia,

f 3 aut

THESES TOTIVS

aut amara nimium, ut iera picra Galeni, in exiliori damus portione, dulcia et amica, contratio.

Quæ citius resoluuntur & euaperant, cuiusmodi sunt capilli Veneris & Chamomilla, eorum quoq; maius pondus scribere conuenit.

Pulueris hirundinum, in synanche, cineris scorpionum, & eorum omniũ quorum est operatio propria, eorum quoq; seorsim maior quantitas datur.

Theriacum semper expedit in promptu habere præ cæteris medicamentis.

Medicamenta illita stupentibus, aut insensibilibus membris, amoueri minime debent, donec tandem sentiantur ab illis.

Si quidem intempestiuis, aut cõmota celerius operationem suam nequaquã perficiunt.

DE HUMORIBVS ET SVCCIS malignis, deq; curatione eorum.

MOrbi qui citra humorum intempestantiam proueniunt, alteratiuis tantum medicinis iuantur atq; corriguntur.

Membra congelata, si de repente calos

ti admoueas, primo dolore intenso consiciuntur, deinde in scabiem prorumpunt.

Frigiditas quæ multis medicamentis tentata, non abiit, ruptorijs aut profundis cauterijs extirpatur.

Corpora quæ nimio confecta senio emarcescunt, atq; contabescunt macritudine misera, foueri aliquandiu poterunt, arceri non possunt.

Conuenit his corporibus cum primis lac, & quæcunq; optime nutriunt.

Qui hydropem caussat humor, si tenuis fuerit per sudores resoluitur. Sin crassus ac densior, paracethesi aut cucurbitulis exploditur.

DE VENTOSIS ET CUCURBITULIS.

Vbi prauo sanguine sola cutis inficitur, sufficit ut ea incisa, per uentosas & cucurbitulas extrahatur.

Ventosæ quædam adplicantur, ut sanguinem corruptum trahant, lucidam ut laxata restituant, Aliæ ut membris infigidatis calorem adducant, nonnullæ ut dolores mitigent.

Potiores ac uehementiores iudicantur uentosæ, quæ cum igne adplicantur, quæ quæ suctione;

THESES TOTIVS

Cuticulæ incisio, tanto profundiore
fito, quanto crassior est ipsa cutis, delite-
scitq̄ sanguis ipse euacuandus profundi-
us.

DE PHLEBOTOMIA.

Evacuationes uniuersales, particularis-
bus præmittantur.

Vniuersales euacuationes uocantur, quæ
fiunt per pharmaca, & phlebotomiam.
Item fluxus menstruus & hæmorrhoi-
darum.

Particulares, quæ euacuant ab aliqui-
bus membris, & non à toto corpore, ues-
luti capitis purgatiua, excreationes, lotia,
cauteria.

Interdum clyster præmittitur, cum eã
prohibeat constipatio fieri.

Humore existente prauo in corpore,
aut sanguine immodico existente, phle-
botomia præcedere debet pharmaca.

Venam incidere, & simul pharmacũ
propinare eodem die, piaculum est.

Sed ne duo pharmaca propinare eo-
dem die conuenit.

Post fortem euacuationem, phleboto-
mia non sequatur, nisi tribus exactis die-
bus.

Præ

Præcipuum tēpus euacuandi est Ver.
 Extrema tamen necessitas legi obnoxia
 non est.

Quemadmodum sub cane, & quolibet tempore, aut extreme calido, aut frigido, sanguinem mittere non conuenit, ita nec pharmaca dare.

Quibus crassior & glutinosus est sanguis, his uetitum est sub frigore uenam incidere.

Non inepte faciunt qui ad hanc Lunæ motiones obseruant.

Luna quo magis remouetur à sole, eò magis fluxiones & humores caussat in corporibus.

Vide de hoc libellū Haffurri de applicatione Astrologiæ ad Medicinam. Item libellum eiusdem tituli Domini Tanstateri.

Si membrum cretica non grauetur collectione, uel materia uenenosa, phleboto mandus est æger per uenas longinquoſes, oppositionis unius diametri, uel multorum, si fuerit corpus phlethoricū, morbo uero cōfirmato, & fluxu cessante, per uenas propinquiores.

Infra primum diatricon rarissime fluxus

T H E S E S T O T I V S

us cessat, & uehementer molesta est plethorici, qua propter ut plurimum oppositio longinquior seruit phlebotomiæ.

In criticis & uenenatis humoribus mittitur sanguis per uenas propinquissimas, membro, leso, nisi nobile fuerit.

Si sincopis accedit, ut intra cutē, & tamen bona sit portio sanguinis mittenda, licet digitulo occludere foramen, ut paulum respiret, redeatq; ad se æger, uocant eam interpellationem & ποφόρησις Græci. Portio sanguinis deſciendi, ab exuberantia eiusdem desumitur.

Quibus una die bis sanguis mittendus est, si uiribus ualeant, primus copiosius ſūdat, parcius ſecundario.

Quibus ſtomachus fuerit cacochinus, eorum ante phlebotomiam præmunda tur uentriculus, & corroboratur os.

D E S O L V T I O N E A L V I.

Sicut æstus cholerae, ita hyems phlegmatici euacuando idonea est.

Quemadmodum euacuatio frigidorum humorū in æstate parit acutos morbos, sic in introitu hyemis euacuatio calidorum, gignit diuturnos.

In diebus patoxismorum periculosa sunt

sunt phlebotomia, & euacuationes ma-
li humoris, antea non digesti euomitio,
cum pernitie exit.

In chimis furiosis, & qui per urinas e-
uacuuntur, emendatio uitij & eductio fi-
unt simul.

In allenatiua euacuatione, non est o-
pus digestionem.

Fit autem clysteribus aut plurimū aut
lenientibus medicinis.

In humoribus aquosis, aut suapte na-
tura fluidis, uitari debent liquida digesti-
ua, nisi uires habeant educendi peccantē
humorem, ut serū lactis in hydrope, aut
consumendi, ut aqua uitæ in paralyticis
non repletis.

In reumatismis propter aquositatem
distillantibus, in guttur aut pectus ingros-
satum syrupum absq; mixtura lymphæ
conuenit exhibere.

Ad summitatem purgationis, atq; secu-
ritatem, non sufficit corpora fluxa facere
digestiuis, humoris euacuandi, sed aper-
tius & lenitiuis, ac dilatantibus.

Quemadmodum balneum abluens
corpus, & excludens reliquias, sequitur
pharmaca. Sic præhumentas & fluxa red-
dens

T H E S E S T O T I V S

dens corpora præcedere debes, maxime si terrei fuerint humores.

Cholera cinerea & eruginosa, & terrestribus atra, penetralibus corporis intime in hærent.

Fit interdum ut huiusmodi, repentina alteratione, post aliorum euacuationem uehementer medicum ægrotum perturbent.

Qui à fecum duritie constipantur, nisi clysterem præmiserint pharmacis, torminibus uexabuntur.

Pharmaca tenuia & ardētia, cuiusmodi sunt Euphorbium & diagridium, per crassiores portiones, siue per se siue cum alijs, sunt glucienda.

Acuta pharmaca nisi lubrico uelatu de gluciantur, guttur uehementer offendūt, & si fuerit macilentum & aridum, perpetuo lædit ut plurimum.

Anteq̃ pharmacum perfecerit operationem suam, comedendum, aut bibendū non est.

D E P H A R M A C I S A B E X
tra applicitis, & euacuationibus.

Periculose imponuntur emplastra, uel

uel unguenta humorum attractiua, præcipue ubi occurrerit euidentis plethoria.

Exterioribus locis plethoricorum trahentibus pharmacis appositis, uel apostematis furor, uel scabiei foeditas præueniet ea.

Pharmaca trahentia explicantur urgente necessitate, uidelicet cum omnino respuit pharmaca egrotus, applicationes earum per partes conuenientes.

Attractiuis pharmacis ab extra explicatis, repercussia & confortantia conuenit sociare.

Licet Chimus eradiceatur à pharmacis, tamen eius expulsio perficitur à natura.

Chimum commotum à pharmaco expulsio membrorum obuians, inclinabit ad exitus naturales, si præualuerit pharmaciam. Quapropter oportet, ut interiora membra & exteriora sint fortia, cum pharmaciam trahens exterius applicatur.

Nunc tabefactis corporibus conuenit solutiuum trahens exterius applicare.

IN QVIBVS PHARMACIS
somnia conuenit prohibere.

Phar

THESES TOTIVS

PHarmacis uenenosis, ueluti diagra-
dio & helleboro superindormite nõ
conuenit, aut in modicum, ne principa-
lia membra ab inclusis malis uaporibus
offendantur, & maxime si debilia fue-
rint.

DE MENSURA EVACVA
tionis per pharmaca.

Humoris euacuandi per pharmaca,
nequit quantitas certis rationibus
mensurari.

Stulta faciunt, qui patientibus certum
sedium, aut excrementorum numerum
pollicentur.

Tam diu solutio proficit, q̄ diu peccã-
tis humoris euacuatio, sine defectu & an-
gustia tolleratur.

REGVLA VITANDI CON-
strictionem uentris post eua-
cuationem.

Post pharmatiam conuenit alimentis
aluum mediocriter laxum retine-
re, ne nouam procuret offensam, consti-
patio fortis & repentina.

CANONES ALTERANDI
post pharmatiam membra
distrahiata.

Distra

Distrasia membrorum post pharmaceutiam, & maxime fortem, nunquam est corrigenda forti alteratio.

Membra distrasiata multiplicat superfluitates conformes eorum distrasiam, quibus euiciata fuerint alimenta.

Corpora quorum interiora distrasiantur, oppositis qualitatibus, sunt ut plurimum cacochima.

Oppositas distrasias in interioribus patientes, leuiter offenduntur, distincto uero contrariorum, si sumantur interius, & ideo media debent sumi, uel commixta contraria.

In oppositis membrorum distrasijs, nociuior semper amplius impugnatur.

Distrasia fortior, aut membri nobilitatis, apta est plus nocere.

Inueterata distrasia transit in habitum, & respuit extirpari.

Hæreditariæ passiones inextirpabilis sunt radicis, & sufficit ne pullulent in deterioribus, conuenienti regimine prohibere.

CANONES MENSVRANÆ
di tempus, quod curæ
sufficiat.

In

THESES TOTIVS

IN morbis annum trāsgredientibus cū
Ista sanationis opera nequeunt in mi-
nori temporis spacio terminari.

In annalibus seu chronicis morbis nō
solum in quadris anni proportionabili-
ter medicari oportet, sed etiam in quoli-
bet mense.

Languor diuturnus plærunq; sola per-
egrinatione, aut loci mutatione, fuga-
tur.

Interdū (si ex humore sit morbus) aut
cauterijs aut termalibus aquis extingui-
tur.

Omnis medicina pollens uiribus opi-
atæ, congruit excellenter in morbis diu-
turnis, & cacochimia diminuta febres
multiplicat, usus opiatarum cacochimia
dominante.

Sub eadem specie febres ut plurimum
opiata multiplicat, ut duplando, uel tri-
plando quartanam.

Quocunq; regimine patiens emenda-
tur, eodem proportionabiliter observa-
to, consequitur possibilem sanitatem.

Quanto plus ægritudo minuitur, tan-
to minus uehemens medicamen mem-
bro uel corpori est applicandum.

DE CVRATIONE MORBORUM. per instrumenta chirurgica.

MEmbris quibus nequeunt adplicari manus, aut instrumenta, quæ manus officio regi possunt, illis manualis operatio nunq̄ prodest.

Innata malitia figuræ, nunq̄ in adultis corrigitur, incrementibus uero raro.

Malitia figuræ accidentaliter superueniens, corporibus aduulorum cum deperditione substantiæ incorrigibilis est, ut plurimum. Quæ uero sine deperditione substantiæ contingit, sæpe corrigitur, ut in luxationibus iuncturatum.

Sicut obliquitatem membri luxati aut conuulsi, mollificatio prius aut resolutio deinde pulsio uel tractus, aut extensio dirigunt, sic tortura mollificationis exiccantibus & contrahentibus aperte corriguntur.

Rectificata figura membri congrua ligatura, situatio quieta, & firma, parum per constringentia medicamina seruant eam.

Vtilis ligatura, neq̄ uexat constrictione, neq̄ fluitat laxitate.

THESES TOTIVS

In sicina firma, uel astellis fulcitur mēbrum, uel suspenditur linteo, uel tabulis coartatur aut geritur, uel stuellis impostis subleuatur, ut in naso & uirga.

Quibuscunq; paruulis aut passibilibus dislocatio spondilium corrumpit figurā dorsi uel pectoris, ut plurimum nequit rectificatio solidari.

Passibilia membra, & maxime calida, si diu a sensibilibus coartentur, aut suffocationis periculum, aut febrium incommoda non euadent.

Superficies tabularum absq; plumaceolis utiliter superficiei membri uel corporis coaptari nequit.

Quibuscunq; relaxatione ligamentorum spondilia dislocantur, præ cunctis exiccatiuis efficacitis balnea sulphurea, uel cauteria conferunt iuuamentum.

DE HIS QVAE IMPE diunt curationem.

Q Vicquid præter naturam replet cōcauitatem membri, uel minuit eius capacitatem, debet quantum possibile fuerit, congruis exitibus ab eodem expelli.

Quod meatum obturat, & impedit
trans

transitum naturalem, expellendum est ab eodem.

Secundum diuersitatem corporis opilantis & membrorum, in quibus transitus obturantur, conuenit de opilantia preparari.

Sicut intestina deopilantur à stercore duro, clysteribus mollificatiuis, sic & meatus renum à calculo medicinis comminuentibus calculum, aut facientibus lubricare.

Sicut humor opilans multitudine sola detrahitur, tamen ad operationem meatus, ut in uenarum repletionem, sic & opilans, uiscositate inuante siue grossitie, debet incidi uel subtiliari, ut detrahatur.

Medicina aperitiua meatum occultorum, quanto subtilioris substantiæ fuerit, tanto præ ceteris eligibilior.

Sicut medicina resoluens, absq; stipticitate, non conuenit hepatis, sic nec fortiter aperiens meatus ipsius, catere debet pauca stipticitate.

Sicut in pustulis aut ragadijs ulceribus membrorum interiorum acuta & incisiva per se, uel cum aliquo introducta, mordicationis ingeminat cruciatum, sic lenis

T. HÆSES TOTIVS

riua, & frigida, sine tormento illorum su-
mentur ut plurimum.

Inter lenitiua communia ragadiarum
& ulcerum occultorum, prius lac, ptisa-
na, tertiæ decoctionis uendicat sibi gra-
dum.

Quod opilat meatus, si nequit expelli
à membro uel corpore, transponendum
est, & quantum possibile fuerit elongan-
dum ab eodem, ut calculus à callo uesicæ,
uel à pupilla catharacta deponitur.

DE CURATIONE ME-
atus innaturalis.

MEatus innaturalis qui diu manat,
ut in fistulis antiquatus nequit ob-
tutari, absq; timore grauioris incommo-
di, nisi manatio cõsueta deriuetur ad pro-
xima.

Innaturalis manatio congrue permutat
ad exitum naturalem, ut fistula lachry-
malis ad calamos nariũ in osse cor-
rupto.

Quibuscunq; superfluitas manans ad-
ducitur à proximo & naturali meatu, si
cuturina distillans per foramen incisio-
nis uesicæ, in calculo nunq; timendũ est
claudere foramen innaturale.

Quis

Quicumq; meatus innaturalis potest absq; timore claudi, si fuerit strictus, & antiquitate suspectus ad immunditias coartatas elargandus est incisione uel medicina, ut à profundo syncera consolidatio procuretur.

Manatio quæ diuerti nequit ad exitum naturalem, uicinis cauterijs abducitur cõpetenter.

Euacuatiua cauteria, semper in fonta mellis, ubi lacertus à lacerto manifeste disiungitur, aut non fieri subsistit, considerare recta iubet.

Cauteria quæ distrahunt fluxos in ueteratos, efficacius operatur, si propinqua sint magnis uenis, sicuti quæ diuertunt à partibus capitis cephalæ debent appropinquare.

Quàm diu uixerit fistula, nunq; poterit obturari, humiditas dominans, & ancilla frigiditas fistulæ uitam præbet.

Quàm diu sanies fistularis, aquosa uel glutinosa, seu prauæ qualitatis exierit, fistula uiua manet.

Ex quacumq; sui parte fistula sanie perfectam & puram emiserit, ibi est iam extincta.

THESES TOTIVS

Fistula tortuosa et intricata, nunq̄ perimitur, nisi felleis aut nitrosis liquoribus imbuatur.

Fistula inossata, nunquã medicationi obediens, donec extirpatum fuerit os corruptum.

In cunctis ulceribus os infectum respuit incarnari, uirulentas intus cauernulas gignens.

DE CURA ASPERITATIS innaturalis.

Ossis asperitas radendo corrigitur, uel liniendo.

Cutis innaturaliter aspera, lenitiuis unguentis aut balneis, uel mundificatis lotionibus emendatur.

Concauitatibus interiorum membrorum humectantia infusiva, aut mucilagines, aut quæcunq̄ nitrosam uel terrestrem chimum euacuant, & naturalem restitunt sanicatem.

Exasperata concauitas pluralitate radendarum infusiuis lenitur mucillaginosi aut glutinosi, præcipue lactis usu.

Nutritiuis exasperatis pluralitate uerucarum limantia subueniunt, ut pulueres metallini, uel abstergentia incisiva.

Pustu

Pustulis exasperantibus membra interiora lac subuenit, aut unctuosa quæcūq; parum mundificant & exiccant.

Sicut in pustulis aut ragadijs, uel ulceribus membrorum interiorum acuta & calida mordicationis ingeniant cruciatum, sic lenitiua & frigida sine tormento illorum sumuntur ut plurimum.

Inter lenitiua communia ragadiarum & ulcerum occultorum, lac, prisana uendicat sibi gradum.

DE CURATIONE LENITATIS innaturalis.

Lenitas innaturalis, quam mucillagines inferunt, emendatur incisuiis & abstersiuis.

Concaua membra, quorum superficiē intrinsecam cicatrices ulcerum lenierūt, conuenienter ponticis mordicatione castentibus incrispantur.

DE EXCESSU TOTIUS corporis uel membri.

Quicquid præter naturam additue numero uel mēsurā, si tuto fieri queat, totum est auferendum.

Incisio & ustio & corrosio & consumptio auferunt quod excedit.

THESES TOTIVS

Vbi uenæ sunt & arteriæ, notabiliter magna, corrosio & incisio propter hæmorrhostigiam sunt uerendæ.

In excrescentijs membrorum passibilium & sensus acuti, corrosiua non mordicantia sunt adplicanda.

Vitio uel igne perficitur, aut cumburentibus medicinis.

Metallis ignitis breuius & efficacius cõpletur adustio, & certius regulatur.

Meticulosos tantummodo conuenit urere medicinis.

Ferrum ignitum efficacius auro & argento, resoluit superflua, pellitq; frigiditatem, & crustam obuiatam hæmorrhagiæ facit solidiorem.

Circa membra multis irradiata spiritibus, & resolui promptissima, quales sunt oculi, tutius fit auro uel argento cauterium.

Exercitati fortiter ante cibũ, & fames, & sitis, & dnrities stramentorum atq; uigiliæ sollicitudinis, spinis auguriantes, consumunt excessum pinguedinis atque carnis.

Tenuis. dieta concurrens cum balneo thermarum, celetiter macerat corpora nimis

nis crassa.

Excedens moles unius membri, ut mā
millarum assiduata constrictione, seruat
humiditatem.

DE DIMINVTIONE SVP=
plenda totius corporis uel
membrorum.

Alimenta resumptiua, & humectans
tia balnea, quies mentis & corporis
habitudinem reparat accidentaliter di=
minutam.

Membrum extenuatum diminutione
pinguedinis atq; carnis, abundantia san=
guinis atq; carnis, abundantia sanguinis
& quiete perseverantibus ingrossatur.

DE CORRECTIONE
situs innaturalis.

Cum his qui corrigunt figuræ maliti=
am, rectificatur in parte membrum
innaturaliter situatum.

Membrum discedens à sede propria si=
ne læsione figuræ uel pulsione reducitur
sicut anus, uel horrido uapore fumiga=
tur, uel allicitur placido, aut uentofationi
bus trahitur sicut matrix.

DE VVLNERIBVS ET
solutione continuitatis.

THESES TOTIVS.

IN uulneribus & figuram membri, & si cum partium eius, ut plurimum oportet rectificare.

In quibuscumque uulneribus membri substantia non deperditur, sola coequatio et conglutinatio restitunt sanitatem.

Labia uulneris glutinantur, si nihil alienum intercidat, & naturalis membri complexio fuerit custodita.

In magnis uulneribus ligatura nequit absque futura labia uulneris contiguata seruare.

Filum sericinum labia distincta nodas immoderata distantia, futuram efficit meliorem.

Festina consolidatio uulnerum potissime caussatur a stinguine paucae aquositate. Quapropter aquosos potus uulneris conuenit euitare.

ARTIFICIVM COMPONENDI portionem uulnerariam.

Potio quae consumit atque sequestrat aquositatem a sanguine, non aqua sed uino, & stipticis diureticis, cum aromaticorum commixtione conficitur.

In uulneratis phlegmaticis & in hyeme, mel coniungitur potioni.

Quae

QUAE PROHIBENT
uulneratis potione admi-
nistrari.

Venter stipticus, et uiscera opilata, uel
tumida, spiritualia, sicca, uel totius
ariditas, prohibent uulneratis offerre po-
tiones stipticas & acutas.

Quibus uulneratis competant
potiones.

Quanto uulnerati maiorem patiuntur
hæmorrhogiam, tanto securius pigmen-
tis aromaticis imbuuntur.

Quibus uulneratis uinum non
conuenit.

Sicut uulneratis hæmorrhogiam pas-
sis, merum præcipue congruit, sic pronis
ad eam, derogat omne uinum, & quic-
quid acuit sanguinem uel stimulat ebul-
lite.

ARTIFICIUM SANGVI-
nem compescendi.

Sicut inflammatoria & subtiliatiua co-
sunt effluere sanguinem, sic & infrigi-
dantia & ingrossantia prohibent ema-
nare.

Sicut inquietudo & clamor & ira san-
guinem faciunt ebullite, sic eum retinent
quies

T H E S E S T O T I V S

quies, taciturnitas, & pax cordis.

Vbi uena corroditur, primo Chimo, uel putrefactione corroditur, absq; cautērio dissolvente causam apertionis eius, non sistitur fluens sanguis.

Medicina comburens cum manifesta stipticitate, ut atramentum, non solū corruptionem extirpat, sed escharam seu crustam, fluxui obuiantem efficaciter onerat.

Arteria uulnerata, quanto plus dilatatur, eò plus sanguinem euomit. Quocirca necesse est, ut eius dilatatio, quantum possibile fuerit, remittatur.

Latitudinalis arteriæ sectio promptius solidatur, q̄ apertura secundum longū.

Modica uenę pulsabilis apertura in corpore molli & humido, ut puerili & muliebri, sanari potest, magna uero uix aut nunq̄ in sicco & calido corpore.

Vbi sanguis arteriarum pre uulnere coagitur, scaturire necesse est, stipticis exterius adplicatis, iungere glutinosa.

A R T I F I T I V M S A N G

uinem resoluendi intra cor

pus.

Qui

Quibuscunq; uulneratis intra corpus recēter sanguis coagulatur, his portio resolutiua sudorem prouocans, confert cito.

QVOMODO CONSOLIDATIO uulnerum procuretur.

Consolidat efficaciter suppositū medicamen, uehementer exiccans, & nim glutinandi gerens.

Lotio uulneris exiccātibus, tepidis excerci debet, ut uino, uel aqua uini.

Recentia uulnera cum aqua ardēti lota, sanationis effectum citissime consequuntur.

Non solum aquositas omni uulneri, sed etiam frigus inimicatur, & cuiusque complexionis malitia. Quapropter oportet medicinam uariare, secundum diuersitatem corporum & membrorum, licet exiccantia communiter exiccantur.

DE REPURGANDA SANIE in uulneribus.

Sanies & maxime in uulneribus conscauis, deperditæ carnis prohibet substantiam generari.

Alimentum attractum & non incorporatum, in saniem conuertitur, & ideo uul-

THESES TOTIVS

vulneratis obest.

Sicut aquositati debentur exiccatiua,
sic vulnera saniosa, mundificantibus æ
gent medicinis.

In vulneribus quæ non saniât, uel cor-
pus non alitur, aut præ defectu, naturalis
caloris deficit attractiua, uel immutatiua.

Sanatio vulneris, ubi est opus debilis
conuersiua, nullo modo debet à medi-
co procurari.

Minister naturæ supplere tenetur defe-
ctum eius, non facere, propterea saniam
ex vulneribus eijcit, non inducit, nisi su-
perfluitas prohibens ipsorum sanatio-
nem, nequeat aliter extirpari.

In quibuscunq; vulneribus cruda su-
perfluitas conglobatur cassatione, uel ex-
trinsecorum alterantium obuiatione, seu
alijs causis, & putrefactiuis, cogenda est
sanare, nisi nerui prohibeant.

In nervosis vulneribus, calefactiuis les-
ptomeris non putrefactiuis, aut sanienti-
bus est superfluitas resoluenda.

Superfluitas vulneris nisi uertatur in
saniam, aut aliter resoluatur, uel conglu-
bata, generat apostema, uel spasmus ac-
celerabit.

In

INGENIUM CURATI

uum ulcerum sordidorum

& malignorum.

VLcera sordida, non tantum emittunt
saniem, sed uirulentis lachryman-
tur, & ideo exiccanda sunt absteruisis.

Sordidis ulceribus tumefactis exiccati-
uum congruit, absq; mordicatione resolu-
uens, ut psidia, uex, plantago in uino de-
cocta.

Ulcerebus corrosiuis, quæ sponte dila-
tantur, ac profundantur stiptica mordi-
catione carentia, debentur exiccatiua, si
uero fuerint uenenosa, ut lupus & can-
cer, tyriacalia debent esse.

Ulcera deambulatoria, stipticissimo me-
dicamine compescuntur.

Ulcera quæcunq; partim à grosso chi-
mo & ignito caussantur, partim uero à
subtili & calido sunt, noli me tãgere, ma-
nifeste resoluentibus, & pure stipticis in-
dignatur. Et ideo Solum cõgruit me-
dicamen, has uires æquatas habens, for-
titer colligatas.

Vbicunq; subtilis & grossus humor,
inæqualiter caussant ulcus prædominã-
ti, est obuiandum fortiori uirtute.

In

THESES TOTIVS

In quibuscunq; ulceribus caro est mortua, computrescit, & ideo uel ferro secari, uel igne comburi debet, aut medicinis.

In ulceribus caro moriens, & iam parum uitæ retinens, ut cancrenæ iudicium subit, cum cæteris auferendis. Quæ uero incipit adhuc mori caraxationibus et scalpellis ab humore mortificante, conuenit ut purgetur.

Sicut Sclerosi diu radicitus incalescēs, transit in herpetem, sic in ulceribus calidorum morborum, caro mortua, nisi radicitus euellatur, prope festinabit gignere sacrum ignem.

CANONES MEDICANÆ di neruis.

Punctura neruosi membri fomentis, Poleorum subtiliū perdit doloris acerbitem.

Virulentia quæ concluditur in puncturis, acerbis dolori potissimū causam præbet.

Oleum Terebinthinæ per se, uel oliuarum cum Euforbio moderate confectū, efficaciter subtrahit eruginem à puncturis.

Par est iudicium in puncturis neruorū

&

& chordarum ligamenti, & panniculo-
rum.

Nervus omnino sectus in frigidatione
veloci spasmodabitur, nisi cauterio uel fo-
mentis oleorum subtilium præseruetur,
& quilibet uiciatus aquæ infusione cele-
riter computrescit.

Nervum in frigidatum contrahens fri-
gus non spasmat tantum, sed superflui-
tas uaporosa in eodem multiplicata.

Si uulnerati sub humeris à spasmò cœ-
perunt apprehendi, cauterium profun-
dum, in spondilibus colli mortis pericu-
lum aufert uel tardabit, & ubi spasmus gi-
gnitur à punctura, confestim est dilatan-
da, & fortior expurganda.

Q. V. A. E. I. N. F. R. A. C. T. U. R. I. S.
offium sint obseruanda.

Rimula cranei quæ interior terminat-
tur, oportet ut scalpello & trepano
dilatetur, ut possit educi sanies, aut uiru-
lencia subdistillans.

Sanies aut uirulentia distillans in durâ
matrem, incommoda letifera multa pa-
rit.

Abseq; poro sensibili possibile est fractu-
ram infantium solidari.

THESES TOTIVS

Nunq̄ in dura parte sed molli, sicut ex
tremitatibus ossis petia aliàs fractura soli
datur.

DE CVRATIONE APO stematum.

Diuertendo fluentia, & dissoluendo
coadunata, uel extirpando curatur
apostemosa collectiones.

Fluxum diuertit humorem, quod res
trahit, nec repellit.

Euomentibus aliunde, q̄ per partem
apostematam, & maxime sensibilibiter flu
entia retrahuntur.

Pullulantibus in corpore bubonibus,
aut furunculis detractio sanguinis, & res
fectio tenuis exterminans exituras.

Absq̄ cibi tenuitate nunq̄ humeralis
collectio commode resoluetur.

Non solum repellit membrum, ut pos
te fluxui resistendo, sed medicina reper
cussiuua refrigerando & stipticando.

Vbi calidus, mediocris, aut subtilis hu
mor ad collectionem nō fluxerit, reper
cussio fit nocua.

Euaporatiua moderata caliditate dis
soluunt insensibilibiter globum collectio
nis.

Magna collectio, præcipue grossi humoris, citius in saniem conuertitur, quàm euaporatione dissoluatur.

Collectiones quæcunq; fuerint intracranium & thoracem, nunq; intentione directa uertit in saniem artifex eruditus, sed indirecte cum cogitur lenire maturatius doloris acerbicatem.

Euaporatiua & saniatina, nisi notabili caruerit siccitate, periculum est in scliro sim uerti collectionem.

Collectio saniosa per incisionem dissoluitur, & saniei exclusionem.

Ne chordæ uel nerui putrescant, in collectionibus iuncturarum completa generatio saniei præuenitur incisione.

Multa parit incommoda, tardare apertionem saniosæ collectionis.

Conglobata sanies, & maxime quæ in sclirosim uertitur cancrum, aut lupum, aut fistulâ machinatur, aut transit in botrium.

Turma strophularum colli securius extirpatur corrosione medicinali, & sanatione, q̄ ferro.

Quælibet extirpatio pestis inguinaris, uel subassellatis plurium strophularum,

THESES TOTIVS

in pueris & debilibus est uerenda, maxime in ætate, ne corpora febribus, aut nimia purulencia contabescant.

Scrophularum extrinseca multitudo clamitat earum pluralitatem intrinsecã, & ideo talibus strophulis nihil proficit exterius operari.

Borium colli uerendum est incisione uel corrosione dissoluere uel extirpare.

Vsus aquarum mineralium, & maxime saporis tartarei uel acuti, nõ solum interiora botia, sed extrinseca ualde extenuat.

Glandulosa collectio nõ inherens neruis, aut magnis uenis, ut nodus extirpari debet incisione cum cisti sua.

DE REGIMINE CON- ualescentium.

VEra conualescentia, nec morbum patitur, nec radices eius.

Declinatio à primitiuis causis abscessi morbi conualescentia solidatur.

Tranquillus & purus aer solummodo conualescentibus est amicus.

Mansio quam infecit ægritudinis preteritæ longitudo, conualescentis profectui squallore carceris aduersatur.

Con

Conualefcens incautus, recidiuat fefti-
nanter.

Sobrietates et perfecta digestio, corrobo-
rant membra conualefcantis.

Puritate alimentorum, & potibus aro-
maticis, conualefcantium incommoda
reparantur.

Dulcibus melodijs & amœnis aspecti-
bus, conualefcantium animus reflorêcit.

Stellarum sublimitas, gemmarum uar-
rietates, plantarum uiriditas, aquarum par-
uitas intuitum refocillant.

Exteriori corporis lotionè, & maxime
capitis, non solum alleuiantur membra
conualefcantis, uerum etiam animus re-
creatur.

Lotio crebra pedum, capiti conualefcê-
tis, & uisui præbet sinceritatem.

Exercitia consueta & placida, quæ mor-
bum præteritum nullo modo caussaue-
runt, si resumantur, paulatim & mode-
rate profunt conualefcenti.

Aromaticæ confectiões, & tempera-
te studio peritorum temperatæ, conuale-
fcentes uiuificant, matutinis horis & ue-
spertinis,

THESES TOTIVS
DE PERICVLIS RECI
diuantium.

Debiles & incauti, proptissime recidi
uant.

Graue recidium in conualescentia sa
perueniens, minatur periculum.

In grauibus debilium recidiuis, perple
xus est medicus.

Impugnare morbum, & uirtuti submi
nistrare fomenta, in recidiuatis debilibus
ualde graue.

In ualidis recidiuatis, aut cibus medici
nalibus erit subueniendum, aut leuissimis
antidotis.

Succiuas frictions debilium, in recidi
uis conuenit frequentare.

Prudentia medicantis in grauibus res
cidiuis, nunquam obmittit periculum pro
testari.

F I N I S.

Sens

SENTENTI

ARVM MEDICINALI

um Arnoldi Neocomensis de

singulorum morborum

remedijs, & me-

thodo curandi

eos,

Liber secundus.

DE AEGRITVDINIBVS

capitis.



Egritudines capi-
tis uel cerebri, sunt
in tegumentis, aut
in ramis eius.

Quæcunq; pas-
siones in capite sūt
continuae, à priua-
ta causa capitis or-
iuntur.

Quæ uero à causis exterioribus inter-
polant, ab alijs membris eius communi-
cantur.

Malitia intestinorum, & stomachi, at-
que matricis, ut plurimum caput lædit.

u 4 Om

THESES TOTIVS

Omne nocumentum actionis cuiuslibet membri, significat inesse passionem, aut morbum priuatum, uel ab alio communicatum membro.

Omne nocumentum singularis actionis continuum, causam nocuenti significat esse priuatum membro, cuius actio læditur.

Nocumenta continua plurium actionum, habentium ad se inuicem ordinem, significant membrum primæ actionis pati immediate, & posteriorum actionum læsiones ab ea procedere.

Ablatio repentina cuiuslibet actionis absq; causa extrinseca, testatur exuberare humiditates.

Omne nocumentum actionis interpolatum, non tamen interpolans propter causam primitiuam, nisi sit paroxysmale, sicut epilepsia significat causam passionis esse intrinsecam materialem, & aliunde mandari particulae patienti.

Causa passionis ab eo membro communicatur patienti, cuius immutatio precessit, uel concomitatur læsionem patientis ad quam sequitur immutatio eius.

Si membrum aliquid patiat propter causam

causam communicatam à membro uicino uel colligato, proculdubio aliqualiter immutantur cetera membra sibi uicina uel colligata, præter naturam membro mandanti, præcipue si fuerit sensus acuti.

Omne nocumentum uicinum in ramis alicuius membri, significat causam passionis in toto ramo contineri, uel in radice.

Nocumentum omne ex radice proueniens, indicatiuum est commune membris ortis ab illa radice.

Nocumentum diuturnum quod in solo ramo manifestatur, non prouenit à radice, sed proprium illius est.

Omnis materia communicata membro patienti, uel humor est, uel aliquis uapor.

Omne nocumentum subitum & momentaneum, si ab interiori processerit, oritur à uapore, si uerò taliter non fuerit, oritur ab humore.

Si morbo aliquis aggrauatur, præsentente contrario uel præcedente, per accidens illud contrarium est causa aggrauationis, sicut accidit epilepticis, colicis, ne-

THESES TOTIVS

phreticis ex frigiditate. Nam in febre aut post febrem grauius molestantur per usum aquæ, aut aliquorum infrigidantiũ contra febrem.

Si morbus aliquis abijciatur præsentē simili, uel præsentē per accidens illud cõrigit.

Quibus sudor aut consueta euacuatio diu cessauerit necesse est digestionē grauari in organo uel impediri, & nocumẽta lesẽ digestionis in interioribus apperere.

Omne nocumentum actionis tepentium, & sine causa exteriori attestatur repletioni ueteri uel antiquæ.

Cerebrum quod iuuatur calefactionibus excellenter frigidum est.

Quod iuuatur calefactionibus moderate, uel frigidum est, uel læditur ab humore, quem moderatus calor resoluit.

Quod iuuatur ab infrigidantibus, calidum est.

Quod iuuatur humectantibus, siccũ est, & econuerso.

Quod ab euacuantibus læditur, ut flebotomia, uel coitu, & cæteris, siccum est.

Quod uelociter calefit, calidũ est uel tarum.

Quod

Quod tarde calefit, frigidū est aut densum.

Quod tarde abundat humiditatibus spissis, siccum est.

Quod satis abundat superfluitatibus temperatis, humidum est.

Quod cito abūdat humiditatibus spissis acutis, foetidis, uelut putridis, calidum est & humidum.

Cuius calidum trahendo multiplicat humiditates frigidius maximè in gulosis & multum porantibus.

Quod tarde læditur à uaporibus uini fortis, est in uirtute compactum, & quasi durum in substantia.

Quod cito læditur ab eo, debile est & molle.

Dolor qui sentitur in profundo uenite usq; ad radices oculorum uel oculos, causam doloris in substantia cerebri, aut in uentriculis eius contineri significat.

Dolor qui non sentitur in profundo, sed magis extra in alijs paribus capitis, à cerebro causam doloris contineri significat.

Dolor profundus periodicus in fronte, uel protra, maximè in altero cornu, est
causa

T H E S E S T O T I V S

caussa primitiua caussã doloris significat
oriri à stomacho.

Dolor peryodicus in fundo saepe & sæ-
pius eueniens in ieiuno, maximè si acu-
tus fuerit, uaporem acutum à stomacho
procedere ad caput significat, stomachũ
esse calidum naturaliter, aut calidis & a-
cutis humoribus aggruari.

Dolor peryodicus & profundus maxi-
mè eueniens in ieiuno, & totam partem
occupans & diuidens frontem per lineã
circumquaq; protensam dum tamen sine
ponderositate & acumine, significat cau-
sam doloris siccitatem eiusdem partis,
ab inanitione ieiunij uel coitus, uel alteri-
us inanientis impressam.

Dolor peryodicus profundus, in capi-
te maximè lentus, sine causa primitiua si-
gnificat quod procedit à phlegmate, uel
uapore resoluto à membro phlegmatis
copiam continente.

Quibus craneum spissum aut cerebrũ
medullosum, & temperamētum quoq;
miringæ solidæ talibus, ut plurimum est
caput forte & non leuiter patiuntur do-
lorem in eo.

Grauiſſima cephalæa & maximè in re-
pletis

pletis, futuram prædicat apoplexiam.

In omnibus cephalicis quotidiana frequens
cum expulsio iuuat ægros.

In omnibus capitis passionibus fricatio
pedum & tybiarum præstat remediũ.

Ab omnibus uaporosis & maximè generantibus
grossum fumum conuenit cephalargicos abstinere.

Humor uiscosus qui solum in capite
continetur, uel fomētis extrinsecis & odoribus
tantum digeritur, uel aromaticis absq̃ potu
sumptis post cibum præcipue, ne ab ore
stomachi elongentur.

Chimus opprimens capitis regionem,
uel pillulis in somno ad stomachum trahitur,
uel ad palatum & nares dissoluentibus
ophthalmicis inclinatur, aut lotionibus
consumptiuis resoluitur in uaporẽ.

Pillulæ capitales debent aromaticis
abundare.

Vehementia resolutiua non conuenit
capiti applicare sine stipticorum cõmixtione.

In emicranea uiolenta & subita declinanti
ad alterum tympanum, nisi uena frontis
celeriter incisa fuerit, & multus ex
inde sanguis effuxerit, aut secetur arena
tympanum

THESES TOTIVS

porum, periculum est oculum eijci à sua
concauitate, uel rupta cornea humoris ef-
fluere, aut intus corrumpi aut cõturbati.

DE VERTIGINE

& Scothomia.

Quibus uertigo & Scothomia cau-
santur à stipicitate intestinorũ, hos
grauius in ieiuno uexant fumosis
tatis caput grauantur.

Fumositates in capite generantur pro-
pter cibi humiditatem, & eius impositio-
ne prohibentur ascendere.

Scothomia quam causant squibala in-
clusa in intestinis in exercitijs frequenter
exacerbantur.

Scothomaticus nauseas & sapore luteo
molestas in ore, nec cibum abominans,
imò copiose manducans, & auide pro-
culdubio gignit multitudinẽ humorũ,
nec à prædictis liberabitur accidẽtibz, nisi
ab eis fuerit emundatus, & quotidiana
latetur secum expulsiõne.

Sicut in habentibus stomachum cho-
lericum, esuries longa uertiginem parit &
scothomiam, sic in habentibus phlegma-
ticum refectio festinata.

Qua ratione iubetur in passionibus ca-
pitis

pitius uaporosis & subitis fricatio manuum
millarum in foeminis, eadem conuenit
in maribus fricatio testiculorum illesa de
centia, sicut in pueris.

Scorhomia fortis apoplexiam pronostica
rat cum à parua epilepsia non differat.

DE EPILEPSIA.

Epilepsia quæ sequitur motum Lunæ
si coniunctionem seruauerit, ac uici-
nos aspectus principaliter à frigiditate cau-
satur, quæ uero in plenilunio commoue-
tur, nascitur maximè ab humiditate.

Epilepsia concutiens in somno & cū
tremore medicinam aut curam non reci-
pit mortalium medicorum.

Epilepsia cōsurgens à mixtura chimos-
tum, præcipue ruffi & nigri seniliter ma-
ligna est, & curari difficilis.

Gulosi & intractati, & maximè uiolē-
ti sicut ab epilepsia tardissime liberantur,
sic ab eadem facillime capiuntur.

Epilepticus negligens à potibus absti-
nere, nunquā opprobrijs carebit epilepsia,

Epilepticus his contrarijs qualitatibus
eius interiora discrasata, & maximè nu-
trientia non multum poterit emundari.

Qui uero quandoquæ mania torquetur,
quan-

THESES TOTIVS
quandoq̄ epilepsia nuncq̄ sanabuntur.
DE FRŒNESI ET

Litargia.

FRŒnesis & litargia permutantur alterutrum sine contrario. Nam frŒnetici pereuntes fiunt litargici, sed ij frŒnescendo salutem recuperant.

Intuitus picturarum & multum diuersorum, & splendor & sonitus frŒneticos nimis turbant.

Multa lux & tumultus, & quicquid est uigilare facit litargicis multum confert.

Sicut frŒneticum non ligatum exterrminat inquietudo, sic & litargicum quietatum perneat sopor mendax.

Venter stipticus & nimis solutus ambo litargicum impellunt aut impedire dicuntur.

Vbi cerebrum cōprimit apostema, tūc & fumorum illic directis & naturalis caloris abinde subtractio festinat perniciē maximē, quia manet ager immobilis.

DE MANIACA ET

Melācholica passione.

Maniacis & melancolicis frigidus aer semper inimicatur, & quicquid in eorum corporibus fumos concludit horribiles,
fo

minus tamen & humectatio profunt eis.

Sicut timor est à melancolicis extirpandus, sic est incutiendus terror maniacis, minarum & flagellorum.

Quantum melancolicis obest habitaculum tenebrosum, tantum potest conferre maniacis, potissime si ad fletum eos induxerit.

Melancolicorū fatasmata sūt ingenio subuertenda, non damnanda, ne prouocati, respuant medentibus obedire.

Melancolici non curati, sepe transeunt in maniam.

Maniaci quorum aures falsis uocibus crebre sonant, si ligati nō fuerint, seipsosexterminant.

DE PARALYSI ET

Apoplexia.

Paralysis totius corporis, est mortis imago, apoplexiam uicariam eius preterit præcessisse, aut ueterem immoderatam attestatur repletionem.

Non solum resectio nimia, sed inanitio stomachi, præcipue calidi, potest fimositatibus incubum generare.

Infelix terminus apoplexiæ, uidelicet impotentia semicorporis lateralis demō

THESES TOTIVS

strat repletionem immoderatam.

Immoderata & uniuersalis repletio sine ydropisi, nunquam caret exuberantia sanguinis.

DE PASSIONE MEMBRORUM NERUOSORUM.

Quocumque humido replente uenas ceterosque meatus, immoderate possunt & nerui & lacerti & chordae mollificari superflue.

Lacertus imbibitus aquosa humiditate & infusina, sedibus correspondet nimium remollitis.

Chordae remollitae cedunt, & non obediunt pulsantis imperio, nam regere nequeunt ad mouendum aerem, uel sanandum praeter nimiam laxitatem.

Lacertus mollificatus perdit constantiam naturalis firmitatis, & laxitate cadit a naturali situ.

Corruens lacertus, praeter nimiam laxitatem sequitur uiam centri.

Lacertus prostratus, latus, seu naturaliter prolongatus, nequit sursum seu lateraliter mouere iuncturam cui superiacet, aut deputatur ad mouendum.

Membra relaxata praeter nimiam laxitatem non

non solum impotentia sunt ad motum, sed etiam ad sensum inepta.

Quia temperamento spiritus animalium perficitur, ideo sensus deficit ubi non admiscentur, aut eorum temperantia corrumpitur.

Membra quæ corruerunt, spiritus non recipiunt, ut solebant, & susceptos extringuunt artando & humectando.

Quanto digniora sunt opera spiritus animalis, tanto temperamentum eius melius est quàm in cæteris.

Quod magis elongatur ab excellētibus, semper facilius uincitur ab extremis.

Cuius temperantia magis declinat in alterum extremorum, corrumpitur leuiter ab illius oppositis.

Præ cunctis spiritibus est animalis subtilior, & lucidior & minus calidus, quæ propter immoderata caliditas & frigiditas uelocius eum distemperat cæteris.

In medicatione ulcerum diuturna inguinalium, aut uicinæ regionis, nisi coxæ protegantur operimentis, periculum est in posterum spasmani lacertos eorum, ac tantum infrigidari ut sint admodum inepti.

x a Quod

THESES TOTIVS

Quod autem obtenebrat & ingrossat
citius extinguit & sterilem efficit.

Membrum paralyticum licet sensu pri-
uetur, & motu calere potest, ut in sanguin-
e, qui uenarum & arteriarum benefi-
cio non priuantur.

DE SPASMO.

Repletio uaporosa secundum latum
offendens organa motionis, & lon-
gitudinem contrahenda spasmat.

Replicatio infusua uel aquosa, molli-
ficans omnes partes instrumēti motiui,
paralycat ipsum.

Spasmo repletionis resolutiua magis,
paralyti excitatiua magis conueniunt &
ruptiua.

Vniuersalis ablatio uel diminutio subi-
ta motus uoluntarij frigiditatem & hu-
miditatem cerebri significat.

Ablatio humiditatum repletionum,
ut in apoplexia.

Diminutio & laxitas siue stupor, frigi-
ditatem & humiditatem significat.

Permutatio motus uel innaturalitas
motus, & spasmositas omnium mem-
brorum subiecta, corruptam humiditatem
cerebri, uel uaporem uinosum aliunde
ueniens

uenientem in epilepsia speciebus significat.

DE VISU.

Lapsus cerebri, nerui obrici, tunicarū
Loculi, uel humoris eius, aut spiritus,
ingerunt uisui nocumentum.

DE MEMBRIS ORGANICIS,
& de passionibus oculorum.

Illis organis potest spiritus uiciari uaporibus,
ut cōfirmat scotomia & uertigo.

Nō patitur lucem solis, oculus plenus
aquoitate.

Quibuscunq; uapores colerici aut calidi
stomacho resoluti, uisum obtenebrāt,
his in fine refectionis expedit aquam
sumere frigidam cum manifesta siti, & maxime
circa somnium.

In habentibus palpebram scabiosam,
uel pilorum reflectionem pungentem
oculus perfluit lachrymis incessanter.

Quibus cerebrum reumatizat, & cibis
ingurgitantur uel potibus, oculi quauis
aura lenissima promptissime lachrymantur.

Quibus palpebra superior pre magni-

THESES TOTIVS

tudine complicatur in oculum, necesse est orbem eius pungere suis pilis.

Rugosa palpebra si deturbetur in medio, cessabit cruciari.

Si ruga superueniens in medio palpebræ, forpicipibus aut diu constricta cū massellis inflexibilibus decidat arefacta masticatica palpebralis, oculo poterit confirmari.

In palpebra moderata si pili reflectantur, oculum cū fuerint extirpati, mox conuenit sitū eorum cum acu profunde cauterizare. Sanato cauterio meatus unius pilii, cauterizandus est alter porus, interim cæteri reflexi cum exterioribus glutinentur.

Palpebra scabiosa cum inuersatur, granosa & rubea fit, semper est grauis.

Pinguedo congesta inter intrinsecam tunicam & extrinsecam, & nodus & scabies palpebram grauant, & oculum prohibent aperiri.

Venositates in cornea innaturales semper procedunt à coniunctiua, & ideo cū extirpantur ab ea marcescunt in cornea.

Vulnerum cicatrices in cornea semper albæ, quæ uero in coniunctiua ut plurimum rubæ.

Vide

Videre clare res paruas tantum ex propinquo, claritatem cerebri significat cum siccitate, & paucitatem spirituum.

Videre turbide res grossas tantum ex propinquo, turbiditatem cerebri significat, ex materia uaporosa in uenis eius, imo in rethi.

Quibus uterq; oculus caligat, altero clauso clarius uidet.

DE AVRIUM PASSIONIBUS.

Ablatio auditus & diminutio frigiditatem cerebri uel instrumenti significant.

Permutatio auditus, audire impetum aquæ, campanas, sufflationes uentorû, malleationes, cõcussiones arborum, tonitrua, frixationes, immoderatam siccitatem in media parte cerebri, aut uelaminum, significat res grossas, uapores aut uentositates aliunde uenientes, uel ibi generatas. Audire quasi à remotis humiditatem.

Quibuscunq; post obturationem auris reuiuiscit auditus, hunc proculdubio frigiditas hebetauit.

Densatio reumatis intra caput non solum

THESES TOTIVS

Iam parit grauedinem, sed tinnitum.

Surditas magna & antiqua, medicamentis auxilia non admittit.

Surditas paulatim superueniens, & continue cum se. uel sine se. perpetuatur maxime quibus ætas declinat manifeste.

Quemadmodum naturales effluxiones aurium felle, surditate superueniente curantur, ita & surditas fellis emendatur liquoribus, & maxime aurium.

Olea intro candida, uel acutis aperitiuis comparantur.

In uulneribus auris præcipue longitæporis fabularum auditus uincendus & sonorum.

Fluores aurium diuturni temporandi sunt, non constringendi & maxime subitò.

DE PASSIONIBVS NARIIUM.

Ablatio odoratus siue strictura, & eius dimissio sine opilatione narium frigiditatem cerebri significat.

Permutatio odoratus, fœtor siue immunditia, humores corruptos significat in cerebro.

Olfactus recenter amissus, acutis odoribus

nibus & ophthalmicis, restauratur frigidis & humidis liquoribus, & uiscosis diminutis.

Quibus olfactus triennio absuit, semper deficiet.

Carentes olfactu, ne delectari nec tristari possunt odoribus.

Quicumque diligentius uigilando quam dormiendo capiunt operiunt, ijs ut plurimum sanguis e naribus crebro instillat.

Si fluens aquositas in corizam subito restringatur, non solum grauabitur prota capitis, sed auditus & uisus recipiet nocumentum.

Indecens rubedo nasi & maxillarum, cum manifesta uenositate illarum partium nequit extergi, quousque ruptorij corrosiuis uultui proportionatis, extirpatione uenarum premittatur, cicatrix ibidem equalis & solida procuretur.

DE CONSERVATIONE

memoriae, & aliarum uirtutum sanitatis cerebri.

Exterior excedens frigiditas laedit memoriam, praecipue nocturna, propter malam capitis cooperturam.

Caliditas intensa ualde, quandoque

THESES TOTIVS

permiscet rationem & memoriam, & illam inde lædit.

Excedens cibi & potus quantitas, memoriam multum lædit.

Ciborum fumosorum commestio, & potus, & alliorum, porrorum, ceparum, porri, casei & leguminum, uirtuti nocent plurimum memoriali.

Ex frigidis fructibus atq; humidis, & alijs crudis refectio, lædit memoriã atq; corpus.

Fructuum stipticorum uel per naturã, aut per artem post comestionem temperata acceptio, prohibendo fumos eleuari, memoriam iuuat ualde.

Fructibus aliquibus per affationẽ stipticis, bonitas acquiritur, sicut sunt, pyramyemalia regulata, sicut & sunt auellane, castaneæ, nuces atq; ficus.

Carnium non castrati arietis, medullarumq; mutonis frequens comestio, & tota proprietate memoriam debilitat atque lædit.

Temperatorum ciborum & potus, sicut gallinarum & perdicum, præcipue cecebellorum, earum temperata refectio non tantum confortat memoriam, sed etiam totum corpus.

Potus

Potus excedens uini uel aque specialiter excedentis frigiditatis actualis corpore nimis calido calorem naturalem depauperat stomacho, & per consequens memoriam debilitat atq; lædit.

Potus post comestionem, dum cibi fiat ebullitio, digestionem interrumpēs, memoriæ & cerebro nocet ualde.

Ante refectionem corporis procurare moderatum & conueniens exercitium, non tantum memoriæ, sed cæteris uirtutibus prodest ualde. Spaciari enim & delectari sensui sunt intellectus.

Quies autem superflua calorem debilitat, superfluitates retinet & aggrauat, quare lædit memoriam & usurpat.

Somnus superfluus & uigiliæ nimia, caput, & etiam memoriam ualde lædūt.

Somnus comestioni propinquus, priusq; cibus ad fundum stomachi descenderit, surripit memoriam atq; aufert.

Superfluitarum per intestina, per nares, per palatum, per urinam, per os, per aures, & per fricationem capitis cum perfine, conueniens & debita expulsio, confert uirtuti plurimum memoriali, hoc est post somnum & exercitium faciendum.

Sol=

THESES TOTIVS

Sollicitudo uisorum uel auditorū frequens recordatio, memoriam confirmat & corroborat.

Gaudium temperatum & honesta delectatio, non solum memoriam, sed uirtutem intellectiuam, & cæteras uirtutes corporis etiam iam augmentat.

Sæpe lauare pedes in aqua calida in qua bulliarint mellissa, & folia lauri, camomilla, & similia, memoriæ, capiti, & oculis ualde confert.

Dormire calciatis pedibus, præcipue fotularibus, memoriam impedit atque sensum.

Lauare caput & decimo in decimum diem cum lixiuio, in quo calefacta fuerit, Camomilla, mellissa, uel salvia, uel maiorana, uel lauri folia, & similia, memoriam corroborat & confirmat.

Stare pedes post comestionem, suauiter deambulare, multum expedit atque confert.

Coriandri præparati post comestionem assumptio, prohibendo fumos ad caput ascendere, memoriam multum inuat.

Masticatio masticis cum modico .fa
cta

Et ieiuno stomacho ab humiditate phlegmatica sine molestia caput purgat, & inde impedita memoria confortatur.

Pliris cum musco passule & anacardina confectio, mirabulani quoque conditi confortant memoriam & restaurant.

CANONES AEGRITVDI
num membrorum spiritualium,
nutritiuorum & generatiuorum,
& primo de
spiritualibus.

PTifici & quicumque extenuati, celerissime caliditatibus aeris in profundo corporis alteratur, maxime si rari fuerint naturaliter, ut colerici, uel accidentaliter, ut qui diu febribus languerunt.

Quicumque febricitantes exposuerunt membra nuda frigido continenti, uel ut in laboriosis febribus, dolorem in articulis patiuntur, & molestam incurrunt tussim.

Extenuatos præcipue iacentes in mansione frigida, uel reumatica tussis infestat, nisi tunicatis brachijs & torace iacuerint, & capite pileato, maxime si rasum extiterit.

In extenuatis corporibus pñiculi spirituas

THESES TOTIVS

rituales & animales, & cerebrum repente & immoderate læduntur à frigido aere, uel à quibuscunq; actualiter frigidis.

Repentina panniculorum spiritualium infrigidatio subitam introducit anhelandi difficultatem, quæ si nimium contrahantur, immoderatum causabit dolorẽ, & interdum syncopim atq; mortem, constrictis capsulis cordis.

Tunica lanea sensibilibiter calefacit, & angustiat patientem. Bombicina uero uel sericina uel linea interclusa bombe, sufficienter à frigore protegit, neq; æstuatione uexat infirmum.

DE SVDORE.

Quotienscunq; sudauerint tunicati, maxime graciles expedit mutare tunicam, ne corpus lædatur infrigidato sudore.

Quanto tunica calidior, aut minus fuerit spongiosa, tanto copiosius reflectit sudorem, & ideo conuenit in prædictis festinantius deponere.

DE EPATE CALIDO.

Quibuscunq; caliditas epatis causat constipationem, ab aquosis dulcibus, uel uuis & cerasis, fortius constipantur, maxi

maximè si fuerint meseraice late, nam re-
teum fortiter exiccatur, cōstipat intestina.

In habētibus meseraicas latas, & epat
calidum, multitudo potus, non tamen
immoderata, cōstipationem prohibent
solui frigidioribus & intestinis nimium
mollificatis, nequejt inferiora superiorū
constrictione iuuari. Si uero immodera-
ta fuerit nec epat attrahere, nec intestina
potuerunt retinere.

DE FEBRIBVS.

Qui in multis temporibus in contem-
platione uixerunt, & maximè cibo pau-
cissimo celeriter eos febris uitali depau-
perat spiritu.

DE ADMINISTRA- tione uini in febricitantibus.

Quibuscunq; febricitantibus arteriæ
sunt angustæ, modicumq; spirituum
continentes, necesse est uino subti-
li & debili spiritus fouere uitales.

Febricitantes qui penuriam spirituum
patiuntur, nisi uino caute refocillentur, ci-
to deficient.

Quibuscunq; febricitantibus stomas-
chus fuerit frigidus, caput autem forte, &
uix passibile uinum congruentius admis-
nistra-

THESES TOTIVS

nistratur.

Soluti sudoris ablatio, tam in sanis & in lapsis, & maxime febricitantibus, opus latos & clausos indicat poros cutis.

DE VOCE.

Diminutio uocis euanescens per clamorem & loquendi conatum, aut per sudorem & calefactionem ex motu à frigiditate caussatur, & partim ex humiditate.

Vox rauca in loquendo & non in clamando, uel in loquendo submisse, & non alte, humiditatem tantum circa epiglottum esse significat, quæ per clamorem excutitur aut consumitur.

Rauca uox in clamando significat humiditatem dissolutam, ex conatu ad organum uocis procedere, si cum rascatione ex capite, si cum tussi aut cum subito saltu granorum ad guttur intercipientium uocem à pulmone procedit.

Quorum caput humidum est & reumatismis abundans, in acutis uocibus festinanter mutescunt.

Raucedo quam introducunt fortes & subitæ alterationes qualitatuum appositatum, ut plurimum est perpetua.

Quis

Quicumq; masticabilia bene deglutiunt, potabilia uero transfluere non possunt, uel difficiliter, his uocalis arteria nequit obturari sufficienter ab epilgoto ex uno quidem latere, si difficiliter, aut ex ambobus, simili modo ualeat deglutire.

Si trachea arteria prohibeatur obturari, ex uno latere per partem oppositam lateris ingeniatur natura potum trajcere.

Nimij & assidui cantandi usus, uel alte clamandi, pectoris meatus dilatat, & panniculos spiritualium membrorum relaxat.

Quibuscunq; spiritualium meatus nimium dilatantur, his attractus aer ab eorum pectore cito egreditur.

Aer inspiratus si moderata dispensatione nequeat expelli, uocis officium non poterit diu continuari.

Quibuscunq; cantantibus inferior clibanus aut stomachus æstuat, aliàs, resonat illis multa uentositas, & subtilis ibidem includitur circa frenem aut stomachum habentem tunicas siccas & tennes.

Quibuscunq; sanguis phlegmaticus dominatur, & uiscera sua naturaliter sūt
y cali

T H E S E S T O T I V S

calida & robusta, his phlegmatica superfluitas ad cutem copiose propellitur, & candida morphea sæpius maculantur, hoc autem illis præcipue contingit.

Sicut anhelitus & insufflatio cum ictu, & uox & loquela sunt actiones per ordinem se habentes, cum læditur ex prioribus, necessario læditur, quodlibet illi posterior, & non è conuerso. Similiter in digestionem prima, secunda & tertia, nec nõ in sensu & imaginatione, extimatione & memoria, & sic de alijs.

Sicut anhelitu læso læduntur lacerti petus ambientes, sic læsa tantum insufflatione, primo necessario patiuntur lacerti, quæ sunt intra costas. Et læsa solum ictuali, patiuntur gulæ lacerti, læsa quoq; uoce tantummodo læduntur solum musculi gutturis, hoc est, regionis epiglotti. Si tantum loquela læditur sine præcedentibus, tantum læditur lingua, uel aliquod coadiuuantium membrorum ad loquelam, ut labia, dentes, palatum & nares.

D E P A S S I O N I B V S M E M
brorum nutritiuorum, & primo me
ti & stomachi.

Quia

Quibuscūq; solito & sine nausea globus aut nodus ab ore stomachi ad guttur ascendere uideretur, & cibi transitum impedire, his crassa uentositas inter ysofagum & lacertos concluditur, aut inter tunicas meri, si cum dolore ascenderit.

Quibus uero cū fastidio & nausea globus ascendit, glomeratos lumbricos superius pelli significat.

Quoscūq; sollicitudo immoderata uexauerit, somnum impediens naturalē, si copiose reficiantur, necesse est eos indigestione grauari, & reumarismis refluerē, quapropter timendum est ydroposim aut obliuionem, aut litargiam, aut scrophulas, aut glandulosas collectiones generari, nisi superuenerit fluxus uentris.

Quod si sollicitudines importunas saepe timor concomitatur, alienationem uel cardiacam periculum est oriri.

Importuna sollicitudo corpus macerant & extenuat, praecipue si crebra tristitia uel illud comiteretur.

In pruritu & pustulis saniosis, pedum & tibiarum expedit calciamenta depone, saltem stricta & lanea.

T H E S E S T O T I V S

Fomentationes aquæ calidæ sunt uitã
dã, sed carnosus est utile balneum aquæ
frigida.

Quibus epar calidum & stomachus
frigidus, necessariũ est uenas eorum cru-
dis humoribus & phlegmaticis abun-
date, præcipue si copiose reficiantur. Nã
cruditas chili per actionem eparis nequit
corrigi.

Quibuscunq; sitis ex falso phlegmate
causatur, his uinum purum uel aqua ca-
lida sedat efficacius eam, q̄ mixtum & fri-
gida.

Quibuscunq; tenditur cutis immoder-
ate, sicut ydropicis, uel sudare nequeunt,
uel difficulter, etenim porri tẽsione strin-
guntur & obliquantur.

Quoscunq; sine febre uexauerit amari-
tudo, si deliquerit sumpto cibo, necesse
est hos, aut induratis, aut acidis fecibus
constipari, uel præter solitum ad piloton,
id est, ad fundum uentris effluere chole-
ram. Si uero sumpto cibo & maxime hu-
mido nil remittatur, aut parum, necesse
est in uenis oris stomachi concludi chole-
ram.

Quibus in ore stomachi colera conclu-
ditur,

ditur, aliàs conculcatur, hos dolor pro-
grauat in prora capitis, & amaritudo &
siccitas colerico molestantur.

In crapulosis, habentibus uentrem sti-
pticum, ut plurimum scrophæ multipli-
cantur.

Quibuscunq; stropus abundat intus et
exterius, his extrema cito infigidantur,
& grauissima quoq; sunt corpora, et mox
in labore deficiunt.

Vorantes, & quicunq; deglutiūt ut plu-
rimum cibum immasticatum, non eua-
dunt capitis nocumenta, nam aut uisus
caliginem, aut dolorem, aut putredinē
dentium patiuntur, aut aliquam cepha-
leam.

Quibus cor est paruum & epar, angus-
tæ sunt omnes uenæ.

Quibuscunq; febricitantibus stoma-
chus fuerit frigidus, caput autē forte uix
passibile uinum congruentius ministra-
tur.

Quibus craneum spissum, & cerebrū
medullosum, & temperatum miringe
quoq; solidę talibus, ut plurimum caput
forte, nec leuiter patiuntur dolores in eo
dem.

THESES TOTIVS

DE EPATE.

Quibus epar est calidum, necesse est chimos corporis, quantuncunque crudi extiterint, aliquo modo acuti.

In habentibus epar calidum, & mesentericas latas, ut plurimum sicca sunt egestiones, & velut adusta.

Corpora quae crudis & acutis abundant chimis, contrariarum qualitatuum mutationibus alterantur. Et cum exercitijs incalescunt punctis, id est, pustulis rubris, prius maculata cutis tandem albescit.

Calidi enim & acuti humoris impressio uaporosa, praevenerit frigidi & compaesi humoris impressionem, quae tardius illo dissolvitur.

In quibuscunque corporibus abundaverint chimi crudi, si calidi & acuti humoris impressio excedens superuenerit, in aliqua parte corporis immoderatam illius ostendit malitiam, quia nimis est fortis ignis qui figet in aquis, uel qui in aqua non extinguitur.

Epar habens calidum & colericum, si ceciderit in asclitem uel hypofarحام, neq

neque calidis neq; frigidis poterit emendari, sed sufficit medico retardare periculum.

Colerici & in quibus epar est calidum immoderato potu, uel usu fructuū aquosorum in hypofarcham, interdum & sæpius incidunt in asclitem. His uero assistētib; igni, sicut exigit cocorum officium, crebro percutiuntur arthetica uagatiua, cruda aquositate petente iuncturas, quæ sæpius motu dilatantur, ut spondile lumborum.

Quibuscunq; languentibus, asclitæ uel hypofarca superuenerit, carbunculus uel antrax, proculdubio mortem uicinam esse denuntiat.

Quibuscunq; iuuenibus epar calidum constipationem inducit, his potus aquæ frigidæ subuenit, præcipue si sumatur circa principium refectionis.

Quibus uapores à stomacho colerico uel calido resoluti, uisum obtenebrant, his in fine refectionis expedit aquam sumere frigidam cum manifesta siti, & maxime circa somnum.

Qui lacticinij; cibis, & piscibus, atque holeribus uescantur, ut plurimum neces-

T H E S E S T O T I V S

se est horum sanguinem abundare phlegmate, maxime si cum ijs fractibus aquo-
lis utantur.

Quibuscunq; sanguis phlegmaticus
dominatur, et uiscera sua naturaliter sunt
calida & robusta, his phlegmatica super
fluitas ad cutem copiose propellitur, &
candida morphea sæpius maculantur,
hoc autem illis præcipue contingit, qui-
buscunq; crebro sub uestibus sudor con-
cluditur.

Circa uentrem ubi sudor maxime co-
artatur, morphea sæpius incipit, & ad su-
periora sæpius protenditur, uaporis phle-
gmatici motum sequens.

Purgati, & alimenta phlegmatis euitā-
tes, à morphea celeriter emendantur, a-
quis sulphureis, & ardentibus, atq; rup-
torijs medicinis.

D E I N T E S T I N O R U M

& partium uentris passioni-
bus.

IN diuturnis uentris solutionibus, nisi
caute protegatur, anchorum regio, pa-
tiensq; sederit in sella, pannis calidis cir-
cū tecta, uexabitur in postremum ne-
fesi, uel dolore lumborum.

Qui-

Quibuscunq; uexatis tortionibus, aut alijs uentris doloribus, absq; febre uel ulcere non remediuntur, per calefactorium uel clystere, uel balneum aquæ calidæ, ijs filonium, aut alia ex magnis opiatīs, recentibus, aut non recentibus, senibus aut iuuenibus conuenit ministrare.

Quibuscunq; uenter fuerit stipiticus, & chimi crudi atq; acuti multiplicantur in uenis, ut plurimum scabie uexantur, & immunditijs cutis.

Iuuenes qui à fluxu colerico molestantur, & maxime in æstate, copiosus potus aquæ frigidæ liberat, si sumatur urgente siti, præcipue circa refectionis principiū.

Iuuenibus colericis, in uijs urinalibus ulceratis fluxum parientibus urinalem, expedit abstinere à potu uini, & maxime acuti.

In assuetis diu sedere, quorū mens studio distrahitur, præcipue quando diuersoria sunt remota, nimis retenta coartantur ægestio & urina.

Quibus ægestionis & urinæ superfluitates diutius retinentur, necesse est lumborum, aut circumiacentium membrorum passiones incurrere.

THESES TOTIVS

Assuefactio simplicis suppositorij, uel clysteris, in illis qui à constipatione grauantur quotidiana, non offendit naturam.

In regulariter constipatis obseruantia dietæ laudabitur.

Laudabilis usus nocumenta non corrigit, sed prohibet augmenta, & ideo melius est, ut corrigatur secundum quod naturæ cursus permiserit.

Intentionum rerum conspectarum tempore generationis, efficaces in genitis relinquunt impressiones.

Vigiliæ uespertinæ solemnitatis uentralis, leuitatem strangulant matutinam.

Quibuscunq; uenter immoderate tumescit absq; dolore uel impregnatione, his inter sifach & nutritiua, multa coartatur aquositas, uelut in asclite sicca, & multa uentositas, & in tympanicæ: Vel si mulier fuerit à matrice extensa à uentositate, mediocri tumor caussari potest.

Venter qui mediocri uentositate tumescit, exterius percussus, tympanizat interiorius.

Si uentus clausus ui matrice tetenderit mulieris uentrem, tunc exitus foeminae, id

id est, uulua sepius sapius ructuabunt.

Quibuscunq; uentus à sifach retinetur, his sumptis aperitiuis, ructuat per os sursum.

Tumor qui delitescit fomentis moderate calidis, & infra diem naturalem resurgit, aut circiter à tenui uel mediocri ué tofitate caussatur.

CONSERVATIO IN LAP-
plis corporibus, cum ijs quæ
lapsum corrigunt leuiter,
securius exercetur.

Aetas & innata complexio, atq; consuetudo semper attendi debent in moderanda uirtute correctiuorum.

Vbi complexio naturalis cum ætate cōiungitur declinanti, præcipuum est usus temperaturum in qualibet anni quadra.

Sicut calidiora modicum temporatis conueniunt usui tempore hyemali, sic æstatis temporibus frigidiora conceduntur.

DE CONFIDENTIBVS
& nocentibus iuncturis, & primo de nocentibus.

Possibilitas iuncturarū nequit usum nocentium in quantitate notabili to-
lez

THESES TOTIVS

Ierare, pedes corporum prædictorum aer offendit, excellenter infrigidans, & faciens æstuarè. Omnis fatigatiua deambulatione lædit eos, & maxime sumpto cibo, proluxa q̄ suspensio pedum facit idem.

Hyemalia pira & mala coctana, castaneæ, uuæ brumales, & substantiæ leguminum & raparum, iuncturis omnibus aduersantur.

Lactans porcellus aut fluuiales aues, et uetustæ gallinæ, perditialiter feriunt iuncturas inferiores cum modico interuallo.

Minas terribiles infert iuncturis & capiti, qui lac animalium cum cibus et uino frequenter sumit.

Pisces beluales, ut murex & anguilla, iuncturis inferioribus semper inimicantur.

Potus qui non expectat iudicium uere sitis, iuncturis ministrat grauamina læsionis.

In dormientibus nimis lædit articulos decubitus resupinus.

Sicut auarus uenter opprimit omnes artus, sic eius quotidiana largitas fouet eos.

Extres

Extremis artubus naturaliter excitat iracundia tempestatem.

DE CONFIDENTIBVS
iuncturis.

Flores amygdali, nec non mirri & casiomillæ, melliloti, atq; rosæ, semper iuncturis possunt conuenienter administrari.

Acorus hædera non arborea sed terrestris, iuncturis omnibus specialiter amiscantur.

Nuxindica iuncturis & neruis præ cæteris terræ nascentibus, multipliciter est amica.

Saluia parum cocta, & crebro sumpta in fine refectionis, ministrat eis inextimabile iuuamentum.

Qui sæpius calcat uuas, ac musto recētibalnear pedes suos, rarissime podagriszant.

Floribus alcanæ, laxi pedes fragiles perpetuo roborantur.

Verbena gestata recēs circa columnas pedum, uiribus occultis præbet iuuamentum hsdem.

In terris aluminosis, pedibus nunquã deest robur prosperitatis.

THESES TOTIVS

Fomentationes quoque aquæ calidæ
sunt vitandæ, sed carnosus est utile balne-
um aquæ frigidæ.

Cœleste sigillum dolores pedum fu-
gat in æternum.

SENTENTIARVM ME-
dicinalium Arnoldi Neoco-
mensis, Finis.

ARNOLDI

NOVICOMENSIS DE

morbis uestigandis, Regulæ.

PRIMA.



Mnis morbus inci-
piens à conuenien-
tia particularium,
minus est adfici-
uus, q̄ incipiens à
contrarietate parti-
cularium, uel è con-
uerso.

SECUNDA.

Omne simile superueniens morbo, au-
cuit ipsum & augmentat.

TERTIA.

Omne contrarium superueniens mor-
bo, compescit ipsum & minuit.

QUARTA.

Omne simile incipiens cum morbo,
quantum est de esse morbi, significat ma-
teriam esse paucam.

QUINTA.

Omne contrarium incipiens cū mor-
bo, quantum est de se, significat materiã
esse multam.

Ins

THESES TOTIVS

SEXTA.

Instans conuenientia cum morbo, ad
facilem eius generationem diminuit pe-
riculum, quod ex eo timeri potest.

SEPTIMA.

Instans conuenientia particularium,
quantum ad efficientiam immutandi cor-
pus, auget periculum quod à morbo ti-
meri potest.

OCTAVA.

In morbis in quibus particularia par-
tim conueniunt, & partim contrarian-
tur, uel è conuerso, si interiora conueni-
ant, exteriora contrariantur, uel è conuer-
so, cum fortis est, qui à forti non uincitur
alterante.

NONA.

In omnibus morbis incipientibus cū
conuenientia omnium particulariū, ma-
gis necessarium alterare, q̄ euacuare. In
oppositis uero oppositum, & in medijs
medio modo.

DECIMA.

In omnibus morbis incipientibus à cō-
uenientia omnium particularium, suffi-
cit euacuatiuum debile in uirtute, in op-
positis uero est necessarium forte, & in
me-

mediocribus mediocre. Et istæ duæ regulæ oriuntur à quarta & quinta, quæ sunt de paucitate & multitudine morbi materiae.

EIVSDEM AR

NOLDI DE CVRATIONE
 one Februm, Regulæ quar-
 draginta.

PRIMA.



Si febris continua superuenierit, paululum post receptionem cibi, & febris sit cum dolore, uel sine dolore, primo debemus eum euacuare per clysteria, uel suppositoria, antequàm demus potum alium, uel cibum, secundum quod natura febris exiger.

SECUNDA.

Si infirmus est bonæ habitudinis, uel non bonæ, & solum habeat uenas laticas

z &

T H E S E S T O T I V S

& grossas, & apparentes, et bene sustinet
 phlebotomiam sine syncopi, phleboto-
 metur, nisi in eo ista accidentia fuerint, sci-
 licet constipatio uentris, nausea uel fasti-
 dium, dolor stomachi, rauedo uocis, nā
 in tali casu omnia ista confirmantur, &
 deteriora fiunt.

T E R T I A.

In feбри antequā facias phlebotomi-
 am, primum conforta orificium stoma-
 chi, cum pane infuso in uino acerbo, uel
 agresta, uel uino malorum granatorum,
 uel alio uino odorifero, ut fluxus chole-
 ricus uel alterius humoris ad ipsum pene-
 trare prohibeatur, maxime in cholericis,
 & istum fluxum habere consuetis, caus-
 fat enim syncopim, & interdum mor-
 tem.

Q V A R T A.

Vide etiam ut Luna sit in bono signo,
 & ne sit dies Aegyptiaca, uel infortuna-
 ta. Luna uetus ueteres, iuuenes noua Lu-
 na requirit. Senes uocātur, qui supra qua-
 draginta sunt annos, ijs posteriores quar-
 rae

salutares conueniunt.

Q V I N T A.

In tertiana non debet fieri phlebotomia, nisi post tertiam & quartam accessionem, ut sit facta separatio maligni à benigno.

S E X T A.

Si phlebotomia nō est facta intra quatuor dies, tamen non est prætermittenda, & potest fieri intra 40. dies, si uirtus infirmi tollerauerit.

S E P T I M A.

Quinquagenarijs licet non conueniat phlebotomia, scilicet in conseruatione sanitatis, tamen in necessitate, & ægritudine imminente, non est prætermittenda.

O C T A V A.

In febricitante cholericō non est extrahendum multum de sanguine una uice, quia exasperaret magis choleram, quia

T H E S E S T O T I V S

humiditas sanguinis est frenum chole-
ræ. Succus in alijs bene habituaris, sang-
uineis uel phlegmaticis.

N O N A.

Corpore per phlebotomiam euacua-
to, factaq; solutione uentris per clysteria,
& suppositoria, infirmus est cibandus se-
cundum formam febris.

D E C I M A.

Si febris fuerit acuta, nomine absolu-
ta, conuenit ptisana non colata, aut auen-
natum, & similia. Item amyllum, lactuca
& similia, extremitates animalium, &
huiusmodi. Sed quando est acuta, conue-
nit dare ptisanam colatam, aut auenatu
colatum, lac amygdalarum, pruna sages-
ræ, & poma, sine pane. Sed in peracuta,
nihil debet dari, nisi potum aquæ, uel cu
syrupis simplicibus, ut in lex oxijzacha-
ra, syrupus acetosus simplex, unde illa
quæ possunt dari in peracuta, & in acuta
nomine absoluto, & non è conuerso.

V N D E C I M A.

Medicus non debet dare syrupum cõ-
positum uel diureticum in principio fe-
bris, donec materia uideatur digesta.

Duo

D V O D E C I M A.

In febre acuta non conuenit syrupus compositus uel diureticus, quia materia febrium istarum, est materia subtilis & acuta, & non indiget subtiliatione, sed solum alteratione cum istis syrupis supraddictis, & alijs simplicibus quę tibi uidebuntur.

X I I I.

Terminus febris acutę nomine absoluto est 14. dies, unde in illa est dietandū grossius, propter longum terminum quę habet.

X I I I I.

Terminus febris peracutę est quatuor dies, quare conuenit eis dieta magis tenuis, propter terminum suum qui breuis est.

X V.

Terminus febris perperacutę est quatuor dies, quare conuenit ei dieta magis subtiliatiua, quia terminus eius breuissimus, unde in tali febre solus potus aquę sufficit, & si aliter cibaretur, mortis periculum immineret.

X V I.

Medicus debet perpendere pectus in-

z ; firmi

T H E S E S T O T I V S

firmi, utrum siccum habeat, uel tussiat, quod si tussit, uel siccum habet, aut stridum, uitanda sunt omnia acetosa tam in cibis q̄ in potibus.

X V I I I.

Medicus aon debet dare acutam medicinam, & eradicatiuam in principio februm acutarum, ratio, quia materia que nondum est digesta, & in uenis ebullit, magis inde accenderetur, & inde mors immineret. Debet namq; medicinam lenitiuam, & cum hoc in frigidatiuam, sicut est cassica fistula, illa non commouet humores, sed ducit tantum feces.

X I X.

Debet etiam perpendere medicus, an cum febris infirmus patiatur angustiam uel uexationem in stomacho, & in tali casu medicus debet dare de optimo uino mero, cui misceatur panis tostus, & semper detur modicum, imponatur etiam emplastrum stomachale.

X X.

Si febricitans habeat stomachum infirmum, phlegmaticum, uentosum, uel frigidum, nec, nec fructus, nec herbas, nec aquam hordei, nec ordeum coctum, eis dato.

dato. Potes autem dare lac amygdalētū cum pane loto in aqua calida. Item, pul- lum cum brodio suo. Item, uinum leue, lymphatum, & panis torrefactus, infu- sus in eo.

XXI.

Cave te fallat hypostasis, quæ aliquan- do uidetur digesta, & cum nubecula, cū potius sit illa superfluitas humoralis.

XXII.

Si materia febris rapta fuerit ad caput, ponantur eisdem locis sanguisugæ, po- stea uenter procuretur cum cassia fistula.

XXIII.

Si de die in diem urina inceperit clari- ficari & attenuari, significat materiam re- cipi ad caput.

XXIII.

Si in perturbatione urinæ superuene- rit fluxus uentris, uel urinæ multiplicen- tur in quantitate, & infirmus non defia- non malum.

XXV.

Si quantitas urinæ diminuat, & flu- xus uentris augmentetur, non est pericu- lam, secus si è conuerso.

XXVI.

T H E S E S T O T I V S

In dolore capitis, & in grauamine rati
onis, uinum summpere cauendum est.

X X V I I.

Si medicus uideret febricitantem aridū,
& extenuatum, & cum tussi sicca, dolo
remq; in lumbis & omnibus membris,
iudica quod illud prouenit ex siccitate,
& tunc procedendum est cum regimine
ethicæ, unguendus æger oleo uiolarum et
rosarum.

X X V I I I.

Si infirmus sic constitutus, ut dictum
est, sentiat puncturas in pectore, & tussit,
significat illic esse humorem, & conue
nit adhibere oleum camomillæ.

X X I X.

Si infirmus sit consternatus, dolet con
tinue per omnia membra, significat dis
cursum humorum per totum corpus.

X X X.

Si febricitanti uenter fluat, ne restrin
gas, donec deficere uideris ægrotum.

X X X I.

Dolor capitis in febris continua, leua
tur per clysteria, suppositoria, per colati
onem casia fistulæ. Item ligentur primo
crura ligatione dolorosa, deinde fricen
tur

tur pedes & tiliæ fricatione leui, & ponātur in aqua in qua decoctæ sunt canne fales, & modicū camomillæ, uel in pauca aqua tepida, mixta cum aceto, uel in aqua in qua decocta sunt paleæ ordeï & camomilla.

X X X I I.

Medicus perpendat de lingua febricitantis, quæ si nigra est, significat magnam adustionem materiæ, & sitit infirmus. Infundat igitur pruna in aqua, quibus permollitis, teneat in ore, & aquam illam bibat. Valet etiam, si oleum uiolaceum teneat in ore, & collum retro fomentetur cum aqua tepida. Item oleum uiolarum in aqua, est optimum remedium.

X X X I I I.

Medicus debet facere quantum potest, custodire febricitantem de omnibus seruientibus ei. Quod si sudor superueniat ei, quod non cogatur per cooperturam aliquam, sed dimittatur in tota sua libertate, & delectabitur. Quod si molester eum desuper unum lintheamen, remoueat & stet nudus, & uult uertere se hinc inde, non impediatur, unde si qua fieret, mortis periculum incurreret. Sed si placeat

z s stare

T H E S E S F O T I V S

stare coopertum, tunc teneat tantum cooperturam desuper, quantum delectabitur, & non plus, & sustineat illum sudorem cum illa coopertura, quod diu delectabitur, & quando inceperit frequentare anhelitum, tunc statim discooperiatur, & euentetur hinc per lectum, ut amplius non sudet, alioqui mortis periculum imminet.

X X X I I I I .

Inter sudandum si anhelent febricitantes, significatur terminus sudoris illius, non etiam nimium cooperiantur, neque multum coacti sudent, sed semper permittantur in libertate, & post sudorem cum rosacea aspergantur, & detur ossa panis in uino infusa, & recreetur.

X X X V .

Si febricitans creticauerit ante, signa digestionis, propter multitudinem materiae & acuitatem eius, caue, ut residuum eius materiae educas per medicinam eradicatoriam, aut scamoneatam.

X X X V I .

Si febricitans acute, patitur nauseam, & nihil possit retinere, medicus debet iudicare, quod infirmus stomachum habeat
phle

phlegmaticum, uiscosum, & lumbricos,
qui commouent materiam.

XXXVII.

Si urinæ febricitantis incipiunt deal-
bari, & quantitas urine non diminuitur,
& infirmus habet in se omnia accidentia
bona, bene dormit, & bene anhelat, &
bene egerit, medicus debet iudicare, q̄ il-
la febris ceticabitur per apostema sub au-
re, uel in aliquo loco.

XXXVIII.

Si contingat q̄ superueniat fluxus uen-
tris, uel effusio urinæ, & urina sit in substā-
tia, grossa & spissa, tunc materia quæ de-
bebat uenire per apostema, purgatur per
urinam, aut per illum fluxum, & medi-
cus in isto casu debet perpendere, quo-
modo se habet in expellendo illas super-
fluitates. Quod si non bene se habet, len-
te iuuanda est natura, per illam partem,
per quam natura eam expellit, unde si na-
tura repit per urinam, debet iuuari ad e-
ducendum per urinam. Sed quando re-
pit per secessum, & id non bene, medi-
cus debet iuuare cum agarico ꝑ. infuso in
aqua calida, per noctem, & in auro de-
tur cum ꝑ. syrupi capillorum, Veneris.

Quan

ARTIFITIVM SOL

XXXIX.

Quando infirmi recidiuant, oportet
q̄ medicus cognoscat, an recidiuent per
malam materiam quæ remansit, aut pro
pter malum cibum quem infirmus reci
pit, aut propter aliquod accidens, ut ita
iustitia, labor, & pro ratione causæ.

XL.

Quando superuenerit fluxus uentris,
& id plus in nocte, q̄ in die, significat q̄
ille fluxus est de materia catar
rali, & per consequens
curandum caput.

THESIUM LIBRI

primi, Finis.

DE VSV

PHARMACORVM, ET

artificio suppressam alium ci
endi, Thesium Liber se
cundus, per Otho
nem Brunfel
sium.

RATIO SCRIBENDI

& disponendi recepta.



Rimum omnium
scribuntur flores,
inde herbæ, post
hæc semina, insus
per radices, ligna,
uel cortices, ad po
stremum laxatiua,
ut sene, polypodii

um, & cetera, à fine aromata, ut. 33. Cinna
momum.

In ponderibus, semper maius pondus
præponitur minori.

Moschos, ambra, camphora, scammo
neum, trochisti alhandal, & quædã hu
iusmo

ARTIFICIVM SOL

iusmodi cum granis scribuntur,

Verbi gratia post dosim pilularum, communiter grana scribuntur ij. tochiscorum alhandal, diagrediij ij. cum syrupis appropriatis.

In potionibus digestiuis, non scribuntur ultra unti. ij. syroporum, cum duplo semper aquarum.

In syrupis magistralibus pro iiij. manipulis herbarum, appone libram unam melis uel sachari.

Aquæ destillatæ uel decoctæ, non porrigantur ultra uncias v.

Pro unaquaq; libra succorū, adde melis uel sachari uncias vi.

Dosis clysterium frequenter est libra. & semis, uel libræ ij ad summum.

Opij nõ datur ultra grana ij intra corpus, inferne per clysterem non ultra v.

Nora etiam, quod oleum nõ ponitur in ulceribus, nisi sint uehementis stipticitatis & siccitatis, ueluti est oleum myrtinum & mastichinum, & si omnino ponendum est, non ponitur nisi in huleribus contusis, aut fortasse ut sedet dolorem.

Dispo

VENDI VENTREM. 184

DISPONENDI RECE

ptas, ut uocant, ratio alia. B.

Montegnanæ, alia ab ea

quæ superius est

descripta.

IN magnis compositionibus & Syrupis describuntur herbæ, per manipulos, aut partes manipulorum.

Radices in certo numero, ut ij. uel iij.

Semina, ligna, & fructus, partim per manipulos, partim per determinata pōdera, fructus tamen communiter scribuntur cum manipulis, ficus & dactyli cū numero.

Ex herbis siccis nunq̄ coquantur Syrupi, sed ex recētibus & uiridibus tantum, de reliquis ingredientibus secus.

ORDO DISPONENDI

unguenta, emplastra, trageas

& electuaria.

IN unguentis ordinandis, primo ponantur olea, inde ingredientia alia, cum cetera quantum expedit.

In emplastris, primum simplicia ordine supradicto ordinentur, deinceps olea, ad supremum cæra, quantum requiritur.

In

ARTIFICIVM SOL

In tragematis primo species composita, mox simplicia in puluerem redacta, demum sacharum quantum uidetur sufficere.

In electuarijs, primo conseruæ, secundo dario species, tertio simpliciu pulueres, ultimo syrupi, pro mixtura conditorum.

Eodem modo in morsellis, quæ sic uocant, primo species, posthæc saccharum, ultimo aquæ.

MIXTURARVM RATIO ALIA.

Libra una aquæ, requirit mellis librâ semid est, semis, in decoctione.

Libra .i. Rob, requirit mellis uel sachari uncias vi.

Drachma .i. specierum, in confectioe requirit uncias duas sachari, uel unciam unam & semis.

Trochisti opiatu ordinatur per scrupulum unum, uel scrupulum semis, non opiatu, drachmam unam & semis.

In epichimatibus uncias decem succorum uel aquarum, postulant specieru drachmam unam & semis.

In fomentis, & embrocationibus, scribe herbarum ma. .i. uel ij. aquarû librâ .i.

In linimentis unciam unam olei, dato pulueris uel specierũ drachmã unam, aut ad summum drachmã unã & semis, & cæræ quantum sufficit.

In conficiendis cæratis unciam unam olei ad signa pulueris & resinæ quantum expedit.

In cataplasmatibus, manus unus herbarũ communiter requirit unciam unam & semis olei, adipis, uel alterius pinguedinis.

Ad debitam olei & cæræ colliquationem, ad mixturam unguenti misce, uncias duas oleorum, cæræ unciam semis, ut sit in proportione quadrupla.

In confectiõibus magistralibus, ut uocãt, semper pro drachma una specierũ recipe sachari unciam unam, uel si lubet unciam unam & semis.

Pro drachma specierum, pone uncias duas sachari in tabulis, in morsellis unciam unam & semis, uel minus.

Pro unaquaque uncia specierũ confortantiũ, ueluti diambær, diamusci, &c. ad redigendum eas in tabellas, recipe sachari libram unam, ad trageam sufficiunt sachari uncia octo.

A Ad

ARTIFICIVM SOLA

Ad mollia unguenta, pro omni uncia olei uel succi, pone pulueris drachmam unam & semis, cere unciam, q̄ si libet magis inspissare, adde cere unciam semis.

REGVLAE ALIQVOT
de medicinarum præparati-
one.

SCommoneum quia stomacho supra modum est infestum, minus in morbo tatiolo teratur, inde enim fiet, ut stomacho hærescat minus, & ad ducendum uehementius reddatur.

Rhabarbarum paulo subtilius teritur, quoniam cholerae antidotus est, quæ & ipsa quoq; tenuis existit.

Omnium minutissime, subtilissimeq; atteritur colocynthis, inde enim habetur stomachus, & intestinis molesta est minus.

Rudius quoq; atteruntur, turbiti & euphorbium, eo modo quo & scammonium.

Nuncq; sola propinetur colocynthis, quia uenenositate sua perimit, ministrari aut potest cum correctiuis suis, & ijs que habent acorem eius.

Pro clystere decocturus colocynthim,
panni

panniculo inuoluto, ut à decoctione remoueas, ne quid ex frustulis ad intestina penetret.

Colocynthis si sola prouenerit in plāta sua, & aliarum copia nulla sit, colligenda nequaquā est, quoniam illa uenenum uniuersum ad se contraxit.

Idem de Scylla præcipiunt faciendū.

Quæ eiusdem substantiæ, aut symboli non sunt, ne simul teri mortariolo debēt.

Quancūq; præstaret quamlibet simplicē medicinam, ante misturam seorsim conterere, & in puluerem redigere.

In decoctionibus, leberi primum indendæ sunt radices, & ad sufficientiam decoquendæ, inde stipites, & colicoli, deinceps folia, ad postremum flores, & quæcunq; subtilioris sunt substantiæ, atq; facilius resoluuntur.

Vbi in decoctionibus pulueres specierum, ut uocant, adhibendę erunt, semper ab igne, & post cocturam adiiciātur, atq; interantur.

Hyeme confectiones ex melle potissimum, æstate ex sacharo probantur.

Fortius in hyeme, remissius in æstate medicinas excoquimus.

ARTIFICIVM SOLIS

Mel despumaturus, coquito medio
criter, ne vel plus habeat aquæ, néue ni-
mium coquendo in duriciem densetur.

Electuarijs non solutiuis, species subtilis-
simas indito, solutiuis grossiores.

Tria requiruntur. ad electuariorū con-
stitutionem, pondus æquum specierum,
simplicia recentia, & à suis locis & tem-
poribus, sub debitis etiam cœlestibus sig-
nis collecta.

DE PONDERIBVS

vulgaris, ut hodie haben-
tur in usu.

2 1 uncia ḡ lot.

2 2 5 1. lot.

31 1 quintlin.

35 ein halb quintlin.

31 ein drit teyl von einem quint-
lin, facit x. grana.

Gra. granum, pondus grani ordei.

M. Manipulus eyn handtuol.

P. 1. paulo minus est.

Cyathus. 3x. quanq̄ alij secus.

3 scrupulus.

31 5 scrupulus unus & semis.

CANONES IN EVACV
atione obseruandi.

FRigidi humores, uehementioribus
pharmacis exteruntur, calidi répera-
rioribus.

Fortes, corpulentos, ualentioribus uas-
tuato, pueros, fœminas, senes, macilen-
tos, debilioribus. Vide super ea re Aphor-
tissimos Scriptorum, Lib. 1.

Iuuat ante pharmaci porrectionem,
percunctari laborantem, an unq̄ phar-
macis usus sit, prompte quoq̄ an difficul-
ter resoluatur, nam ad huiusmodi, phar-
maca potissimum sunt contemperanda.

Anteq̄ pharmacum propines, primū
digerere materiam conuenit, nisi in mor-
bis pestiferis, & qui intra triduum peri-
munt.

Præterea semper uniuersalis purgatio
præcedit particularem.

Quantq̄ est, ubi particularem tantum,
id est, eam quæ ab uno tantum educitur
membro, præstat euacuare.

In qua obseruandum est, qua potissi-
mum ipsa inclinât materia, quam sic uo-
cant peccantem, eò potissimum ducas, et
præter eam ne capias aliam, aut humo-
res meliores.

ARTIFICIUM SOL

Præpostere faciunt, qui immodicas atq; adeo uehementes purgationes præmittunt phlebotomiæ.

Interdum tamen leuis euacuatio præmittitur phlebotomiæ, phlebotomia autem præmittitur potioni forti.

Aestate uomitus magis sollicitatur, hyme pharmaca atq; clysteria.

Qui in re medica peritiores hodie habentur, tempore æstiuo ante diem, brumali uero in die, exhibent medicamina.

Laborantes uicio intestinorum, aut internis abscessibus, aut ex præcordijs dolentes, fortibus pharmacis ne purgato.

Qui difficulter excernunt, & frigidis humoribus turgent, calidis & lenibus cibarijs sunt reficiendi, scilicet carnibus pinguibus, cum petrosilino, aut feniculo recentis coctis. Qui uero calidis humoribus sunt repleti, his attriplicem, mercuriale, & betam, uel brassicam cum carnibus pinguibus dato.

Infirmum sic institue, ut stomacho ieiunio sumat medicinam.

Quod si calidi fuerit temperamentum, aut stomacho debiliore, ante medicinam modicum aquæ ordeaceæ, aut uini grana-

natorum bibere iubeto.

Et si pedes etiam frigent, pannis calidis calefacere prius procurato.

Si remissius fuerit pharmacum, licebit paulum indormire, si uero fortis, hora una permittitur.

A pharmaci sumptione, non statim est comedendum, sed lente & tenuibus cibis est reficiendum.

Dum aluus soluta est, nisi restringere uelis, dormiendum non est.

Qui inter excernendum fame tanta urgentur, adeo ut uideantur debilitari, his non nihil panis in uino infusi dare permittitur.

Piaculum est, una die binas purgationes dare. Quod si non operetur medicina, per clysterem, aut per alia lenientia, profligenda est, uidelicet cum brodio caponis, & manne uncia una, de quibus infra plura.

Vbi pharmacum diarrhoeam, aut dysenteriam induxerit, statim syrupum myrtinum, cytoniorum, aut rhabarbarum propinato.

Inditium est perfectae euacuationis. cum siti inmodica premitur patiens, & tormi

ARTIFICIUM SOL

na nulla torquent, aut spasmus.

Medicinam reuomentibus, cum ouo ad gulam adhibito succurrimus, aut tosto pane, & in aceto tincto.

Iuuat & acetosum quippiam masticare.

Sunt qui extrema ligent, & stomacho cucurbitulas superimponunt.

Nonnullis in usu est cepa cum aceto odorata, alijs gariophylli, camphora, & mentha.

Celebrata excretionem, brodium pulli cum sacharo, ad abluenda intestina dato, inde quæ optime nutriant cibos.

De tempore, & in quibus signis ministro stranda sunt pharmaca, require ex libello Collimitij, qui inscribitur artificium de applicatione Astrologiæ ad medicinam, quem nuper in lucem ædi procurauimus.

In ipso die purgationis, post excretionem detur uinum absinthij, aut syrupus de absinthio, ad stomachi corroborationem, ne humores recipiat.

Ex cibis insculum gallinæ, uel capi, aut piscium, uel amygdalarum.

Semper expedit paulatim ducere, quã subito.

C A N O N E S A L I Q V O T
in solutione alui obseruandi.Ex Celso, Galeno & uete
ribus.

O Perosum est quorum sana sunt cor
pora purgare, torquentur enim &
subuertuntur, confestimq; dissoluuntur.

Expedit igitur, anteq; pharmacum de
mus, prius tenuare, secareq; crassos, & glu
tinosos humores, spiramenta interpella
re, qui purgatoria medicamenta trahuntur.

Debent itaq; serosi & tenues succi in
principio ægritudinum primum deijci,
glutinosi quiq; concoquendi sunt.

Inepti sunt purgationibus, quicumque
obæsi, quiq; multi sanguinis sunt, & con
tinue animo deficientes, qui difficiles &
confestim uomentes, quibus oblata occasio
ne.

Item pueri & senes, & mulieres, mul
tum mēstruis purgatæ, quiq; corpore sūt
puro, & in uictu moderati.

Item, quibus suapte natura aluus con
stringitur, & qui torminibus & cœlica
passione facile capiuntur. Hi omnes deie
ctioni non sunt idonei.

ARTIFICIUM SOL

Iuxta Celsum, omnibus catharticiis aloe admiscenda esset.

Aluus si uehementius fluit, aut sæpius ducitur, hominem infirmit.

Si febris adsit, satius esset pharmacum non dare, sed eius rei causa, cibos & portiones assumere, qui simul & alerent, & uentrem mollirent.

Corpora quoque in aduersa ualitudine diu exhausta, periculose euacuantur.

Præterea si aluus quiddam reddat quotidie, & alioqui liquida fuerit, caute agendum, nisi suprema cogat necessitas.

Pridie etiam abstinere debet æger, ut tali sit aptus curationi.

Eodem etiam die, ante aliquot horas aquam calidam bibere debet, ut superiores partes eius madescant.

IN QUIBUS MORBIS
conueniat ducere aluum, ex
Celfo & alijs.

NE sæpe pharmaca sumantur, quia stomachum ferè lædunt, & tamen semel sumpta uel bis, non omittantur.

Si caput graue est.

Si oculi caligant.

Si morbus maioris intestini est, quod colon nominant.

V E N D I V E N T R E M. 196

Si in imo uentre aut coxa dolores sūt.

Si in stomachum quædam biliosa cō-
currunt.

Si piquita, aut alius quispiam humor
in stomachum immodice confluerit.

Si spiritus difficilis redditur.

Si nihil uenter per se excernit.

Si corruptum est quod excernitur.

Aut si prima inædia febrem non sustu-
lit.

Cū si sanguinem mitti cum opus sit,
uires non patiuntur, tempusq; eius rei præ-
terierit.

Aut si is qui sæpe uel sponte, uel casu
purgatus est, habet subito aluum suppres-
sam.

Propinant hodie etiam pharmaca,
phreneticis, maniacis, melancholicis, uer-
tiginè correptis, ictericis, comitiali polla-
tis, apoplecticis, qui ad respirant hepati-
cis, stomachicis, splenicis, morbo gal-
lico, & omnis generis scabiei morbis cō-
fecis.

P H A R M A C A V E N T R E M

ducetia, simplitia. Io. Mesueh.

Loe.

A Mirabolani, citrini Indi.

Eme

ARTIFICIUM SOLI

Emblici.
Bellirici.
Rhabarbarum.
Cassia fistula.
Tamarindi.
Manna.
Aqua lactis
Rosæ,
Violæ.
Absinthium.
Sticas.
Fumus terræ.
Eupatorium.
Epithymus.
Hissopus.
Hissopus montanus.
Pruna.
Psillium.
Capilli Veneris.
Asarum.
Ius veteris Galli.
Volubilis.
Scammoneum.
Turbit.
Agaricus.
Colocynthis.
Scylla.

Poly

Polypodium.
 Iris.
 Cucumer asininus.
 Centaureum.
 Carthamus.
 Been.
 Lapis armenus.
 Lapis lazuli.
 Lapis stellatus.
 Sene.
 Species aliquot salis.
 Baurac.
 Sarcocolla.
 Serapinum.
 Euphorbium.
 Oppoponax.
 Mezereon.
 Alsebra.
 Luff.
 Alfefera.
 Archanita.
 Aristolochia.
 Albumesuch.
 Geneſta.
 Helleborus.
 Interior cortex Sabuci.
 Quæ

ARTIFICIUM SOLA

QUAE PHARMACA A

quibus membris principalibus euacuent.

Cathartica capitis.

Colocynthis.

Agaricus.

Stycas.

Lapis lazuli

Epithymus.

Aloe.

Lapis armenus.

Scylla.

Sal Indus.

Rebuli Indi.

Iera picra.

Ieralogodion.

Theodoricum.

Pilula Cochiae.

Pilula Aureae.

Pilula alefanginae.

Pilula aggregatae.

Cathartica appropriata pectori.

Agaricus.

Volubilis.

Cassia fistula.

Colocynthis.

Hiffoz

- Hissopus.
 Sarcocolla.
 Iris.
 Diasenæ.
 Pilulæ de agarico.
 Stomachica.
 Absinthium.
 Aloe.
 Mirabolani.
 Omnes medicinæ solū
 lenitiuæ & compressi
 uæ.
 Diaprunis.
 Stomachicū catharti
 cum.
 Pilulæ de Iera picra.
 Pilulæ stomachicæ.
 Catharticum imperia
 le.
 Epar purgantia.
 Rhabarbarum.
 Absinthium.
 Eupatorium.
 Mezereon.
 Tamarindi.
 Serapinum.
 Lupulus.

CARTIFICIUM SOL

Fumus terræ
Myrabolani.
Iris.
Sarcocolla.
Diaprunis.
Triphera Saracenicæ.
Pilulæ de Rhabarbaro.
Splenetica.
Hermodactyli.
Oppoponax.
Sal Indus.
Euphorbium.
Cucumer asininus.
Helleborus niger.
Polypodion.
Turbith.
Sal gemmum.
Serapinum.
Centaureum.
Helleborus albus.
Electuarium de succo
rosarum.
Benedicta.
Pilulæ de Benedicta.
Pilulæ de Hermodacty
lis.
Pilulæ atthetica.

Catharticum imperiale.

P H A R M A C A V E T E R V M

quibus aluum purgabant.

Ex Celso.

Diectionem, ut inquit Celsus, antiqui varijs medicamentis, crebraq̄ alui ductione, in omnibus ferè morbis moliebantur, dabantq̄ aut nigrum, uera trum, aut filiculam, aut squamam ætis, aut lactucæ marinæ lac, cuius gutta pani adiecta, purgat abunde, aut lac, uel asininum uel bubalum, uel caprinum, atq̄ salis modicū adijciebant, decoquebātq̄ id, & sublatis ijs, quæ coierāt, quod quasi serum supererat, bibere cogebant.

D E H I S Q V A E C A T A R T I C O S m i s c e n t u r .

EX ijs quibus Cathartica ipsa permiscemus, porrigimusq̄, ueteres his ferè usi sunt.

Cocto melle, mulso, hydromelite, pti sana, aqua pura, aqua in qua coctum esset fœnogræcum, uel malua.

Item, pro ratione cathartici, marina aqua, uel aqua sale mista, syrupis, sacharo, & id genus quibusdam, quæ & hodie ferè in usu habemus.

B Simo

ARTIFICIVM SOLIS
RES IPSAE QVIBVS
utimur ad confectionem mee
dicaminum.

HErbae.
Flores.
Semina.
Cortices.
Radices.
Fructus.
Folia.
Ligna.
Succi herbarum.
Gummi.
Resinae.
Lachrymae.
 Ex animantibus.
Liquores.
Pinguedines.
Medullae.
Ossa.
Coria.
Locia.
Excrementa.
 Ex inanimis.
Terrarum multa genera.
Lapides.
 Gemae

Gemmæ & margaritha.
Metallorum uaria genera.

Ex prædictis omnibus
componuntur.

Electuaria.

Opiata.

Solutiua.

Condita.

Species Loh.

Syrupi.

Rob.

Decoctiones.

Pilulæ.

Trochisti

Suffus & pulueres.

Vngenta.

Emplastra.

Cerota.

Olea.

Epithimata.

Embrocationes:

AQVAE VVLGARES

quibus communiter utuntur,
ad mixturas syroporum, &
epithimatam.

AQVAE CAPITALES.

B : Ca

Ex quibus que
dã extra, quæ
dam intra cor
pus recipiunt.

ARTIFITIVM SOL= V

Calidæ.	Frigidæ.
M Aioronæ.	Lactuæ.
Salviæ.	Nenupharis.
Camomillæ.	Plantaginis.
Rutæ.	Portulacæ.
Prassij	Solatri.
Mellissæ	Cerasorum nig
Iuulæ ampanæ.	gorum.
Hissopi.	
Betonicæ.	

Aquæ pectorales.

Calidæ.	Frigidæ.
Capillorum Veneris.	Cucurbitæ.
Buglossæ.	Acetosæ.
Calamenti.	Maluæ.
Scabiosæ.	Cerasorum nig
Borraginis.	gorum.
Feniculi.	
Melissæ.	
Hissopi.	
Prassij.	
Lupulorum.	
Camomillæ.	
Arthemisiæ.	
Radiciis gariofilatæ.	

Aquæ oculares.

Calidæ: Feniculi, Eufragiæ, Chelidoniæ
Fris.

Frigidæ: Rosarum, Plantaginis.

Aquæ Epaticæ.

Calidæ.

Asparagorum	Eupatorij.
Lupulorum	Apij.
Camomillæ.	Petroselini.
Rorismarini	Feniculi.
Hissopi.	Fumiterræ.
Absinthij.	Scabiosæ.
Chelidoniæ	Raphani.
Cerefolij.	Betonicæ.

Aquæ stomachales.

Calidæ.

Menthæ.	Calamenti.
Feniculi.	Pulegij.
Fumiterræ.	Cerofolij.
Absinthij.	Saluæ.
Eupatorij.	

Frigidæ.

Lactucæ.	Rosarum.
Endiuæ.	Plantaginis.
Portulacis.	Solatri.
Ordei.	Epaticæ.
Cicoreæ.	Cardobenedicti

Aquæ conferentes
spleni.

ARTIFICIVM SOLV

Calidæ.

Rorismarini.	Rutæ.
Hissopi.	Eupatorii.
Tamarisci.	Scolopendriæ.
Acori.	Fumi terræ.

Frigidæ.

Nenupharis.	Cuscutæ.
Aquæ renales.	

Calidæ.

Feniculi.	Petroselini.
Raphani.	Armoratiæ.
Saxifragiæ.	Enulæ.
Scolopendriæ.	Parietariæ.
Vrticæ.	Ceresolij.
Agrimoniæ.	Arthemisiæ.
Nasturtij.	

Frigidæ & temperatæ.

Lupulorum.	Camomillæ.
Alkakengi.	Lactucæ.
Portulacæ.	Centinodij.
Serum lactis.	

Conuenientes matri.

Calidæ.

Parietariæ.	Vrticæ.
Betoniciæ.	Ceresolij.
Saluiæ.	Leuistici.
Arthemisiæ.	Chelidoniæ.
	Matticariæ.
	Fris

Frigida: Portulacæ. Centinodij.

IN QVO PONDERE

propinandi sunt syrapi & digestiua. Ex Montagnania.

Digestiuas medicinas exhibemus aut syrapios, aut aquas destillatas, aut de coctiones.

In syrapiis compositis non licet transcedere uncias duas syrapi, licet dosis consuetata sit uncia una & semis. Neq; transcedere aquarum uncias iij. pro quaq; uice.

Si uolueris syrapium clarificare, ut magis arrideat infirmo, accipe subduplum quantitatis ultra quantitatem predictã, quãmq; melius dare non clarificatos.

Medicus uolens ordinare syrapium, debet miscere aquas appropriatas ei mēbro, quod respicit syrapius. Verbi gratia: Ut accipiēs medicinam stomachaicam, assumat etiam aquam stomachabilem, si simplex sit medicina.

Si composita sit ægritudo, diuide syrapios & aquas, ita tamen q; maior quantitas respiciat deteriore mē egritudinem, minor autem quantitas malam egritudinē, uel disponat ut syrapius respiciat unã partem, aqua aliam. Verbi gratia: Volo re-

ARTIFITIVM SOL

mouere dispositionem stomachi frigida, scribo sic: Recipe syrapi de absinthio unciam unam, syrapi de mentha unciam semis, aut oxymellis scyllitici, si crassior fuerit humor, unciam semis, aquas absinthij & menthae an. un. se. misce pro una uice.

In caussa calida, recipe syrapi rosacij unciam unam, syrapi uiolarum unciam semis, aquarum uiol. Endiuia, an. unciam unam & semis.

Nota, in quacunq; caussa, siue calida siue frigida, semper expedit aquam aliquam miscere cordialem, ut aquam mellissae, & buglossae.

Qui syrapi, quibus mebris, & quibus humoribus conueniant, uide infra in tabulis.

DE SYRVPIS QVI

magno artificio constat.

Magistralis syropus uocatur, qui est compositus ex uarijs medicinis, uarias aegritudines respicientibus.

In compositis morbis, syropis quoque magistralibus atq; compositis est utendum.

Aduerte etiam qd pro quatuor mani-

pu

pulis herbarū, in decoctione semper ad
de lib. i. mellis despumati, aut sachari.

DE CONFECTIOE

Rob.

Rob ordinantur per pondera, id est,
per libras & uncias, per manipulos
minime. Verbi gratia: Recipe menthæ li
bram i. uel uncias vi.

Maior tamen usus est syruporum quā
rob, quia magis palatum afficiunt.

Vtuntur tamen rob in digerendis hu
moribus remotis. Item, ægritudinibus.

Præparantur Rob eodem modo & or
dine, quo syrupi magistrales, ita q̄ sacha
rum & mel adduntur post succi decocti
onem, eodem modo & pulueres.

Typus.

Recipe pomorum lib. i. fiat succus, &
ponatur in uase bene obturato ad solem,
donec exiccetur & pinguescat, deinde ex
hibeas cum aqua, aut alio, dosis est uncia
ij.

Nota q̄ in materia grossa, phlegmati
ca uel melancholica, fortioris operatio
nis est rob q̄ syrupus, quia fortior est ope
ratio in succo q̄ in decoctione. In materia
autem calida præstantior syrupus quā
rob.

B 5 In

ARTIFICIVM SOLA

In gargarismatis quoq, fortioris est operationis rob q̄ syrupus.

DE RATIONE CONFECTI- tionum.

Confectiōnum quædam sunt protri-
tæ & simplices, quædam quæ ma-
gno artificio constant.

Vulgarium, ut aromatici, rosati, dia-
cinnamomi, diacymini, diambra &c.
Quarum dosis pro una uice est usq; ad
drachmas vi. siue ut alijs placet, drach-
mas iij.

DE EPITHIMATIBVS.

Epithemata proprie constant ex aquis
destillatis & speciebus, quæ panno se-
ricino, uel laneo imponuntur membro
laboranti.

Epithemata adhibemus, temporibus,
cordi, stomacho, epati, spleni &c. inter-
dum renibus.

Epithemata epatica, fiunt ex aqua &
speciebus conferentibus epati Cordialia,
ex ijs quæ conducunt cordi.

Epar respiciunt species sandalorum in
caussa calida, species diarodon, & diacin-
namomi in caussa frigida.

Species cordiales, electuarij de gem-
mis

mis, in quocunq; labore Species diamusci & diambrae in causa frigida.

Dosis epithematum ab un. x. usq; ad 12
Dosis specierum a drachma una & se. usq; ad xij. uel pro lib. i. aquarum & specierum drach. i. & semis.

Miscentur epithematis, aceti un sem. aut uncia seorsim, maluatice, aut uini odoriferi seorsim, in epithematis cordialibus, quamq; alijs magis arrideat crocus.

In febribus calidis probantur epithemata, sed in statu, & declinatione existente morbo, & materia, ut ipsi uocant, euacuata.

Ingredientia.

Succi. Aquae destillatae. Pulueres diuersarum specierum.

F O R M A S C R I B E N D I

Epithemata.

Epithema frigidum.

R Ecipe aquarum epaticae.
Endiuiae.

Solatri. An. un. iij.

Semperuiui.

Aceti. un sem.

Sandalorum drach. i. & se.

Misce & fiat epithema.

ARTIFICIVM SOL^s

Interdum additur aqua rosacea, neq^e est certus aquarum numerus.

Epithema calidum in hydrope.

Recipe aquarum Eupatorij.

Sene.

Abinthij.

Añ. un iij.

Specierum diarodon albatis. dra. se.

Aceti modicum, misce & fiat epithema.

Si non fit copia specierum, possunt usurpari, saltem aliquot pulverizata, aut aquæ solæ cum aceto.

Neq^e est determinatum tempus epithimatum, sed assiduo imponuntur, præsertim in febribus acutis, & pestilentia.

Modus applicandi cum panno lineo, uel scarlaco.

DE EMBROCATIONE.

EMbrocatio fit cum spongia madefacta, in decoctione herbarum, ex quibus componitur, applicaturq^e membro laboranti.

Præpollet epithimatis, & aquis distillatis.

Decoquitur usq^e ad medietatem, in aqua fontis aut fluminis.

Quemadmodum stomachica embrocatio conficitur ex his, quæ stomachum respiciunt.

respiciunt. Sic capitalis, ex his quæ caput,
& sic de alijs.

Quilibet manipulus herbæ, requirit
aquæ libram semis.

Forma scribendi Embrocas.

Recipe foliorum labruscæ.

Absintij.

Menthæ An. m. i.

Mellissæ.

Bulliant in lib. quatuor aquæ, usq; ad
consumptionem medietatis, uel tertie sal
tem partis, deinde facta decoctione, ma-
defacito spongiam, & applica loco do-
lenti.

Præsentius iuuamentum præstant, si
ante cibum adhibueris, neq; est medici-
na, quæ podagris, ischiadi, arthritidi, &
id genus morbis, promptius auxilietur.

D E P R A E P A R A T I O N E
unguentorum.

Differentia Emplastorum & un-
guentorum.

Differunt unguenta, & emplastra,
quia unguenta ex subtilioribus. Em-
plastra, ex rudioribus speciebus & simpli-
cibus conficiuntur, durataq; magis ac de-
sius. crassescunt.

ARTIFICIUM SOL

Seorsim quaslibet species contūdi cō
uenit atq; misceri.

Cerata quoq; differunt ab unguentis,
quia cerata ut plurimum cum resina.

Unguenta cum modico cære inspā
santur, atq; interuntur.

Unguentorum quædam mollia, quæ
dam mediocria, quædam crassa, quæ o
mnia constant ex cære admixtione im
modica, aut moderatione.

Pro qualibet drachma una specierum
aut pulueris, adde olei uel succi ʒ. i.

Unguentum incarnatiuum est, quod
de sarcocalli inscribitur, consumptiuum,
quod dicitur, Apostolorum: Corrosiuū,
ut illud de lytargyrio.

Forma scribendi unguenta.

Recipe oleorum de absinthio.

Nardi.

Dementha.

añ ʒ. i.

Garyophylorum:

Masticis.

drach. i.

Calami aromatici.

Misce, & fiat unguentum molle, cum
modico cære.

Primum igitur ponantur olea, aut succi,
inde species, postremo si libet, addi po
test

test pinguedo gallinæ, aut alia.

Differentia linimenti & unguenti.

Linimentum subtile, unguentum cras-
sius est, & nullo non tēpore adhiberi pos-
sunt.

Ingredientia simplicia unguen-
torum.

Oleum.

Butyrum.

Axungia.

Pinguedines ex
animalibus.

Gummi.

Cera.

Species.

Modicum vini uel aceti, propter pene-
trationem.

Modus applicā-
di, ut prius scice-
tur locus inungē-
dus, cum panno
lineo, et calidū
aut tepidum in-
ungatur.

De linimentis.

Linimenta ferè ex iisdem constāt, qui-
bus unguenta, adduntur albumen oui, et
aquæ distillatæ, ut liquidiora fiant, ac fe-
tè cum linteolo illinuntur.

D E P R A E P A R A T I O N E

Emplastrorum.

IN emplastris conficiendis, non redigū-
tur in pulueres herbæ, sed decoquun-
tur, inde olea adduntur :

For

ARTIFICIVM SOL

Forma scribendi Emplastra.

Recipe Florum chamomillæ.

Meliloti.

Semen anethi. añ. ma. semis.

Radiciſ althææ.

Oleorum chamomillæ.

Anethi añ. ʒ. i.

Delilio.

Misce, bulliant ex his ad spiffitudinē,
& fiat emplaſtrum.

Conficiuntur, ut ferè ſemper man. her
barum correfpondeat ʒ. i. olei aut ping
uedinis, uel ʒ. i. & ſe.

Præferuntur unguenta emplaſtris, ſic,
ut ſi nihil efficiat unguentum, poſtremo
loco adhibeantur emplaſtra.

Ingredientia.

Herbæ, flores, folia, farina, ouorum ui
telli, albumen, ſici, butyrum, pinguedi
nes, ſpecies.

Species in emplaſtris craſſius teruntur,
ne in formam malagmatis trãſeãt, quod
mollior emplaſtro eſt.

DE CONFECTIONE

Trochiſcorum.

Differentia pilularum & tro
chiſcorum.

Pilulæ

Pilulæ minuscule sunt & rotundæ, globatæ. Trochisci maiusculi, in medio compressi.

Pilulæ solvunt ventrem, Trochisci rarius, & in aperiendis meatibus sunt crebriores.

Pilulæ certo ac definito tempore exhibentur.

Trochisti indifferenter, & nullo non momento, gustui etiam minus sunt abominabiles.

Pilulæ gluciuntur, Trochisci resolvuntur, aut in minorem formam pilularum rediguntur.

Trochisti apertiui.

De rhabarbaro.

De berberis.

De spodio.

partim in caussis calidis, partim frigentibus.

De Eupatorio.

De Mirabolanis.

De Ieralogodio.

De Epithimo.

Confortatiui: De absinthio, de mentha.

Forma scribendi Trochiscos.

Recipe mastice.

Cinnamomi electi.

C Gary

ARTIFITIVM SOL

Garyophyllorum. añ drach. se.

Goriandrorum præparatorum.

Calami aromatici.

Recipe, Trochisci cum syrupo de mentha, aut cum aliqua aqua.

Pondus trochisci, non excedat dr. se.

Fiunt & ex succis trochisci, sed rarius.

Dosis trochiscorum non opiatorum, est à drach. se usq; ad drach. ij. ad summū communiter tamen scribitur drach. i.

Apertiui trochisci nō dantur ultra quā titatem drach. i, uel drach. se.

Nota etiam, q̄ diutius durant Trochisci q̄ pilulæ.

SVMMA ELECTVARIORUM calidorum.

Diamargariton. Stomachicum.

Dipliris arco.

Diacapparis.

Dianthos

Diammusci.

Elect. ducis.

Iustinum.

Diazinziber.

Diacitoniten.

Diasatyron.

Garyophyllatum.

Diagalanga.

Diordon Iulij.

Diahyssopum.

Diacoston.

Diasene,

Diaprassion.

Diairis.

Pocio S. Pauli.

Diarhabarbarum.

Lithontribon.

Dia

Diapyrethron.	Diaborrago.
Diacuminum.	Diacostoreum.
Diacalamentum.	Dianisum.
Diamuschon.	Diamarathron.
Philantropos.	Zittiber conditū.
Diaturbich.	Diambra.
Lætitia Galenæ.	Pocio mustata.

Summa Electuaria frigidorum.

D iadragantum.	
Diapenidion.	
Diarhodon abbatis.	
Diaprunis.	
Confectio trium sandalorū.	
Diapapauer.	
Electuarium Phthysicorum.	
Rosata nouella.	
Sacharum uiolarum.	
Electuarium de succo rosarum.	
Triphera Saracenicā.	
Electuaria opiata, ut uocant,	
atq; Narcotica.	
Rubea trochiscorum.	
Requies.	Aurea.
Athanasia.	Hadryanum.
Antidotum Hæmagogum.	

ARTIFICIUM SOLI

Dialyobanum. Philonium.
Mithridatum. Musa ænea.
Micleta. Theriaca electa.
Triphera magna.

DE DECOCTIONIBVS.

Decoctio pectoralis.

Recipe, passula, enucleata, liq. mund.
añ. ʒ. i. tamarind. iuiuba, radicum yreos
ysopi, añ. ʒ. sem. ordeï ʒ. ij. sem. feni, fenu
greci drach. .i. capil. uene. ʒ. se. aquæ plu
uialis uel fluuialis lib. iij. bulliant simul
usq; ad consumptionem medietatis, &
serua usq; ad tempus necessitatis.

Decoctio communis.

Recipe, ord. ʒ. iij. prunorum dama
scenorum numero xij. liquir. mund. ra
marindorum passularum enucl. añ. dra.
se. Sem. ani. foenicul. añ. dra. ij. aquæ flu
uialis uel fontis lib. iij. bulliant lento ig
ne usq; ad consumptionem medietatis.

Decoctio digerens & purgans
coleram.

Recipe prunorum damascenorum nu
mero xij. rama. ʒ. se. florum uiol. drach. ij
qualiter sem. com. frig. excortica. ʒ. ordeï
ʒ. i. se. fiat decoctio in lib. ij. aquæ fluua
lis uel pluuiialis usq; ad consumptionem
mes

medietatis, uel in lib. iij. & reserua.

Decoctio purgans & digerens
phlegma.

Recipe, radicum se. & petro. an. ʒ. se. ra-
dicum yreos yfopi an, drach. iij. capil. ue-
neris, un. se. mellis ʒ. ij. & fiat decoctio in
lib. iij aquæ fluuiialis uel pluuiialis, usque
ad consumptionem medietatis.

Decoctio purgans, & digerens
melancoliam.

Recipe florum borag. & bug. añ. ʒ. se.
passularum, enucle. corticum indicum
capparorum corticum tamar. scolopen.
polipodij an. dra. ij. sem. ani. se. fen. casc.
añ. drac. iij. fiat decoctio in lib. iij. usq; ad
consumptionem medietatis.

Decoctio purgans & digerens cole-
ram & phlegma simul.

Recipe prunorum damas. numero x.
radicum foeni. drach. ij. capilli Veneris ʒ.
se. quatuor sem. connu. frigid. & excorti-
ca. ʒ. se. ordeimund. ʒ. i. fiat decoctio in
lib. iij aquæ fluuiialis uel pluuiialis usque
ad consumptionem & reserua.

Decoctio purgans & digerens phle-
gma & melancoliam.

Recipe florum borag. & bugl. an. ʒ. se.

C ʒ ras

ARTIFICIUM SOLI

rad. fen. petro. yreos, yfopi an-dra. ij. se.
ani. feni an-drach. ij. corti radi-cappa ta-
mar. scolo. polip an-drach. .i. se. capil. Ves-
ner. 3. se. fiat decoctio in lib. 4. aquæ usq
ad consummationem medietatis.

Decoctio carminatiua.

Recipe sem. ani. fen. carui aneti ameos
ruthē an. 3. se. fiat decoctio in lib. iiij. aque
usq ad consumptionē medietatis & ser-
ua. Posset etiam pro clysteribus addi de
floribus camomill. sticad arab. & melli-
lo. & sic erit decoctio notabiliter carmi-
natiua.

DE MINORATIVIS.

Minoratiuum commune in
forma liquida.

Recipe medullæ cassiæ electæ, & nouis-
ter extractæ 3. .i. uel drach. x, uel loco cas-
siæ pone mannam in eadem dosi, & cū
decoct. torm fiat potio, quæ administretur
summo mane. Et nota, q post medici-
nas minoratiuas debiles, longa dormi-
tio non conuenit, sed breuis, ne uirtus i-
pſius corrumpatur, & substantia eius in
nutrimentum conuertatur, ut potest in-
telligi.

Minoratiuum commune in forma
bili.

Res

Recipe cassiæ electæ & tapellate un. .i.
nel drach. x. & cum zucc. & fiat bolus, su
me ut supra.

Minoratiuum coleræ in forma li
quida.

Recipe diaprunis non solutiui, cassiæ
extractæ succi rosa. an. un. se. misce cū de
coctione purgante & digerente coleram
fiat potio cui addat syrupi uiolati unc. se.
& detur in potu.

Minoratiuum phlegmatis in for
ma liquida.

Recipe cassiæ electæ & nouiter extra
ctæ un. .i. electuarij Indi maioris drach. ij.
ij. misce cum decoctione purgante & di
gerente phlegma, cui addatur mellis ro
sa. colati un. se, & in potu tribuatur.

Minoratiuum melancholiæ in forma
liquida.

Recipe medullæ cassiæ electæ nouiter
extractæ diaprunis non solutiui an. se. cō
fectionis hamech drach. ij. misce cum de
coctione purgante & digerente melan
choliæ, & fiat potio, & tribuatur, & po
test addi un. .i. syrupi uiol.

Minoratiuum coleræ & phlegma
tis simul, in forma liquida.

ARTIFICIUM SOL

Recipe cassiæ nouiter extractæ, diaptu-
nis non laxatiui an. un. se. diafinico. dra.
ij. misce cum decoctione purgante & di-
gerente coleram & phlegma, simul fi-
at potio, cui addatur syrupi uiol. mel. ro-
sati colati an. ʒ. se. detur, ut supra.

Minoratiuum phlegmatis & melan-
colix simul in forma liquida.

Recipe cassiæ nouiter extractæ unciam
unam, electuarij indi maioris confectio-
nis hamech an. drac. i. boni pon. & cum
decoctione purgante phlegma & melan-
choliã, simul fiat potio, cui addatur mel-
rosat. colati syrupi uiol. an. un. se.

Minoratiuum cholerae & melancho-
liæ, simul in forma liquida.

Recipe cassiæ nouiter extractæ unciam
unam confectiois hamech drach. ij. ele-
ctuarij succi rosati drach. i. fiat potio cum
decoctione purgante & digerente chole-
ram & melancholiam simul, cui addatur
syrupi uiol. un. i. & detur ut supra.

DE CORRECTIONE medicinarum.

REubarbarum corrigitur & præpara-
tur addendo ei tertiam partem, spi-
ci nardi uel cinamomi uel masticis uel
quils

sq̄uanti, & datur cum aqua casei, uel cū decoctione purgante & digerente coleram, uel alijs decoctionibus, & secundū necessitatem, & quando infunditur debet infundi in aqua endiuia, si est in æstate, & in uino bono, albo, odorifero in hyeme.

Scomonia præparatur, si decoquitur in citonio, & corrigitur, si detur cū aqua mirabola. citrinorum uel masticis uel citoniorum, uel cum zucharo uiol. uel cū syrup. rosa. & nota quòd maxima æget præparatione & correctione.

Turbith corrigitur & præparatur, si addat ei tertia pars zinziberis electi, & quando administratur, datur cum melle rosa. colato uel conserua. uiol. uel cum decoctione passularum. Et nota q̄ non debet nimis conteri, sed tantum mediocriter, ut patet intelligenti Mesue, & aliorum dicta.

Agaricus corrigitur & præparatur addendo ei tertiam uel quartam partem zinziberis salis gemæ, & datur cum oximelle squillitico, quod est ex maxime uigorantibus & uelocitantibus eius operationem, uel etiam cum melle rosato cala.

ARTIFICIVM SOLI

Mirabolani corriguntur & præparantur, quando teruntur cum amygdalis dulcibus, aut cum passulis enucleatis, aut cum semine anisi, aut spica nardi, & quando dantur in forma potabili, dantur cum decoctione communi, uel cum sero capris no specialiter dantur hoc modo.

Citrini dantur cum decoctione purgante & digerente choleram.

Indi dantur cum decoctione purgante & digerente melancholiam.

Alij uero Kebuli, emblici, bellirici, dantur cum decoctione purgante & digerente phlegma uel melancholiam.

Lapis lazuli corrigitur & præparatur super lapidem, uel in mortario lapideo, & sic teratur & lauetur trigiesies cum aqua dulci, & similiter iterum sic terendo lauat decies cum aqua rosata, & administratur cum diarraginato, uel cum aqua buglossæ, & uino odorifero, & similiter cum decoctione purgante melancholiam.

Sene corrigitur & præparatur, si addatur ei tantundem zinziberis uel salis gemme, & quando administratur, datur cum aqua decoctionis florum boraginis, bu-
glossæ

glossæ, gariofilorum, macis & cardomomi, & potest etiam decoqui in quantitate magna cum brodio carniū, uel pulsi, absq̄ trituratione in brodium illud operationes suas placide, & sine molestia operatur.

Polipodium corrigitur & præparatur cum redolentibus, sicut sunt semen anisi & feniculi, zinziberis, cinnamomi, gariofilorum, & quâdoq̄ administratur cum aqua mellis, aut cum aqua decoctionis passularum.

Hermodyli corriguntur & præparantur cum cinamomo, mastice, zinzibere & pipere longo, et quando administratur, dantur cū oximelle squillitico, & melle rosato colato.

Colloquintida corrigitur & præparatur cum mastice & galla & quando administratur, datur cum aqua mellis, modus enim rectificationis secundum Mesue est. Incidatur minutissime cum incisorio, & inuoluatur subtili inuolutione, cum glutino dragaganti aut bdellij, & excicetur, & teratur illud contritione forti, & fiant trocisci, cum pauco mastice resoluti in oleo rosato, uel cum laudano, aut
aqua

ARTIFICIVM SOLA

aqua mellis. Et dicit ulterius, & scias de decoctione, & est quod completam sustinet decoctionem.

Euforbium corrigitur & præparatur, si inunctum cum oleo amigdalino intra frusta citri inuoluatur in pasta, & decoquatur, & corrigitur, si addatur ei mastice & spicæ ana secundum quantitatem suam, & quando datur, cum aqua mellis detur.

Epithimon corrigitur & preparatur, si addatur ei tertia pars salis gemme, uel salis indi, & debet incorporari cum oleo amigdalino dulci, & quando administratur, datur cum decoctione mirab. nigrorum mellis & passularum. Et nota quod non sustinet decoctionem magnam, sed parum debet decoqui.

DE DOSIBVS SOLV- tiuorum, tam simplicium quàm compositorum.

Reabarbaræ dosis est secundum Mesuam suam in substantia, & secundum alios a drach. ij. usque ad iij. & in infusione a drach. ij. & sem. usque ad decem. Communis autem dosis est in substantia, & secundum alios a drach. ij. usque ad iij. per se

se, & in infusione a drach. iij, usque ad viij. Nota tamen q̄ dosis dicti, & aliorū sequentium solutiouum. Conuenientes si unumquodq̄ solutiuum detur per se, et sine permixtione aliorum solutiouum. Si autem permiscerētur solutiua, cōsiderandæ sunt doses eorum, siue debiles, siue mediocres, uel fortes sint, & ceteris paribus quantum additur de uno, tantum diminuitur de reliquo. Et sic surgit dosis alia communis, quæ ex parte aggregati, nihil tamen differt à prima, ut patet consideranti.

Scamoneæ secundum Mesue, per se dosis est grana 5. usq; ad duodecim.

Myrabulanorum citrinorum secundū Mesue, in substantia dosis est a drach. ij. usq; ad 4. ut dicit liber meus, sed reperi in alio, & forte sic uult dicere, dosis est infusorum a drach. v. usq; ad decem.

Cassia fistulæ per se, dosis est communis a drach. vi. usq; ad unciam unam & semis. Et secundū alios ab uncia una usq; ad duas, & ipsa quidem mirabiliter operatur, quando datur cum aqua casei, ut ait Mesue capitulo proprio.

Mannæ secundum Mesue dosis est, a
dra

ARTIFICIUM SOLI

Drach. vi. usq; ad xxv & secundum alios sicut cassiæ.

Succi rosarum secundum Mesue, capitulo de rosis, est uncia una cum aqua ca-
sei & spice modico, & in fine capituli dis-
ctæ dosis succi rosati, est ab uncia usq; ad
ij. cum zucharo, & portio similiter facta
cum succo eorum est ab uncis ij. usq; ad
v.

Tamarindorum secundum Mesue est
dosis à drach. iij. usq; ad v. Et secundum
alios, in decoctione sunt eiusdem dosis
cum cassia aut manna.

Aloes, secundum Mesue, dosis est ab
aureo semis usq; ad drach. ij. & in infusi-
one ab aureo uno usq; ad drach. iij.

Anteq; ad doses compositorum soluti-
uorum ulterius procedam, q; primū po-
nendus est modus ad inueniendum do-
ses ipsorum, ut si receptas aliquas in ipsis
error sit, ipsas adauctas discere, & corrigere
ualeas. Modus autem talis est: Accipia-
tur quoduis compositum solutiuum, &
consyderetur quantitas solutiuorum sim-
plicium intrantium, & similiter non solu-
tiuorum per se, quo facto, diuide soluti-
ua secundum doses per se conuenientes.

Vere

Verbi gratia: Si sunt duo solutiua, uel tria eiusdem dosis, aggrega per se, & similiter fac de alijs, tunc uide doses communes aggregati ipsorum solutiuorum, & similiter aggregati non solutiuorum, & tunc surgit dosis uera, non fallibilis, ut manifeste patet. Si autem uis scire, quantum uadit de quolibet solutiuo, pro qualibet diuide solutiuum in tot partes quot sunt omnium solutiuorum, & tunc pars tibi dicit, quantum illius solutiui, cuius per se intrat, & in qualibet dosi, ut patet consyderanti.

Electuarij de succo rosarum, secundum Mesue, dosis est drach. v. & secundum Nicolaum, dosis quantitas castaneæ, & in matutinali hora.

Dyaprunis solutiui communis dosis est à drach. ij. usq; ad unciam se.

Dyaprunis non solutiui, secundum Mesue, dosis est quantitas castaneæ, & communis dosis est ab uncia se. usq; ad unciam unam.

Syrupi acetosi solum educentis coleram dosis potest esse ab un. se. usq; ad unciam unam & se. Licet Mesue & Nicolaus nihil dicant de eius dosi.

Dya-

ARTIFICIVM SOL

Dyateubarbari secundum Nicolaum
 dosiſ est ꝑ iiiij. uel un. una, & forte uult di
 cere, ut credo ꝑ iiiij. uel drach. i. & ſe. &
 detur cum apozimati de anifo.

Electuarij de pſillio, ſecundum Meſue
 doſiſ eſt a drach. iij. uſque ad drach. iij.
 & ſe.

Diacaffiæ fiſtulatæ doſiſ eſt ab ꝑ. i. uſq;
 ad ꝑ. i. & ſe.

Confectio de ravedſeni Meſue, dato
 ꝑ ipſe non ponat doſim, tamen poteſt eſ
 ſe ab uncia ſe. uſq; ad drach. vi. uel uncia
 unam.

Syracoſt ſecundum Meſue, doſiſ eſt a
 drach. i. uſq; ad duas in æſtate.

Pillularum de reubarbaro, ſecundum
 Meſue, doſiſ eſt drach. ij. cum aqua caſei
 calida in ſero.

Pillularum aure. doſiſ drach. i. ꝑ. iiiij.

Agarici ſecundum Meſue in ſubſtan
 tia doſiſ eſt a drach. i. uſque ad drach. ij.
 in decoctione, uel in infuſione a drach.
 ij. uſq; ad v.

Turbith ſecundum Meſue, doſiſ eſt a
 drach. i. uſq; ad drach. ij. & etiam portio
 eiſ a drach. i. uſq; ad iiiij.

Mirabolanorum Rebulorum in ſub
 ſtans

stantia dosis est à drach. ij. usq; ad unciam se. sed in infusione ab un. se. usque ad unciam unam & drach. ij.

Mirabolanorum emblicorum, secundum Mesue, in substantia dosis est ab aureis ij. usq; ad tres, & in infusione ab aureis tribus usq; ad v.

Bellericorum dosis est sicut emblicorū & citrinorum, ut alij dicunt.

Colloquintide dosis est secundū Mesue à kyrat vi. usq; ad x. & capiunt eā caueant frigus.

Euforbij secundum Mesue dosis est à kyrat i. usq; ad ij. secundum alios dosis est à granis iij. usq; ad xij.

Hermodaetylorum dosis est, secundū Mesue, ab aureo uno usq; ad ij.

Efulæ dosis est a drach. se. usq; ad dra. ij. in pulu. in decoctione a drach. ij. usque ad v.

Diafinicon dosis est a drach. ij. usque ad tres. Et secundum alios, dosis est a drach. ij. usq; ad drach. v.

Diacitronicen solutiū phlegmatis est, a drach. ij. usq; ad drach. v.

Blance Nicolai, secundum ipsum dosis est, quantitas castaneæ, secundum ali-

ARTIFICIVM SOL

os a drach. ij. usq; drach. iij.

Secaniabin solutione educens phlegma, dosis est ab un. i. usq; ad unciam unā & sem.

Benedicti, secundum Nicolaum, dosis est ad modum castaneæ, & secundum alios est ab un. se. usq; ad i.

Hyerepigre Galeni, secundum Nicolaum, in potu dosis est à drach. ij. ad v. & secundum alios dosis est ab un. se. usque ad unam, & maxime pro clysteribus.

Pilularum elefanginarum communis dosis est à drach. se. usq; ad i. uel à ℥. iij. usq; ad drach. ij.

Pilularum aggregatiuarum secundum Mesue sdois est à drach. i. usq; ad drach. mas ij.

Pilularum de agarico, secundum antidotarium magnum, dosis est drach. ij. & secundum alios dosis est à drach. i. ad ij.

Pilularum de hyera dosis est a drach. i. ad ij.

Pilularum aure. dosis est à drach. i. usq; ad ℥. iij. uel drach. ij.

Pilularum feridar. mesue dosis est à dr. i. usq; ad drachm. ij. & communis dosis est à drach. i. usq; ad ℥. iij.

Pilularum de hermodactyli, secundū Mesue, dosis est à drach. ij. usq; ad ij. communis dosis est à drach. i. ad ij.

Pilularum sine quibus esse uolo, secundum Nicolaū, dosis est pillul. xij. uel xij. secundum quod dicit in Antidoratio magno, communis dosis est à drach. i. ad ij.

Pilularum stomaticarum, secundum Mesue, dosis est à drach. ij. ad ij.

Mirabolanorum Indorum, secundum Mesue, dosis est sicut kebulorum, & est in substantia à drach. ij. usq; ad iij. & in infusione à drach. iij. ad x.

Lapidis Lazuli, uel stellati abluti, secundum Mesue, dosis est à drach. i. ad ij. sem. non loti uero est à drach. se. ad i. & nō debet applicari nisi lotus.

Lapidis armeni, secundum Mesue, dosis est à drach. se. usq; ad i. & loti à drach. i. usq; ad ij.

Epithimi, secundum Mesue, dosis est à drach. iij. usq; ad vij. in puluere portio eius in decoctione à drach. v. usq; ad xx. et non accipiat in æstate.

Polypodij, secundum Mesue, est dosis à drach. ij. usq; ad aureos iij.

Sene, secundum Mesue, infusio & po

A R T I F I T I V M S O L

rio est ab aureis tribus usq; ad unciam unam, & pulueris eius secundum alios est drach. ij. usq; ad unciam sem.

Confectio hamech, secundum Mesue, dosis est à drach. ij. usq; ad aureos ij. & secundum alios dosis est à drach. ij. usq; ad unciam se.

Dyacitoniten solutini melācholię dosis est ab aureo .i. usq; ad .ij.

Secaniabin solutione educens melancholiam, dosis est ab un. .i. usq; ad unc. se. uel ad uncias ij.

Iera rufini, secundum Nicolaũ, in Antidotario magno, dosis est quantitas castaneæ cum aqua calida, & detur de sero.

Carattici imperialis, secundum Nicolaum in dicto antidotario, dosis est quantitas nucis magnæ, det sero ante uel post cœnam.

Dyacatolicon, secundum Nicolaum in dicto Antidotario sine lapide lazuli, dosis est un. se. uel plus uel minus, secundum quantitatem recipientis. Quando autem in eo ponitur lapis lazuli bene ablutus, dosis est minor, ut patet, quia pro qualibet lib. ipsius intrant ipsius unc. ij. lapidis lazuli, abluti secundum antidotarium.

Pilz

V E N D I V E N T R E M . 211

Pilularum indarum descriptione Haly, quas ponit Mesue dosis est à drach. ij. usq; ad aureos ij. & dantur cum aqua casei, & sunt sanæ & expertæ.

Pilularum de lapide lazuli, secundum Mesue dosis est drach. ij. cum aqua casei.

Pillul. de lapide armeno, secundum Mesue, dosis est drach. ij. ut supra.

Pilulæ de fumo terræ dosis est à ℥iij. ad drach. ij.

D E C O N F E C T I O N E

Ceratorum.

Recipe olei Citoniorum

De mentha añ. unc. i.

Garyophyllorum.

Masticis añ. drach.

Fiat cerotum cum rosina.

Adhibentur cerota, stomacho, epati, cerebro, spleni, sed cerebro in forma rotunda, epati in forma lunari, spleni et matriçi in forma quadrata.

Præpollent unguentis cerota, emplastra uero cerotis, in passionibus tamè stomachi mirabiliter conferunt cerota.

Crassius etiam teruntur in illo species, q̄ in unguento.

Nota etiam q̄ cerota confici debēt ex

D 3 sim

ARTIFICIUM SOL

simplicibus illis, quæ membrum illud respiciunt, cui cerotum est applicandum.

Ingredientia.

Olea.	Species.
Cera.	Gummi.
Rhesina.	Sinapi.

Observatur in eorum mistura pondus idem quod in unguentis.

SYRVPVS RESPICIENS
stomachum & cerebrum.

Recipe absinthij.

Florum labruscæ. añ. ma. se.

Menthæ.

Radici feniculi.

Maioranæ.

Saluiæ. añ. se.

Betonicæ.

Eustragiæ.

Bulliant usq; ad consumptionem, deinde adde mellis despu. lib. i. misce & fiat syrupus.

Si pulueres sint addendi, coque primum herbas, inde pulueres misceto, ad postremum mel.

DIFFERENTIA IVLEP
& syrupi.

Nota

Nota q̄ Iulep fit ex aqua distillata & sacharo. Syrupus uero ex decoctione & melle, uel sacharo.

Sūt qui omīssa dosi mellis, in arbitriū hæc referunt pharmacopolarum.

Aquæ distillatæ licet mirabile & artificiosum sint inuentum, ex arte alchimica mutuarum, tamen præstat more ueterū, tri decoctionibus, utriusq̄ dosis est, usq̄ ad ʒ. vi. nec licet excedere hoc p̄odus pro una uice.

D I F F E R E N T I A C O N =
fectionis & electuarij.

Confectio ut plurimum fit cum sacharo & aquis. Electuarium cum melle & syrupo.

Ad quamlibet dra. i. specierum, adde sachari electi ʒ. ij. hoc modo.

Recipe spec. aromat. rosar. dra. i.

Diacynnamomi dra. s.

Confectio

Sachari ʒ. iij. fiat confectio in tabulis.

stomahalis.

Alia Cordialis.

Recipe Specierum elect. de gēmis dra.

unam.

Diamusci. drach. i. & se.

Offis de corde cerui. añ. ʒ. i.

D + Mar =

ARTIFICIVM SOLA

Margaritharum perforatarum. an. ʒ. i.
Sachari ʒ. vi. Fiat confectio in morsellis
cum aqua buglossæ.

DIFFERENTIA MIX-
turarum & Electuvariorum.

AD mixturas, composita ipsa in for-
ma solida & propria accipiuntur.
Electuaria constant speciebus confecti-
onum.

Forma scribendi mixturam.

Recipe sachari rosati.

Sachari buglossæ. añ. ʒ. i.

Sachari borraginati

Fiat mixtura cum syrupo de agresta.

Tempus exhibendi confectioes cere-
brales, stomachicæ, & cordis, est duæ
horæ ante prandium.

PLINIANA VENTREM
ducentia.

Cucumer syluestriſ portione uirium,
ab dimidio obolo ad solidum, copi-
olius, necat. Lib. 20. cap. 1.

Pepones cap. 2.

Colocynthis herbacea, per se inanit al-
uum. cap. 3.

Molochos agria, uel Hibiscum ex aqua
potum. cap. 4.

Suc

Succus lactuce in posca potus ad duos obo-
 bolos. cap. 5.

Brassica Crispa. cap. 9.

Heraclium acetabuli mensura. cap. 17.

Rhoea, & erraticum, inter sativa & sylue-
 stria medium genus, quinque capitibus
 eius decoctis in uini tribus heminis ce-
 rantis, dimidio acetabulo immulso.
 cap. 19.

Tithymalon, mecona uocant, alij paralio-
 on, dimidio acetabulo in mulso, cap.
 19.

Atriplex cocta cum malua. cap. 20.

Lapathi folia, cum sale. cap. 21.

Sinapi. cap. 22.

Marrubium cum aceto & sale potum. 22.

Asarum. cap. 21. 19.

Iris ruffa duabus drachmis cum melle,
 eod. 20.

Lychnis syluestris, bilem detrahit, dua-
 bus drachmis, atq; ad eam rem effica-
 cissima. Eod. 26.

Batis. Lib. 21. cap. 27.

Urticæ semen tostatum, in ciboq; datum,
 22. 13.

Eadem cum conchilijs cocta. ibidem.

Succus heliotropij decocti. cap. 21.

ARTIFICIVM SOLI

Decocti succus potus efficacissime exinanit, Ibidem.

Thesum ex aqua tritum. 22. 22.

Lens modice decocta. 20. 25.

Cicer sylvestre largius sumptum.

Eruum copiosius sumptum.

Vitis alba decocta. 23. 1.

Oenanthinum oleum, heminae mensura, cum uino & aqua calida potum, aut pitisanæ succo.

Oleum cicinum cum parum calidæ mensura, priuatim dicitur purgare præcordia.

Pruna aluum molliunt, stomacho uero utilissima, sed breui momento. Lib. 3. cap. 7.

Succus mororum maturorum, pituitas ac tineas, & similia uentris animalia extrahit.

Idem præstat & arborum radix.

Cerasa aluum molliunt, stomachoq; utilia sunt. Siccata aluum sistunt.

Diaphnoides sylvestris laurus, aluum soluit recenti folio uel arido, drachmis tribus cum sale, & hydromelite manducata. cap. 8.

Ammoniacum. Lib. 24. cap. 6.

Sty =

Syrax.

Spondilion.

Pix spissa. cap. 7.

Ulni corticis denarij pondus potum
in hemina aquæ frigidæ, pituitam agit,
& aquas priuatim trahit. cap. 8.

Sabuci radices in uino decoctæ, duo cy-
athi pori, hydropicos exinaniunt. cap. 8.

Eiusdem cortex interior sumptus, al-
uum per se purgat. cap. 8.

Semē uiticis cum pulegio & melle po-
tum. 9.

Semen clematidis acetabuli mensura,
in aquæ hemina, aut aqua mulsa. 10.

Datur ex eadem causa & decoctum
eius Rhus, quæ & Erythros appellatur.

Alio quidem soluendæ, uel in febrî
decoquitur Mercurialis, quantum manus
capiat. in duobus sextarijs aquæ ad dimi-
dium ebibitur sale & melle admixto, nec
non cum ungula suis, aut gallinaceo, de-
coctum salubrius, purgationis causa, pu-
tauere aliqui utramq; dandam, siue cum
malua decoctum, thoracem purgant, bi-
lem detrahunt, sed stomachum lædunt.

De usu hellebori, uide Plinium lib. 25.
cap. 5.

Ex

ARTIFITIVM SOL
EX PLINII LIBRO

26. Cap. 8.

Purgat aluum succus centaureæ mino-
ris drachma in hemina aquæ cū exi-
guo salis & aceti, bilemq; detrahit.

Betonica aluum soluit drachmis qua-
tuor, in hydromelitis cyathis nouem.

Item Euphorbiū uel agaricum drach-
mis duabus, cum sale modico potum ex
aqua aut mulso obulis tribus.

Cyclaminos ex aqua pota, aut bala-
mis subditis.

Item Chamæcissi balanus.

Hissopi manipulus decōctus ad tertiā
cum sale, pituitas trahit illitus, uel contri-
tus cum oximelle & sale, pellitq; uentris
animalia.

Pituitam & bilem detrahit peucidani
radix.

Anagallis ex aqua, mulsa.

Epithymon, qui est flos è thymo, aluū
soluit cum 4. drachmis ad sex, cum meli-
lis exiguo, salisq; & aceti.

Leuiter soluit Nymphæa in uino auste-
ro.

Pycnocomi radix, in aqua mulsa xij
pondere denariorum, & aluum & bilē

&

& pituitam exinanit.

Detrahit bilem polypodium, exprimitur succus radicis aqua madefacta, & ipsa confissa inspergitur oleri & betæ & maluiæ, uel fassamento, uel cum pulicula coquatur ad aluum leniter soluendam, uel in feбри detrahit bilem & pituitam.

Scammoneum quoq; dissolutionem facit, bilem detrahit, aluum soluit, præterq; si adiçiantur aloes drachmæ duæ obolis eius duobus.

Hydropem purgant Tichymalli, trahunt pituitam sale adiecto in mulla, media portio tribus obolis constat.

Aloes bibitur cochlearis mensura, in duobus cyathis aquæ tepidæ uel frigide, bis, tære in die, ex interuallis, ut res exigit, purgationis etiam causa, plurimum tribus drachmis.

Alypon aluum soluit in aqua mulla, addito sale modico.

Androsæmon rasum cum semine, potumq; matutino uel à cæna drachmis duabus in aqua mulla, uel uino uel aqua pura totius portiois sextario, trahit bilem.

Assyriion & assyroides bilem detrahit.

Lib. 27. cap. 5.

Abz

ARTIFICIVM SOLIS

Absinthium, quod etiã animalia unã cum stercore eijcit.

Calla, ea quæ atro similis est. cap. 8.

Thelipteris filicis genus, primo bilem trahit, mox aquam. cap. 9.

Hypophæstum, succus eius extrahitur ad soluendam aluum, tribus obolis, maxime in comitialibus, & hydrope. cap. 10.

Polygmati semina largius sumpta, solvunt. cap. 12.

Peplos bilem ac pituitam detrahit.

Cap. 12.

Cameli cauda arefacta, soluit aluum. Lib. 28. cap. 8.

Idem præstat eius urina, quæ à quibusdam ad hoc seruatur.

Solvunt ventrem quoq̃.

Mercurialis beta & malua, in iure porcino coctæ.

Polypodium cum pauco cinnamomo.

Esulæ pulvis præparatus cum pauco cinnamomo.

Agaricus & hermodactyli, contemperati in uino.

Vini maluatici cyathus, adiecto butyri recentis, & in eo seruefacti unci. 1. & bibita.

Reli

Reliqua ex tabulis nostris pere simplicium pharmacorum.

E X D I O S C O R I D E L I

bro primo, uentrem soluentia.

IRis bilem & crassam pituitam purgat,
I ex hydromelite drachmis septem epos-
tis.

Afari radices, senis drachmis ex aqua
mulsa potæ, purgant ueratri modo.

Balaninum oleum.

Oleum grani Gnidij potum.

Rosaceum potum.

Susinum oleum epotum, bilem extra-
hit.

Irini spissamentum mensura cyathi.

Styracis modicum cum rhesina tere-
binthina bibitum.

Amygdalæ.

Ex Libro secundo.

Sepia cocta.

Recens felis in cibo, nutrit, & facilem
prebet aluum.

Cobius piscis potu datus.

Recentium piscium ius, modo per se,
modo ex uino potum.

Serum lactis, quando sine acrimonia
uolumus deiectionem moliri.

Cases

ARTIFICIUM SOL

Caseus recens, modice emollit.

Lac largius epotum.

Felle omni perfacilem, præsertim in
fantibus, deiectionem quis molietur, si
intinctum in eo tomentum sedi subijci
at.

Tragos.

Linum.

Phaseoli.

Omnia genera Lapathi.

Brassica marina.

Cauliculi asparagorum in cibo com
mesti.

Succus cucurbitæ feruefactæ & expres
sæ, cum melle & nitro exiguo potus.

Item uinum in cucurbitam recentem,
excavatam, infusum, si mistum sub diuo
teneatur, epotetur.

Lactucæ comestæ.

Ocinum.

Thlaspe bilem & pituitam utramque
extrahit, potum acerabuli mensura.

Radicula, siue lanaria herba.

Semen & flores hastulæ regiæ in uino
poti.

Scylla, eius usus est, ad singulas affæ
partes adiectis octonis rotti salis; cochle
ar

at unum aut alterum ieiunis dare.

Agaricus drachma una aut altera, si cū aqua mulsa bibatur.

Centauream decoctam, bilem & crassos humores per aluum educit.

Ex libro tertio.

Aloe stomachum repurgat, binum cochlearium mensura, in aqua frigida, aut lacte pota.

Deuorata cum rhesina, aut cum aqua, uel melle cocto, sumpta, aluum soluit.

Abfinthium marinum.

Hissopus, crassum humorem extrahit, decoctum ex aceto mulso, atq; epotum.

Origanum acetabuli mensura, in aqua mulsa potum, atros humores extrahit.

Tragoriganos bilem deijcit.

Succus dictami illitus, aut cum polenta tritus.

Pulegium atram bilem per aluum deijcit.

Peucedanum.

Ammoniacum potum.

Syluestris lychnis.

Parthenium, non secus atq; epithymū bilem atq; pituitam detrahit.

Aiuga, uel Chamepithys trita in fari-

E nam

ARTIFICIVM SOLA
nam, & cum fico in pilulis sumpta.
Ex Libro quarto.

Betonica.

Semen Clematitidis bilem atq; pitui-
tam detrahit, in aqua aut hydromelite
potum.

PHLEGMA DVCENTIA.

TUrbith.

Cartannis.

Hermodactyli

Anacardi.

Esula.

Euphorbium.

Tapfia

Laureola.

Aristolochia.

Agaricus.

Sarcocolla.

Myrabolani ke-

Tithimallus

buli.

Radix cucurbitæ.

Ciclamen.

Centauream.

Ducentia choleram.

Aloe.

Lupulus.

Abfinthium.

Centaureum.

Tamarindi.

Fumus terræ.

Pruna.

Scammonium.

Mirabolani cittini.

Helleborus.

Caffia fiftula.

Serum lactis.

Succus uiofarū.

Succus rofarum.

Manna.

Composita.

Electuariū de succo rofarū. Diaprunis.

Ducen

Ducentia melancholiam.

Mirabolani Indi.	Sene.
Helleborus niger.	Thymus.
Lapis lazuli.	Polypodium.
Scicas.	Centaurea mai.
Iuncus quadratus.	Epithymus.
Scylla.	Serpentaria.
Lapis lycis.	Succus caulium.
Capilli Veneris.	

MIXTOS HVMORES
educunt.

Phlegmati & Cholera communia
sunt.

P olypodium.	
Cataputia.	De pondere &
Agaricus.	correctione vide
Centaurea minor.	suo loco.
Helleborus uterq.	Tithymalli.

De Helleboro.

Helleborus niger, & phlegma & cholera purgat, confert etiam cancro & surditati.

Datur mixta Scammonio.

Sufficit & radix sicca & infusa in uino aut oxymelle.

Propinatur & cum iusculo gallinae.

Item cum prisana.

E 3 Item

ARTIFICIVM SOL

Item cum lenticula cocta, additis suis correctiuis.

Corrigitur autem pipere, aniso, origano, dauco, petroselino, & calamento.

Dosis eius usq; ad ℥.i. & semis in puluere, in pilulis usq; ad ℥.i.

De Coccognidio.

Coccum gnidium purgat phlegma & choleram.

Dabantur eius grana numero 30. olim

Item 21. cum melle uel mulso.

Bibuntur & cum uino.

A potione modico oleo abluitur gurgulio propter incendium.

De Mercuriali.

Mercurialis herbae folia, molliter cocta, & commesta. stercora sufficienter deponunt, sed minus.

Bibitur & decoctum eius, cum uino temperatum.

De polypodio.

Polypodium phlegma & choleram educit.

Datur in mulsa.

Item in iure gallinaceo.

Item cum prisana cocta.

De Aloe.

Datur cum mulla, educit phlegma & choleram.

Trita & inspissata cum succo brassicæ, ut fiant ex ea catapocia.

Fiant ex ea & catapocia ex melle cocto, uel resina terebinthina.

Dabatur eius drach. i. cum Scammo nij granis duobus uel tribus, ueteribus hodie datur eius drach. sem.

Non datur nisi elota, neq; in passionibus epatis, neq; in sanguinis fluxu, hæmorrhoidarum uel menstruorum.

De Scammonea.

Dantur eius grana tria usq; ad 3. sem. non correcta mirum in modum obest.

De fumo terræ.

Datur in aqua eius destillata, succo atq; decocto.

Succi eius dosis 3. ij.

Aequiparatur succo foliorum, uel florum persicorum.

Confirmatur eius operatio, cum aqua lactis, decoctio passularum, et aqua absinthij.

De Rhabarbaro.

Datur pondere drach. 7. & se.

Correctiua eius squinantum & spica.

E 3 Po

ARTIFICIVM SOL

Postulat autem drach. .i. rhabarbari, spica seu squinanti ꝑ. se.

Siquando in aqua datur, addi debet ꝑ. i.

Et torrefacto nihil presentius in fluxu Cholerico & dysenterico datur torrefactum à drach. .i. & sem. usq; ad drach. .ij. Neq; tunc opus habet spica uel squinanto correctiuus.

De aqua casei.

Aqua casei magis respicit humores aduersos.

Datur pura, pondere ꝑ. v.

De Tamarindis.

Tam in puluere, q̄ pilulis dantur Tamarindi, hodie frequenter infundūt hoc modo.

Contusi in aquam Endiuiaē uel menthae pro ratione infirmitatis, id q̄ duabus horis, inde exprimuntur & percolantur.

Pondus eorum drach. .i.

Nauseam mouent, unde stomachicis aquis infunduntur.

De Psilio.

Datur ut fumus, uidelicet aqua, decoctum puluis & succus.

De Turbith.

Tura

Turbith non detur nisi cum z . uideli-
 ter ut z . quantitas sit subdupla , uerbi gra-
 tia: Recipe Turbith z .ij. z .ij.

Ledit cor, idcirco præmiscetur illi me-
 dicinæ cordiales.

Conturbat etiam uentrem, quare cum
 pannis calidis post euacuationem ueter
 est calefaciendus.

Dantur & enemata uel suppositoria .

De Agarico.

Agaricus non debet ministrari nisi cor-
 rectus, Corrigitur autem cum oxymelle,
 sale gemmato, & z .

In liquido si dandus sit, corrigatur cū
 oxymelle, in puluere & pilulis cum sale
 gemmato & z .

Et quia nausēā mouet, adduntur quo-
 que illi stomachica, ueluti coriandrum,
 aut panis infusus in aceto, uel uino grana-
 torum, quibus post sumptionem erit utē-
 dum.

Sunt qui adijciant cinnamomum, ga-
 riophyllos, calamum aromaticum, &
 masticem.

Dosis eius est à drach. .i. usq; ad drac. ij.
 boni ponderis.

Correctiua dantur subscripta, & sic:

E 4 Reci

A R T I F I T I V M S O L

Recipe Agarici præparati drach. i. fa-
lis gemmæ ꝑ. i. Misce, fiant pilulæ uel pul-
uis.

Non præparatur cum oxymelle, nisi
frustatim incisus, & humectatus saltem
quatuor horis.

De Colocynthide.

Colocynthis, quia non solum stoma-
chum offendit, & reliqua intestina, da-
tur cum utrisq; medicinis, cordis scilicet
& stomachi.

Raro tamen ea est utendum, datur in
apoplexia, paralyfi, & reliquis, ut in re-
motis existit infirmitas, datur & in coli-
ca.

Dosis eius est drac. i. & drac. i. & sem.

In clystere usq; ad drac. iij.

Miscetur & glandibus.

De Cucumere Asinino.

Datur in pilulis, succo & pulueribus,
maxime uero in hydrope.

Dosis eius in pilulis. ꝑ. i.

Succi eius trahendi per cineres dra. se.
Aquæ eius drach. i.

Purgat caput & loca remotiora.

Succus eius tractus atq; sorbtus nari-
bus, purgat catarrhos, sed miscēda aqua

Endis

Endiuia uel acetosa, & os aqua frigida replendum, & toto eo tempore quò in naribus tenetur succus, ne ad inferna penetrer.

Forma componendi ex eo pilulas.
 Recipe succi cucumeris asinini drach. mastice drach. se. fiant pilulae cum syro de mentha, & exhibeantur patienti duae uel tres, ad summum.

De Mirabolanis Kebulis
 & belliricis.

Mirabolani quia amari sunt, nunquam dari debent sine sacharo & passulis, ita quò quantitas sachari sit subdupla ad Mirabolanos.

Dosis eorum infusorum est usque ad dr. iij. & se.

De sale gemmato.

Seorsim nunquam datur, miscetur autem alijs medicamentis phlegma euacuantibus

Dosis eius in mixtura ʒi. in clysteri usque ad drach. ij.

Raro datur praeterquam in glandibus conficiendis, quibus commode miscetur, praesertim in cholica.

Sed non diu retineatur, quia excoriati-

ARTIFITIVM SOL.

onem inducit.

De Euphorbio & Eupatorio.

Raro est Euphorbij usus, præterq̃ in
medicamentis capitalibus, unde sternu-
tamentis miscetur.

Datur in Apoplexia, & capitis repleti-
onibus.

De Hermodactylis.

Hermodactylorum exhibentur, pul-
nis, succus, & pilulæ.

Emendant hermodactylos, & men-
tha.

Lædunt stomachum, inducunt uento-
sitate, & tardius mouent.

Dosis earum in pilulis est drach. .i. pul-
ueris ℥.ij.

Datur autem mane.

DE SOLVENTIBVS

melancholiam.

De lapide Lazuli.

TAm in puluere, q̃ in pilulis datur.

Emendatur in cordialibus, buglos-
sa, borragine, osse de corde cerui, cortici-
bus citri & huiusmodi.

Dosis eius in puluere à drach. .i. usq̃ ad
drach. .i. & ℥. .i. In pilulis drach. .i.

De lapide armeno.

Da

V E N D I V E N T R E M. 222

Datur cum uino aut aqua dulci, lotus.

Dosis non loti drach. i. Loti drac. ij.

Emendatur cum medicinis cordialibus.

De Epithymo.

Datur in ægri tudinibus capitis, hepatis, splenis apoplexia, & huiusmodi.

Rectificatur cum uno grano piperis, & salis gemmati.

Datur in mane.

Dosis pulueris drac. iij.

Decocti drac. iij.

Pilularum dra. i.

De folijs Sene.

Conferunt cerebro & cordi, melancoliamq; & tristitiam excutunt.

Datur cum brodio gallinarum aut carni.

Item cum uino bono, aut sale gemmato.

Dosis eius usq; ad drach. vi.

De Chamedri.

Chamædrys præparatur, ut fumus teretæ.

B A R T H O L N M E I M O N

tagnaniæ Regulæ, de pharma

corum administratione.

Regus

Prima Regula.

Semper minor esse debet dosis medicinae ingredientis compositione, quae est eleuata in gradu, quam medicinae, quae non est sic eleuata in gradu, ut si spica nardi chamomillae adiungatur, minor debet esse dosis spicae nardi quam chamomillae, quae est calida & sicca in primo, & in prima mansione.

Secunda Regula.

Maiores debet esse dosis medicinae habentis respectum ad longinquas partes, quam habentes respectum ad propinquas, ut agaricus habet educere phlegma à toto corpore, maior tamen est eius respectus ad stomachum. Et hermodactyli maiorem habet respectum ad iuncturas, quare in comparatione eorum cum agarico, maior debet esse dosis hermodactylorum, quam agarici, ad educendum phlegma ex utrisque.

Tertia Regula.

Minor debet esse dosis Scammoneae quam Rhabarbari, & tanto minor dosis, quanto excedit in gradu.

Quarta Regula.

Medicinarum ingredientium compositionem multorum iuuamentorum, & ue

in locis operationis, minor debet esse dos, quæ medicina multorum iuuamentorum & tardæ operationis.

Quinta Regula.

Dosis medicinae habentis plura iuuamenta, debet esse maior quæ habentis solū unum iuuamentum. Ratio est, quia raro est quin medicina aliqua includunt nocumenta, sed illa nocumenta corriguntur, per pluralitatem iuuamentorum. Sicut in Theriaca, caro tyri ponitur in pauca dosi, qui est uenenum, & habet petere cor, tamen quia rarefacta per alias medicinas ingredientibus, quæ sunt multorum iuuamentorum, antequam suam perficiat operationem, alia medicina præcesserunt & fecerunt potentiores operationem.

Sexta Regula.

Dosis medicinae raræ debet esse amplior, quæ dosi medicinae substantiæ densæ.

Septima Regula.

Dosis medicinarum egredientium, habentium unum iuuamentum tantum uel plura, per se illa operantia, debet esse maior, quæ medicinarum non operantium solum per se, sed cum alijs. Vnde illæ medicinae solum operantur per se, quæ non in
dis

ARTIFICIUM SOLA

digent consolatione, non per se, quæ ægent consolatione.

Octaua Regula.

Medicinarum ingredientium compositionem ratione suorum iuuamentorū, quæ per se producunt, & cum hoc consolidandi alias medicinas, maior debet esse dosis, quàm medicinarum ingredientium, ratione unius tantum. Vnde absinthij dosis drach. i. sumitur, si ramentum sumatur cum alio, ratione iuuamenti sui, & consolationis debet esse drach. ij.

Nona regula.

Medicinarum ingredientium compositionem ratione consolidandi, dosis debet esse maior quàm medicinarum quæ consolantur.

Decima Regula.

Medicinarum ingredientium compositionem ratione consolandi, dosis aliquando debet esse maior, & aliquando debet esse minor.

Vndecima Regula.

Aliquando ponimus in una basi duas medicinas contrarias, appropriatas diuersis membris, quia natura postea diuidet unicuique suum conueniens, quia unicuique

cuiq; membro naturale est, suum discon-
ueniens remouere. Et iuuat ad hoc attra-
ctiua, & aspectus membri.

Duodecima Regula.

Præter basim uel bases, aliquando mi-
scemus cum basi eius operationes iuan-
tes, quæ sunt similis operationis, ut in Te-
riaca miscemus Tyros, & terram sigilla-
tam, quæ ualent contra uenenum, sicut
caro Tyri.

Decimatertia Regula.

Quandoq; etiam iuuatur basis per ali-
am medicinam, quæ sibi præparat medi-
cinam, ut obediat ei, & sic cum Turbich
miscemus 33. Aliquando miscemus repli-
mentia, ut in Thyriaca miscemus bezoar
super uenositate carnis Tyri.

Quia aloes sua mora est excoariatium,
miscemus bdellium & anisum, quia no-
cet stomacho, miscemus sandalos & ma-
sticem.

De gradibus pharmacorum.

Regula decimaquarta.

Solutiuorum sunt quatuor gradus, in
primo gradu censentur, aqua lactis, syru-
pus uiolarum, mel rosatum colatum. In
secundo ordine, Tamarindi, cassia fistu-
la,

A R T I F I T I V M S O L

la, manna & similia. In tertio ordine, polypodium, rhabarbarum, & similia. In quarto ordine, Scammonea, rhabarbarum serapinum, & colocintidis, & similia.

Dosis quid.

Dosis est quantitas determinata, uel pars aliqua pharmaci simplicis uel compositi, quæ de se est apta nata facere operationem sufficientem, non diminutam & non superfluam.

Decima quinta.

Per rationem dosim sic possumus investigare. Quodlibet pharmacum cuius dosim querimus, aut est in primo gradu uirtutis, uerbi gratia, in solutiuis ponimus, quia in his magis querimus dosim, ut serum lactis, syrupum uiolatum, & tunc dosis horum incipit ab ʒ. i. & tendit ad v uel ℥. x , secundum gradum quem obtinet inter solutiua, primi gradus inferior, aut mediã minor & maior, potest enim ad quartum uel sextum & octauum, & etiam esse in medio.

Aut tale pharmacum est in secundo gradu solutiuorum, & huius dosis incipit à ʒ. ss. & uadit usq; ad ʒ. ij & mediã, medio modo.

Si

Si uero ponitur in tertio gradu, dosis minor eorum incipit ab drach. .i. & tendit usq; ad drach. .iij. uel. .iiij.

Si uero ponitur in quarto gradu, dosis minor incipit à granis duobus, & tendit usq; ad \mathfrak{D} . uel drach. .i.

Decimasexta Regula.

Quam cuiq; medicinæ dosim inscribas, perpendere oportet ex ætate, loco, tempore, & circumstantijs eius, cui daturus es pharmacum considerare, & secundum rationem demere uel addere dosibus ab autoribus præscriptis, alioqui facile pro antidoto uenenum propinaueris. Nota, q̄ hic canon seruit ad titulum de dosibus medicinarum compositarū, quem supra posuimus.

Decima octaua Regula.

Eadem est proportio pharmacorum in toto composito, & in qualibet parte. Et quia in toto composito est pars illa scāmoneæ, & in qualibet parte est illa pars eius. Accipiat ergo dosis huius pharmaci, scilicet dra. .ij. & uideamus, an sit conueniēs dosis in his drach. .ij. Octaua pars est Scāmoneæ, & dimidia dosis est \mathfrak{D} . quia octaua pars est quarta drac. .i. Scā-

ARTIFICIVM SOL

monæ, quæ est ḡ. xv. quæ est maior do-
sis Scammoneæ, quia hic est composita
Scammonea cum alijs pharmacis soluti-
uis, & quia sic est, oportet q̄ ponatur do-
sis minima, quia ibi solutiua uniuert
uicem operationem Scammoneæ, ideo
dosis hic prædicta est nimis magna, &
ideo non est dáda. Nam si esset aliquod
solutiuum, cum septem ḡ. Scammoneæ,
adhuc per se esse maxima dosis, propter
quod non damus illius pharmaci dra. ij.
quia in dra. i. illius pharmaci erant ḡ. vij.
Scammoneæ, & illa est sufficiens dosis
quoniam est composita cum alijs soluti-
uis, & maxime quando non est ibi soluti-
onem prohibens.

EIVSDEM BARTHOLO

mei canones alij, in compositi-
one medicaminum ob-

Primus Canon.

Medicinarum temperatarum, nõ est
determinata dosis. Ex quo quanto
plus de illis exhibetur, tanto maior sequi-
tur confortatio.

Secundus Canon.

Omni hora licet medico medicinam
exhibere temperatam, tam ab intra quã
ab extra.

Tertius

Tertius Canon.

Nulla frigiditas sensibiliter lædens ali-
quod membrum corporis humani, po-
test simpliciter expelli per aliquam medi-
cinam simplicem, calidã in primo, neq;
per medicinam ex his compositam.

Quartus Canon.

Mala complexio frigida sic est expellẽ-
da, ut à minimis incipiens, semper ad for-
tiora conscendas.

Quintus Canon.

Nihil melius est, q̄ ex paucissimis sim-
plicibus medicinas componere, alioqui
in pluralitate, uirtus unius remittit uirtu-
tem alterius.

Sextus canon.

Plurimum expedit medicinas etiã lo-
caliter adplicare, scilicet per sacculos, epi-
thimata, & embrocationes.

Septimus Canon.

Ad remouendum uentositatem, & res-
soluendum, nihil melius est, q̄ ante om-
nia medicinas adplicare in primo gradu
calidas.

Ostauus Canon.

Duobus simplicibus concurrentibus
ad unam compositionem, quorum unũ

ARTIFICIUM SOLI

intensa, alterum debilioris qualitatis sit, in maiori quantitate datur, quod fuerit debilius, ut si camomilla concurrat cum Euphorbio, minus Euphorbij scribitur, Camomillæ plus.

Nonus Canon.

Medicinarum quæ sunt uelocissimæ operationis, ut sunt frigida & calida in quarto gradu, eorū semper minima quantitas ponatur.

Decimus Canon.

In medicinis opiatis, non correctis, nō datur ultra ℥i.

Vndecimus Canon.

Ante omnia incipiendum existimo à medicina simplici, quod si non succedat, tum primum ad composita ueniendum est.

DE COMPOSITIONE

Sacculorum.

Sacculi diuersis partibus corporis adplicantur, in primis tamen capiti, cordi, stomacho, & epati, sed diuersa est eorum compositio.

Capitales sacculi componuntur ex medicinis cerebrum confortantibus, ut ex Sticade maiorana, & reliquis, de quibus

de infra nostras tabulas.

Sic cordiales ex medicinis respicientibus cor, & his quidem temperatis, Cordiales autem medicinas uide infra in tabulis,

Nota etiam quod sacculi capitales & cordiales fiunt frequentius ex pulueribus & medicinis puluerizatis, alij uero ex herbis paulatim contusis, aut ex seminibus, folijs aut succis.

Aduerte etiam ut gradus ipsos obserues, uidelicet ut semper medicinis in primo gradu, calidis succedant medicine in secundo gradu calidæ, & sic deinceps.

De Sacculorum figura.

Sacculi capitales formentur oblongi, longitudine sex digitorum ad modum quadranguli, cuius duo latera æquentur, reliqua contrahantur, in latitudine quoque non ultra quatuor digitos habeant.

Stomchales, & ita cerata stomachalia, fiant triangulares, ita ut acumen tangat os stomachi, pars hebetior inferna.

Cordiales formentur quadrati, octo digitorum longitudine, latitudine duorum.

Oblongi formentur qui epati debent imponi.

ARTIFICIUM SOLA
DE IUVAMENTIS
oleorum.

Olea mitigatiua.

Rosarum, Camomillæ, anethinum
liliorum, papaueris, Meliloti, keiri,
violarum, lactucæ.

Confortatiua neruorum.

Oleum de semine lini.

Rosarum.	Chamomillæ.
De lumbricis terræ.	De Citonijs.
Irinum.	Costinum.
De Keiri.	De Enula.
Myrtinum.	De Storace.
Nardinum.	

Olea pectoralia.

Oleum de Carthamo.

Amygdalarum dulcium.

Violarum.	Irinum.
Anethinum.	Liliorum.
Nenupharis.	

Stomachica olea.

Nardinum.	Spicæ nardi.
De Citonijs.	Myrtinum.
Costinum.	De absinthio.
Rosaceum.	De mentha.
Sesaminum.	

Epatica.

Amyg

Amygdalarum dulcium.

Despica. De mastice.

Irinum. Rosaceum.

Confortatiua splenis.

Nardinum. Laurinum.

Euphorbij. De Cappari.

Desifticis.

Confortatiua renum.

Delilio. Rutæ.

Amygdalarum amararum.

Iuulæ. Vulpinum.

Scorpionum. Sesaminum.

Ad podagram.

De Iusquimao. Costinum.

Amygdalarum amararum.

Delilio. De auellanis.

D E O R D I N A T I O N E

Clysteriorum.

Clystera quædam ex decoctione herbarum conficiunt, ut bleta mercuriali, malua, uiolis, & huiusmodi. Quædam etiam medicinis ad propositum seruiensibus.

Quædam ex simplicibus solutiuis, ut Turbith, sale gemmato, & colocynthide.

Dosis primi est dr. ij. secundi, drach. v. tertij, drac. ij.

F 4 Com

A R T I F I T I V M S O L

Composita quæ ingrediuntur, sunt electuarium diaphniconis, Iera picra, Ieralogodion, electuarium de baccis lauri, Benedicta laxatiua, Lithontribon, Cassia fistula, Electuarium Diasenæ.

Electuarij diaphniconis ꝑ .i.

Ieræ pieræ usq; ad dr. sex.

Ieralogodij usq; ad ꝑ .se.

Electuarij de baccis lauri usq; ad drach. v.

Dosis. Benedictæ usq; ad ꝑ .i. & sem.

Lithontribi usq; ad drach. vi.

Cassiæ fistulæ usq; ad ꝑ .i. & se.

Electuarij Diasene usq; ad un. ij.

Clysteria nutritiua fiunt ex iure caponis & gallinarum, & reliquorum optime nutrientium.

Debent etiam semper præcedere clysteria pharmaca soluentia, uel loco clysteris glans.

De clysteribus uide alibi plura.

S I M P L I C I A C L Y S T E R I O R U M .

Calida.

Camomilla.

Parietaria.

Melilotum.

Frigida.

Malua.

Althæa.

Mercurialis.

Men

Mentha.	Bleta.
Anethum.	Violatia.
Organum	Fragaria.
Ruta.	Lactuca.
Mater uiolearum.	
Calamentum.	Spinachia.
Centaurea.	Nenuphar.
Branca ursina.	Portulaca.
Abrotanum.	Plantago.

Semina.

Lini.	Marathri.
Fœnogræci.	Sifeleos.
Cimini.	Vriticæ.
Petroselini.	Anisi.
Apij.	Dauci.
Carui.	Cattami.
Cardamomi.	

Radices.

Fœniculi.	Polypodij.
Petroselini.	Afari.
Apij.	Asparagi.
Brusci.	

Solutiua.

Centaurea.	Diacatholicon.
Medulla Cattami.	Ieralogodion.
Iera simplex & picra.	
Electuarium de baccis lauri.	

A R T I F I T I V M S O L

Benedicta.	Sal gemmatum
Sal commune.	Sal armoniacu.
Colocynthis.	Trochisci alhan.
Diaphnicon.	Cassia.
	Abstersiuu.
Mel rosaceum.	Vitella ouorum
Parietaria.	Semen Carrami

Notio.

Nulli clysteri abstersiuo indi debet oleum, quoniam prohibet abstersionem.

FORMVLAE ALIQVOT
clysteriorum ordinandorum.

Clyster conferens delicatis, & cholice, educens phlegma & melancholiam.

Recipe anisi triti, polypodij añ. dr. ij. bulliant in sero caprino lib. se. quibus percoctis, cola, & colaturæ adde ueræ pieræ ʒ. i. mellis drac. ij. salis communis drac. i. olei uiol. ʒ. ij.

Clyster abstersiuus.

Recipe aquæ ordeï lib. i. uitella ouorū numero ij. sachari rubei ʒ. ij. salis drac. ij.

Quando materia est licca. Recipe solius olei uiolarum, & potest exhiberi prægnantibus.

In Causone clyster alteratiuus. Recipe

pe

pe aquæ hordei lib. .i. olei uiolarum ꝑ. ij.
 Cassiæ drachm. .x. sacchari rubei ꝑ. ij. salis
 drac. ij.

In Cholica.

Recipe lactis uaccini lib. .i.
 Cassiæ un. .i. & fiat clyster.

R E G V L A E O B S E R V A N
 dæ in dandis clysteribus.

1 Prima. Clysteria tantum auxiliantur
 intestinis.

2 Maiorem in modum conferunt in co
 lica, & passionibus intestinorum.

3 Dantur & in passionibus renum, cor
 dis & epatis.

4 In colica, non dentur enemata acuta,
 & uehementia, nisi post materiæ digesti
 onem, quia cor & epar debilitarent.

5 Non dentur clysteria, nisi facta prius
 in stomacho concoctione.

6 Clysteria ne nimis frequentato, quo
 niam uires debilitant.

7 In passionibus renum æger iaceat su
 pinus, & pedibus eleuatis, sic enim fiet,
 ut fortius ad se attrahant renes.

8 Non frequententur clysteria in tem
 pore calido, neq; à sumpto cibo.

9 Clysteriorum operationé, balnea pro
 mouent.

De

ARTIFICIUM SOL
DE DIFFERENTIA CLY
sterium.

Clysteres quidam dantur ad mollifi-
candum, in uehementi mentis con-
stipatione.

Hi maxime parantur ex malua, bis mala-
na, mercuriali, uiolacea, quibus additur
parum furfuris & salis. Item oleum uiola-
tum, butyrum recens.

Clyster mordicans.

Fit ex absinthio, abrotano, calamento,
origano, quibus in decoctione additur
parum mellis, & si uelis purgare phleg-
ma, parum polypodij.

Clyster mundificans, ad dys-
enteriam.

Fit ex rebus mundificantibus, ex lenti-
bus, ordeo mundato, fabis, & decoctio-
ni adde mel.

VARIORVM CLISTE-
rium typi.

Recipe malue matrum molarum añ.
m. i. fiat decoctio, de qua accipe unc.
xij. uel xij. cassiæ fistulæ extractæ, noui-
mellis pul. zuc añ. dra. vi. olei com. un. iij
salis communis dra. ij. misce et fiat clyste-
re

re, uel loco decoctionis dicti ponat bro-
dium pulli uel carniū., dosis dicta etiā
erit conueniens.

Clystere lenitiuum & alteratiuum,
conueniens in febribus magnæ
inflammationis.

Recipe matrum uiolarum maluę añ.
℞.i. mercurialis spinachia nenufaris añ.
terciam partem ℞.i. lactuę uel portula-
cæ uel uirgæ pastoris uel semperuiuę añ.
quartam partem ℞.i. fiat decoctio cū lib-
.ii. aquę, usq; ad consumptionem tercię
partis, de qua colatura accipe ꝑ. xij. uel 16
olei uiol. ꝑ. iij. salis triti dra. ij. misce.

Clystere lenitiuum & abstersiuum,
conueniens in feb. colericis &
Phlegmaticis.

Recipe blitis maluę mercurialis añ. .i.
ord. matrum uiol. ana terciam partem ℞
.i. fiat decoctio in lib. xij. aquę usq; ad con-
sumptionem tercię partis, & in fine de-
coctionis addatur caulium ℞.i. et iterum
buliant per unicam bulitionem, deinde
recipe dictę decoctionis ꝑ. 12 uel 16. cass.
mel. zuc. ru. añ dra. vi uel unciam unam
mel. uiol. ꝑ. i. olei communis ꝑ. iij. salis tri-
ti dra. ij. misce & fiat clystere.

Cly

ARTIFICIUM SOL

Clystere conueniens paraliticis.

Recipe iuluar, rutæ, sticados, maluar, mercurialis, centaureæ, surfur. camomilla añ. iij. partem D . i. Fiat decoctio in aqua sufficienti usq; ad consumptione iij. partis. de qua post colaturam accipe z xij. uel xvi. hierepigræ uel benedictæ simplicis uel hierologodion z semis, cassiæ z . i. mellis rosati colati z . se uel dra. vi. olei communis uel camomillæ z . iij. salis communis triti drach. ij. potest enim addi ad prædictam decoctionem sem an. & foeni. & cimi. & tunc erit fortius.

Clystere carminatiuum uentositatis.

Recipe semen ani foeniculi, aneti, carui, cimini, florum camomillæ, mellil. añ. z . se. florum rutæ D . se. surfur. D . i. fiat decoctio usq; ad consumptionem tertie partis uel medietatis, de qua colatura accipe z . xij. uel xvi. mellis rosati colati medullæ cassiæ, hierepigræ uel benedictæ añ. z se. olei, rutæ, uel aneti uel camomil. z . iij. salis triti drach. ij. misce, & calidum imponatur, possunt etiam addi ista, & fiet fortius, scilicet, bacca lauri, ameos, centaureæ minoris, cartami, polipodij, semen li

ni, fœnigræci, origani, calamenti.

Clystere lauatiuum & abstersi-
uum conueniens in fluxi-
bus.

Recipe aquæ decoctionis ordeï unciâs
xij. uel xvi. pulueris, zuccari, mellis rosati
colati añ. un. se. uitelli ouorum recētium
numero ij. olei uiol. unc. ij. misce omnia
bene incorporando, & fiat clystere.

Clystere constrictiuum, & est conso-
lidatiuum, conueniens in fluxibus.

Recipe plantag un. se. rorismar. siccar.
galla. mirtillo. sumach. an. un. se. fiat de-
coctio in sufficienti quantitate aquæ plu-
uialis, uel aquæ extinctionis calybis usq̃
ad consumptionem tertiæ partis, de qua
colatura accipe unci. xij. uel xvi. & in ea
dissolue sepi herini un. i. suc. plant unc. ij.
& addantur infra scripti pul. Recipe gu-
mi arab. terræ sig. boli armeni añ. drac. i.
puluerizentur & addantur.

Clystere confortatiuum abstersiuum
& incitatiuum appetitus.

Recipe uini al. odor. unc. s. urine pueri
un. .4. uel 6. mellis colati & despum. un. ij
sal. com. triti dra. ij. olei com. un. ij. misce
& fiat clystere.

F I N I S.



