Die Rinderpest.

Im Auftrage

des Herzogl. Anhalt. Staats-Ministeriums

verfaßt

von

Dr. F. Roloff,

Professor in Halle.

'S RIJKS VEEARTSENIJSCHOOL

Halle,

Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.

1871.

C

613

BIBLIOTHEEK UNIVERSITEIT UTRECHT
2855 617 7

31.86

Cm. 613.

Die Rinderpest.

Im Auftrage

des Herzogl. Anhalt. Staats-Ministeriums

verfaßt

von

Dr. F. Roloff,
Professor in Halle.



Halle,
Verlag der Buchhandlung des Waisenhauses.
1871.

Die Rinderpest (Viehseuche, Löserdürre) ist eine bei den Wiederkäuern, vorzugsweise bei dem Rindvieh vorkommende ansteckende, fieberhafte Krankheit, welche sich hauptsächlich durch eine eigenthümliche entzündliche Erkrankung sämmtlicher Schleimhäute, an welcher zuweilen auch die äußere Haut Theil nimmt, äußert.

Die Seuche ist seit langer Zeit bekannt; schon im vierten Jahrhundert wurde sie, wahrscheinlich durch die Völkerwanderung, aus dem Osten nach dem Westen unseres Festlandes verschleppt. Sehr häufig drang sie im 18. Jahrhundert von Osten her bis nach Deutschland vor und herrschte dann hier nicht selten mehrere Jahre hintereinander. Es sollen in dem vorigen Jahrhundert allein in Deutschland durch die Rinderpest 28 Millionen Stück Rindvieh vernichtet sein. Auch im Anfange dieses Jahrhunderts wurde während der Kriegsjahre Deutschland von der Seuche, die mit dem Schlachtvieh aus den russischen Steppenländern eingeführt war, überzogen. Mit dem aus den russischen oder österreichischen Staaten importirten Vieh ist auch bald nach Beginn des gegenwärtigen Krieges die Pest in Deutschland eingeführt. Es ist zu befürchten, daß diese sehr gefährliche Krankheit, welche im Laufe des vergangenen Herbstes eine beträchtliche Verbreitung in Norddeutschland gewonnen hatte, sobald nicht wieder vollständig getilgt werden wird, weil bei dem jetzigen lebhaften und schnellen Verkehre von den einzelnen Seucheherden aus häufig schon wieder eine Verschleppung nach entfernten Orten stattgefunden hat, bevor die nöthigen polizeilichen Maaßregeln gegen die Weiterverbreitung haben Platz greifen können. Dazu kommt noch der Uebelstand, daß die Pest gegenwärtig in Rußland nicht mehr auf die Steppenländer beschränkt ist, sondern auch in den an Deutschland angrenzenden Gebieten, sowie in den Donaufürstenthümern Wurzel gefaßt hat und wiederholt in

Die Rinderpest (Viehseuche, Löserdürre) ist eine bei den Wiederkäuern, vorzugsweise bei dem Rindvieh vorkommende ansteckende, fieberhafte Krankheit, welche sich hauptsächlich durch eine eigenthümliche entzündliche Erkrankung sämmtlicher Schleimhäute, an welcher zuweilen auch die äußere Haut Theil nimmt, äußert.

Die Seuche ist seit langer Zeit bekannt; schon im vierten Jahrhundert wurde sie, wahrscheinlich durch die Völkerwanderung, aus dem Osten nach dem Westen unseres Festlandes verschleppt. Sehr häufig drang sie im 18. Jahrhundert von Osten her bis nach Deutschland vor und herrschte dann hier nicht selten mehrere Jahre hintereinander. Es sollen in dem vorigen Jahrhundert allein in Deutschland durch die Rinderpest 28 Millionen Stück Rindvieh vernichtet sein. Auch im Anfange dieses Jahrhunderts wurde während der Kriegsjahre Deutschland von der Seuche, die mit dem Schlachtvieh aus den russischen Steppenländern eingeführt war, überzogen. Mit dem aus den russischen oder österreichischen Staaten importirten Vieh ist auch bald nach Beginn des gegenwärtigen Krieges die Pest in Deutschland eingeführt. Es ist zu befürchten, daß diese sehr gefährliche Krankheit, welche im Laufe des vergangenen Herbstes eine beträchtliche Verbreitung in Norddeutschland gewonnen hatte, sobald nicht wieder vollständig getilgt werden wird, weil bei dem jetzigen lebhaften und schnellen Verkehre von den einzelnen Seucheherden aus häufig schon wieder eine Verschleppung nach entfernten Orten stattgefunden hat, bevor die nöthigen polizeilichen Maaßregeln gegen die Weiterverbreitung haben Platz greifen können. Dazu kommt noch der Uebelstand, daß die Pest gegenwärtig in Rußland nicht mehr auf die Steppenländer beschränkt ist, sondern auch in den an Deutschland angrenzenden Gebieten, sowie in den Donaufürstenthümern Wurzel gefaßt hat und wiederholt in

Deutschland eingeschleppt werden kann, so lange die Einfuhr von Vieh aus den russischen und wo möglich auch aus den österreichischen Staaten nicht ein für alle Mal verboten ist. Um diese Gefahr, daß die Seuche hier wiederholt eine größere Verbreitung gewinnt oder wol gar sich einnistet, zu beseitigen, ist es vor Allem erforderlich, daß die Viehbesitzer die Verbreitungswege der Krankheit und die Erscheinungen derselben kennen lernen, um bei der Tilgung von vornherein gehörig mitwirken zu können.

Ursachen der Rinderpest.

Es ist erwiesen, daß die Rinderpest in Deutschland nur aus Ansteckung hervorgeht und niemals in Folge von irgend welchen anderen Schädlichkeiten entsteht. Wenn die Krankheit oder der Ansteckungsstoff nicht aus einem anderen Lande in Deutschland eingeführt wird, so entsteht dieselbe hier nicht. Durch die Verschleppung des Ansteckungsstoffes findet auch die weitere Verbreitung der Krankheit im Lande statt. Der Ansteckungsstoff (das Contagium) selbst ist seiner Natur nach noch nicht erkannt; weder die microscopischen Untersuchungen auf die etwaige Anwesenheit eines der Krankheit eigenthümlichen kleinen Organismus (eines Pilzes oder ähnlichen Wesens) in den kranken Geweben oder im Blute, noch die chemischen Untersuchungen auf das Vorhandensein eines besonderen chemischen Stoffes in dem kranken Körper haben bis jetzt ein genügendes Resultat ergeben.

Dahingegen ist es bekannt, daß in jedem Falle während der Krankheit von dem Beginne derselben an ein Ansteckungsstoff gebildet wird und daß derselbe in allen Theilen des kranken Thieres enthalten ist. Vorzugsweise ist der Ansteckungsstoff enthalten in den Absonderungsproducten der erkrankten Schleimhäute, in dem Maulschleime, den Thränen, dem Darmschleime und dem Schleime aus den Harn- und Geschlechtsorganen, also auch in dem Kothe und im Harne. Außerdem haftet der Ansteckungsstoff, da er ein flüchtiger ist, aber auch an der ausgeathmeten Luft, an der Hautausdünstung und an dem Dunste des aus der Ader gelassenen oder beim Schlachten kranker Thiere ausfließenden Blutes. Auch von

den Cadavern, dem Fleische, der Haut und den Excrementen pestkranker Thiere kann der Ansteckungsstoff sich noch verflüchtigen und der umgebenden Luft mittheilen. Die Erfahrung hat gelehrt, daß gesunde Wiederkäuer, namentlich Rinder, angesteckt werden können, wenn sie in die Nähe von rinderpestkranken Thieren oder von den davon herrührenden Excrementen oder von Cadavern kommen, ohne daß eine unmittelbare Berührung stattfindet. Das verflüchtigte Contagium wirkt jedoch nur in einem Umkreise von ungefähr 20 — 30 Schritt von seiner Ursprungsstätte; in größerer Entfernung ist dasselbe in der Regel in der Luft in dem Grade fein vertheilt oder in anderer Weise durch die Einwirkung der Luft verändert, daß es nicht mehr haftet. Wenn jedoch eine Anhäufung von Contagium in einem geschlossenen Raume, wie in Ställen, stattfindet, oder wenn der Luftzug dasselbe von seiner Ursprungsstätte nach einer Richtung hin fortführt, so kann es auch in einer größeren Entfernung noch wirksam sein. Deshalb kann in großen Ställen die Krankheit von einem Thiere auf ein weit entfernt stehendes durch das flüchtige Contagium übertragen werden oder aus einem Stalle mit dem ausströmenden Dunste auf einen anderen, mehr als 30 Schritte entfernten Stall überspringen. Letzteres geschieht aber nur dann, wenn der Dunst aus dem verseuchten Stalle in gerader Richtung in einen anderen Stall übergeführt wird. Ueber die Dächer oder über breitere Straßen hinweg schreitet die Rinderpest nicht unmittelbar von Hof zu Hof fort. Einen so hohen Grad von Flüchtigkeit, als man früher glaubte, besitzt das Rinderpestcontagium nicht, was unter anderem daraus hervorgeht, daß es häufig gelingt, die Krankheit in geschlossenen Ortschaften auf ein Gehöft zu beschränken.

Viel häufiger als die directe oder unmittelbare Ansteckung durch das flüchtige Contagium ist die indirecte oder mittelbare Ansteckung die Ursache der Verbreitung der Krankheit von einem verseuchten Viehbestande auf andere, gesunde. Diese Verschleppung des Ansteckungsstoffes kann auf mannichfache Weise geschehen. Einmal dadurch, daß der von kranken Thieren oder von deren Excrementen oder von Theilen geschlachteter oder krepirter pestkranker Thiere u. s. w. verflüchtigte Ansteckungsstoff sich an fremde Gegen-

stände ansetzt und an einem entfernten Orte sich wieder verflüchtigt. Namentlich in recht poröse Gegenstände, in Kleidungsstücke der Menschen, in Heu, in Stroh u. s. w., kann in verseuchten Ställen, überhaupt in der Nähe von kranken Thieren viel Contagium eindringen, um an einem anderen Orte wieder auszuströmen. Auf diese Weise können namentlich Personen (Fleischer, Viehhändler und Curpfuscher) die Krankheit von Ort zu Ort und von Hof zu Hof verschleppen. In Stallungen und Eisenbahnwagen kann von kranken Thieren Contagium in die porösen Holzwände, besonders in die hölzernen Fußböden eindringen und später, wenn keine genügende Desinfection stattgefunden hat, sich wieder verflüchtigen und auf andere, in jene Räume gebrachte Thiere einwirken. Dann kann eine Verbreitung der Krankheit dadurch stattfinden, daß Theile von geschlachteten kranken Thieren oder von Cadavern, Fleisch, oder Blut, welches an Kleidungsstücken von Personen oder an andern Sachen haftet, in andere Ortschaften oder Gehöfte gelangen. Ferner dadurch, daß Excremente von kranken Thieren, die den Kleidungsstücken von Personen oder den Füßen von Pferden oder leblosen Gegenständen, Stöcken, Wagenrädern u. s. w., anhaften, verschleppt werden. Auf diese mittelbare Weise findet die Uebertragung der Krankheit von einem verseuchten Viehbestande auf andere, gesunde Bestände häufig statt. Es kommt recht häufig vor, daß, bevor die Rinderpest erkannt ist, ein krankes Thier geschlachtet und das Fleisch im Orte oder weiterhin vertheilt wird, und daß dann in den Gehöften, in welche Fleisch gelangte oder aus denen Personen oder Sachen mit dem geschlachteten Thiere in Berührung kamen, die Seuche ausbricht. Die Ansteckung des Rindviehes oder der Ziegen kommt hierbei meistens auf die Weise zu Stande, daß das Wasser, in welchem das Fleisch abgewaschen wurde, an einem Orte ausgegossen wird, an welchen das Vieh gelangen kann, oder daß die Personen, welche sich mit dem Fleische beschäftigten, in die Nähe des Viehes kommen. Die Excremente von kranken Thieren können die Verbreitung der Seuche leicht vermitteln, indem sie auf verseuchten Höfen, auf Viehmärkten, auf Weiden oder auf Wegen, über welche krankes Vieh transportirt oder Dünger aus verseuchten Höfen gefahren wurde, direct

an anderes, gesundes Vieh oder an das Schuhwerk von Personen und so in Viehställe oder an Orte, wo Vieh Zutritt hat, gelangen. In solchen Fällen ist es dann hinterher oft unmöglich nachzuweisen, auf welche Weise die Krankheit in einen Ort oder in ein Gehöft gelangt ist. Mit einer kleinen Quantität Blut oder Dünger an der Stiefelsohle oder am Stocke kann die Seuche erfahrungsmäßig weit verschleppt werden.

Eine weite Verbreitung kann die Pest in kurzer Zeit gewinnen, wenn Handelsvieh, welches damit behaftet oder doch schon angesteckt ist, noch weit herumgetrieben oder auf mehrere Orte vertheilt wird, oder wenn pestkrankes Vieh an solche Orte gelangt und diese mit seinen Abgängen verunreinigt, an welchen viele Personen und Thiere zusammenkommen, wie auf den Marktplätzen.

Die Lebenszähigkeit (Tenacität) des Ansteckungsstoffes ist nach den Verhältnissen, in welchen derselbe sich befindet, sehr verschieden. Das kräftigste und sicherste Zerstörungsmittel desselben ist die Luft. Das beweist die bereits erwähnte Thatsache, daß selbst der im Freien von kranken Thieren sich frisch verflüchtigende Ansteckungsstoff in einer Entfernung von 20 — 30 Schritten seine Wirksamkeit eingebüßt hat. Heu und Stroh, welches über Pestställen gelegen hatte, ist wiederholt ohne Nachtheil an Rinder verfüttert, wenn es vorher 24 Stunden durchlüftet war. Durch Wolle, welche mit Nasenschleim von pestkranken Rindern getränkt und dann vier bis sechs Tage gut durchgelüftet war, konnte bei Versuchen keine Ansteckung bei gesunden Rindern vermittelt werden. Auch Ställe und Weiden können durch die Einwirkung der Luft im Laufe weniger Wochen desinficirt werden. Ebenso wird aus Kleidungsstücken und aus anderen porösen Gegenständen, sowie aus den an andern Dingen anhaftenden Excrementen von kranken Thieren durch die Luft der Ansteckungsstoff herausbefördert und unwirksam gemacht. Je stärker der Luftzug ist, je kräftiger die Luft die Gegenstände, welche den Ansteckungsstoff enthalten, durchzieht, um so schneller und sicherer wird dieser entfernt. Wenn hingegen kein Luftzug stattfindet, oder wenn der Ansteckungsstoff im Innern von Cadavern oder von fremden Gegenständen vor der Zugluft geschützt ist und nicht herausgerissen werden kann, wie in Heu- oder

Stroh- oder Düngerhaufen, im Holzwerk, in den Wänden oder im Fußboden geschlossener Ställe, in eingepackten Kleidungsstücken oder in eingeschlossenen oder vergrabenen Theilen von geschlachteten oder krepirten Thieren, die an der Pest litten, dann kann der Ansteckungsstoff lange wirksam bleiben. Durch Heu, welches über Pestställen gelegen hat, kann erfahrungsmäßig noch nach 5 Monaten ein neuer Pestausbruch vermittelt werden, wenn es fest verpackt lag und nicht vor dem Verbrauch gut gelüftet ist. Haut und Fleisch von Cadavern, die 3 Monate lang in der Grube gelegen hatten, zeigten sich bei Impfversuchen noch wirksam. In einem nicht desinficirten Stalle erkrankte das 4 Monate nach der Entleerung von pestkranken Thieren hineingebrachte Vieh ebenfalls an der Rinderpest.

Wie der Luftzug wirken auch höhere Wärmegrade auf den Ansteckungsstoff zerstörend. Die hohe Temperatur der Luft im Sommer wirkt zwar nicht direct vernichtend wie die Siedhitze; sie desinficirt aber dadurch, daß sie die Austrocknung der den Ansteckungsstoff enthaltenden Substanzen und dabei die Verflüchtigung des Ansteckungsstoffes und dessen feine Vertheilung in der Luft befördert. Dies wird noch sicherer und schneller durch hohe trockene Wärme in geheizten Räumen bewirkt. Durch die Kälte, selbst durch starken Frost wird das Contagium nicht zerstört, im Gegentheil conservirt, indem dadurch die vollständige Austrocknung der das Contagium enthaltenden Substanzen, sowie auch die Fäulniß, überhaupt die Zerstörung der thierischen Theile verhindert wird. Gefrorener Dünger steckte nach dem Aufthauen im Frühjahre noch an. Die häufig beobachtete Abnahme in der Verbreitung der Seuche während des Winters ist darauf zurückzuführen, daß dann ein weniger lebhafter Verkehr stattfand. Andererseits kann gerade im Winter in den dicken Kleidungsstücken von Personen, sowie mit gefrorenen Excrementen von pestkranken Thieren in Eisenbahnwagen u. s. w. eine weite Verschleppung des Ansteckungsstoffes stattfinden, während dieser durch trockene Winde im Sommer im Freien oder in offenen Wagen leicht zerstört wird.

Die Empfänglichkeit für den Ansteckungsstoff ist bei dem Rindvieh am größten, weniger groß bei Ziegen, am geringsten bei

Schafen. Das Alter der Thiere, sowie das Geschlecht und die Constitution haben auf die Empfänglichkeit keinen Einfluß. Ebensowenig die hier beim Vieh vorkommenden Raceverschiedenheiten.

Der Ausbruch der Krankheit erfolgt meistens 5 — 6 Tage nach der stattgefundenen Ansteckung; zuweilen schon mit 4 Tagen, in manchen Fällen auch erst mit 7 — 9 Tagen. Nach einzelnen Beobachtungen kann dieser Zeitraum (Incubationsstadium) selbst 14 Tage bis 3 Wochen betragen. Eine so lange Incubationsdauer kommt jedoch nur ausnahmsweise vor.

Die Ausbreitung der Krankheit in einem Viehbestande ist Anfangs in der Regel eine allmähliche. Häufig wird durch eingeschlepptes Contagium zunächst nur ein Thier inficirt. Sobald dieses krank geworden ist und Ansteckungsstoff producirt, findet die Ansteckung eines oder einiger anderer, und zwar meist der im Stalle zunächst stehenden Thiere statt, bei denen dann wieder nach 5 — 6 Tagen oder etwas später die Krankheit zum Ausbruche kommt. Wenn so in zweiter Linie erst mehrere Erkrankungen entstanden sind und in Folge dessen mehr Contagium im Stalle gebildet wird, so werden die Ansteckungen immer häufiger, und es können dann in größeren Wirthschaften viele Thiere kurz hintereinander oder gleichzeitig angesteckt werden und später gleichzeitig erkranken. Namentlich durch die Wärter, die Melker u. s. w. kann das Contagium von einem kranken Thiere gleichzeitig auf viele andere übertragen werden.

Die Krankheits-Erscheinungen.

Die Rinderpest äußert sich zunächst durch Fiebererscheinungen. Schon 1 — $1^1/_2$ Tage bevor irgend eine andere Veränderung an dem angesteckten Thiere zu bemerken ist, findet sich eine Temperaturerhöhung um 1 — 2 ° C. im Mastdarme, dessen normale Temperatur bei Rindern 38,5 ° — 39,5 ° C. beträgt. (Die höhere normale Temperatur beim Jungvieh.) Dann zeigt sich beim Milchvieh zunächst eine Abnahme, zuweilen völliges Verschwinden der Milchabsonderung. Dabei erscheinen die Kühe im Uebrigen oft noch vollkommen gesund. Sehr bald macht

sich dann jedoch ein Mangel an Freßlust bemerklich. Durst ist dann noch vorhanden, ohne gerade gesteigert zu sein. Der Appetitmangel, welcher gewöhnlich schnell einen hohen Grad erreicht, sowie Aufhören des Wiederkäuens sind bei den Thieren, die keine Milch geben, die ersten auffallenden Symptome. Kurz darauf, öfters gleichzeitig mit der Verminderung der Freßlust, tritt ein wiederholtes Zittern der Haut und der Muskeln an einzelnen Körpertheilen, namentlich an den Hinterschenkeln, an der Schulter und am Gesicht hervor (ähnlich wie beim Milzbrande). Bei näherer Untersuchung findet sich dann eine ungleiche Vertheilung und ein Wechsel der Körperwärme, namentlich am Grunde der Hörner, gesträubtes Haar, besonders auf dem Rücken, sowie eine mehr oder weniger starke Beschleunigung und eine große Schwäche des Pulses. Die Zahl der Pulse ist sehr wechselnd (60 — 120) und bei manchen kranken Thieren ganz normal, während die Schwäche des Pulses, sodaß dieser oft kaum gefühlt werden kann, sich bei allen rinderpestkranken Thieren findet. Der Herzschlag ist meistens gar nicht, in anderen Fällen schwach fühlbar.

Bei vielen Kranken findet sich gleich Anfangs neben den genannten Symptomen ein auffälliges, oft wiederholtes Schütteln des Kopfes, als ob sie Jucken am Kopfe empfänden oder Fliegen verjagen wollten. Bei einzelnen kommt auch wohl eine vorübergehende Unruhe und Aufregung vor.

Ganz regelmäßig erleidet bald nach dem Beginn der Krankheit das Aussehen und die Haltung der Thiere eine in die Augen springende Veränderung. Die Kranken sind sehr traurig, theilnahmlos, unempfindlich (z. B. gegen Fliegen am Körper) und sehr hinfällig. Sie liegen viel oder stehen mit gesenktem Kopfe; die Ohren hängen schlaff herab, die Augen sind weit zurückgetreten und halb geschlossen.

Das Flotzmaul ist gewöhnlich vermehrt warm, aber meistens feucht.

Die Beschaffenheit des Kothes zeigt am ersten, oft noch am zweiten Tage der Krankheit in den meisten Fällen keine auffallende Veränderung. Mitunter ist er ganz normal, mitunter etwas härter

oder auch wohl etwas weicher, als er nach der Art der Fütterung sein sollte.

Sehr wichtige und characteristische Veränderungen zeigt gleich von Beginn der Krankheit an die Beschaffenheit der Schleimhäute, namentlich in der Scheide bei weiblichen Thieren und im Maule. Die Scheidenschleimhaut ist Anfangs, wenn bei den Thieren Appetitsverminderung und Abnahme der Milch hervortritt, fleckig oder strichweise geröthet. Am nächsten Tage finden sich auf den bräunlich-rothen Flecken oder Strichen kleine graue oder gelblich-weiße Punkte oder Tupfen, die bei guter Beleuchtung sich von dem rothen Grunde deutlich abheben und wie kleine Schleimflocken aussehen. Sie bestehen aus der gelockerten und krankhaft veränderten Oberhaut, die sich leicht abwischen läßt, wonach die betreffende Stelle hochroth erscheint. Im unteren Winkel der Schaam, neben der Clitoris, finden sich zuweilen kleine dunkelrothe Punkte (Ecchymosen) auf der Schleimhaut.

Auf der Maulschleimhaut ist von vornherein die Absonderung vermehrt, sodaß eine starkschaumige Flüssigkeit zwischen den Lippen hervortritt. Im Maule findet sich bei männlichen und bei weiblichen Thieren gleich im Anfange der Krankheit eine auffallende Röthung der Schleimhaut an dem Zahnfleische des Unterkiefers, zwischen den stacheligen Hervorragungen (Papillen) an der inneren Fläche der Backe, neben den sogenannten Hungerwärzchen unter der Zunge und weiter hinten am Gaumen und in der Rachenhöhle. Wenn die Krankheit ungefähr 24 Stunden bestanden hat, so zeigen sich auf der gerötheten Schleimhaut, namentlich am Zahnfleische, auch auf der inneren Fläche der Unterlippe, ganz ähnliche gelbweiße oder graue Flecke wie auf der Scheidenschleimhaut bei weiblichen Thieren. Die gelockerte Oberhaut wird durch die Bewegungen der Unterlippe oft bald abgelöst, sodaß sich dann neben den grauen kleine hochrothe Flecke, wie flache Geschwürchen erscheinend, vorfinden. Ebenso wird von einzelnen Papillen an den Backen die Oberhaut ganz oder theilweise bald abgestoßen. Solche

von der Oberhaut entblößte Papillen erscheinen dann als kleine hochrothe Zäpfchen zwischen den hornigen Stacheln, oder sie haben eine rothe Spitze, oder sie sind an einer Seite hochroth, an der anderen grau oder gelblich-weiß, je nach der Ausdehnung des Oberhautverlustes. Gerade an den Backenpapillen tritt der stellenweise Verlust der Oberhaut frühzeitig und recht deutlich hervor.

Die Bindehaut der Augen ist von Anfang an geröthet und wird zuweilen bald kirschroth. Am zweiten Tage der Krankheit zeigt sich starkes Thränen der Augen, weiterhin gewöhnlich unter Wiederabnahme der Röthung eine dickschleimige, eiterartige Absonderung. Die durchsichtige Hornhaut ist bei der Rinderpest immer ungetrübt. Die Nasenschleimhaut ist meistens fleckig oder streifig geröthet, ihre Absonderung in der Regel vermehrt, sodaß schon am zweiten Tage der Krankheit ein wässriger, später schleimiger, zuweilen sogar eiterartiger Ausfluß entsteht.

Das Athmen ist meistens von Anfang der Krankheit an beschleunigt (20—80 Athemzüge in der Minute) und erschwert. Oft lassen die Thiere auch von vornherein einen Husten, der anfangs noch kräftig ist, hören.

Bei manchen Kranken finden sich an der äußeren Haut ähnliche krankhafte Veränderungen wie an den Schleimhäuten, nämlich Röthung, vermehrte Absonderung, sodaß die Oberfläche sich feucht und fettig anfühlt, und Lockerung der Oberhaut, die sich dann in Schuppen abstößt oder sich in eine dünne Schorfdecke umwandelt. Diese Veränderungen treten an den weichen Hauptpartieen, am Euter neben den Strichen, an den Schaamlippen, am Scrotum und an der inneren Fläche der Hinterschenkel, am deutlichsten hervor.

Nachdem die Krankheit 24 Stunden bestanden hat, treten die genannten Symptome immer deutlicher hervor. Der Appetit verschwindet in allen Fällen am zweiten bis dritten Tage vollständig; die Abgeschlagenheit und Hinfälligkeit erreichen dann einen sehr hohen Grad, sodaß die Thiere nur mit Mühe aufstehen können, im Gange stark schwanken, und oft zusammenbrechen, wenn behufs der Untersuchung des Maules der Kopf emporgehoben wird. Mit

der Schwäche ist ein starkes Zusammenfallen, eine schnell eintretende auffällige Abmagerung des Körpers verbunden. Die Röthung der Schleimhaut im Maule wird noch auffälliger, die grauen oder gelblichweißen Flecke auf derselben werden größer und zahlreicher, und die Abstoßung der krankhaft veränderten Oberhaut von diesen Flecken, sowie von den Backenpapillen nimmt immer mehr zu. Besonders die Scheidenschleimhaut bei weiblichen Thieren wird gleichmäßig braunroth und erscheint mit zahlreichen größeren oder kleineren grauen oder gelblichen Flecken oder mit Fetzen von abgestoßener Oberhaut besetzt, die wie Schleimflocken an der Oberfläche hängen, sich aber schwerer als solche zwischen den Fingern zerreiben lassen.

Das Athmen wird am zweiten oder dritten Tage der Krankheit in allen Fällen beschleunigt und erschwert, oder die Erschwerung steigert sich, wenn sie von vornherein vorhanden war. Gewöhnlich ist das Athmen dann deutlich bauchschlägig, mit starker Zusammenziehung der Bauchmuskeln beim Ausathmen. Der Husten wird häufiger, schmerzhafter und matter.

Bei manchen Kranken bilden sich Luftgeschwülste (Emphyseme) unter der Haut auf dem Rücken oder am Halse, die beim Darüberstreichen mit der Hand knistern.

Als ein neues characteristisches Symptom tritt am zweiten oder dritten Tage der Krankheit Durchfall hinzu. Die Entleerungen sind zuerst dünnbreiig, werden aber bald wässrig und weiterhin dickschleimig und zuweilen mit Blutspuren vermischt. Dann sind die Entleerungen meist sehr übelriechend. Gewöhnlich werden die flüssigen Excremente unter deutlichen Schmerzäußerungen, in kleinen Mengen, aber häufig wiederholt, bisweilen auch unwillkührlich abgesetzt. Die dabei hervortretende Mastdarmschleimhaut erscheint stark geröthet. Wenn der Durchfall ein oder zwei Tage bestanden hat, so sind die Thiere oft so schwach und hinfällig geworden, daß sie sich kaum noch zu erheben vermögen und die wässrigen oder schleimigen Massen im Liegen entleeren. Der After bleibt dann zuweilen wie gelähmt offen stehen. Das Athmen ist dann gewöhnlich stöhnend und sehr erschwert, der Husten matt.

Hochträchtige Kühe verkalben gewöhnlich auf der Höhe der Krankheit.

Die Steigerung der Krankheit erfolgt, namentlich mit dem Eintritte des Durchfalls, immer sehr rasch. Die angegebenen characteristischen Erscheinungen (die Fiebersymptome, die eigenthümlichen Veränderungen an den Schleimhäuten, die Athembeschwerde) finden sich in der Regel im Laufe von 24 Stunden nach dem Beginne der Krankheit zusammen; und dann erfolgt von Stunde zu Stunde eine Verschlimmerung. Der Tod erfolgt in den meisten Fällen am vierten bis siebenten Tage nach dem Ausbruche der Krankheit, selten einige Tage später. Zuweilen schreitet die Krankheit so schnell fort, daß sie schon im Verlaufe von zwei Tagen ihre Höhe erreicht.

Von den erkrankten Thieren gehen durchschnittlich 70 — 75 pCt. zu Grunde. Bei denjenigen, welche genesen, erreichen die Krankheitserscheinungen nicht den höchsten Grad. Die Besserung tritt dann oft recht schnell ein, zuweilen auch bei Thieren, die schon ziemlich heftig erkrankt sind. Meistens besteht dann aber, nachdem die übrigen Symptome allmählig verschwunden sind, der Durchfall noch Tagelang fort. Wenn ein Rinderpestfall von vornherein mehr gutartig verläuft und mit Genesung endet, so ist es oft schwer, denselben mit Sicherheit zu erkennen. Aber wenigstens der Verdacht auf Rinderpest tritt auch dann bei aufmerksamer Untersuchung des Patienten hervor, und dieß genügt, um vorläufig die nöthigen Vorsichtsmaßregeln gegen eine Verschleppung der Krankheit anzuordnen, namentlich das Schlachten des kranken Thieres zu unterlassen. Der zweite oder dritte Krankheitsfall in demselben Stalle bringt dann die Entscheidung.

Die Fütterung der Thiere wirkt in der Art auf den Verlauf der Rinderpest ein, daß derselbe bei weicher Fütterung gutartiger, bei harter Fütterung heftiger und bösartiger ist. Durch feste Inhaltsmassen im Darme wird die Reizung der Schleimhaut desselben noch gesteigert. Im Sommer bei Weidegang ist der Verlauf der Krankheit im Allgemeinen günstiger, als im Winter in engen, dunstigen Ställen.

Bei Schafen und bei Ziegen sind die Erscheinungen und der Verlauf der Rinderpest im Wesentlichen wie beim Rinde.

Sections-Erscheinungen.

Bei der Obduction der an der Rinderpest gestorbenen oder der getödteten rinderpestkranken Thiere finden sich die wichtigsten krankhaften Veränderungen auf der Schleimhaut des vierten (Lab-) Magens und des Darmes.

Im Anfange der Krankheit erscheint die Magenschleimhaut, vorzugsweise in der Nähe der Uebergangsöffnung in den Darm, sowie auch die Schleimhaut des Dünndarms stark geröthet, hie und da von Blutpunkten oder Blutstreifen durchzogen und mit einer zähen, röthlichen oder blutigen Flüssigkeit bedeckt. Eine ähnliche, aber nicht so stark ausgeprägte Veränderung zeigt auch die Schleimhaut in den dicken Gedärmen, besonders auf den in das Innere vorspringenden Falten. Auf der Mastdarmschleimhaut, namentlich auf den Falten, ist die Röthung wieder sehr stark.

Der Inhalt des Magens und Darmes ist weich oder flüssig und röthlich, selbst blutig gefärbt.

Wenn die Krankheit vollständig entwickelt war, so ist die Röthung der Magenschleimhaut viel dunkler, oft violett. Namentlich auf den Falten tritt die dunkle Röthung hervor. Die Punkte und Streifen von ausgetretenem Blute sind in der Schleimhaut viel zahlreicher und größer, am größten in der Nähe der Oeffnung in den Darm. Außerdem finden sich auf der Oberfläche der Schleimhaut zahlreiche, einige Linien im Durchmesser haltende, gelblich-braune oder gelblich-grüne oder röthliche dünne Platten, die wie kleine Schorfe erscheinen und die mit der Schleimhaut meist nur an der Peripherie locker zusammenhängen. Hebt man diese Platten ab, so bleibt eine leicht vertiefte, heller geröthete Stelle. Oft haben sich mehr oder weniger zahlreiche Platten schon freiwillig abgelöst und eine seichte Vertiefung, die wie ein flaches Geschwür erscheint, zurückgelassen.

Die Dünndarmschleimhaut erscheint ebenfalls hochroth; die Schleimhaut des an den Magen grenzenden Zwölffingerdarms

namentlich bei krepirten Thieren ist oft schwarzroth, wie mit Ruß bestreuet. Die kleinen Blutgefäße der Darmschleimhaut sind stark gefüllt, und zwischen denselben finden sich zahlreiche Blutpunkte und Blutstreifen in der Schleimhaut. Außerdem werden auch an einzelnen Stellen des Darmes auf der Schleimhaut kleine platte schorfähnliche Auflagerungen wie im Magen angetroffen.

Auch auf der Schleimhaut im Dickdarme nimmt die Röthung mit der Dauer der Krankheit zu und tritt immer auf den Falten am stärksten hervor. Am hochgradigsten ist sie im Endstücke des Mastdarmes und in der Umgebung der Einmündung des Hüftdarmes (Endstück vom Dünndarme) in den Blinddarm.

Der Inhalt des Darmes besteht am Ende der Krankheit aus einer braunröthlichen oder weißgelblichen, oft mit Flocken untermischten, übelriechenden Flüssigkeit.

Im ersten und zweiten Magen finden sich keine bemerkenswerthen Veränderungen. Auch die Beschaffenheit des dritten Magens (Psalters) ist nicht characteristisch. Der Inhalt desselben ist bei krepirten Thieren meistens fest, in anderen Fällen aber auch weich.

Die Leber ist nicht wesentlich verändert; die Gallenblase ist jedoch immer sehr stark gefüllt und groß; die Galle ist wässrig, hellgrün, die innere Oberfläche der Gallenblase, namentlich am Grunde, geröthet und von zahlreichen kleinen Blutgefäßen durchzogen, zuweilen auch von kleinen Blutpunkten durchsetzt.

Die Milz ist in der Regel im Ganzen nicht vergrößert, sondern mehr derb und trocken. In einzelnen Fällen ist ein Theil des Organes ähnlich wie beim Milzbrande aufgetrieben, dunkelroth und weich.

Auf der Schleimhaut der Scheide finden sich die schon am lebenden Thiere wahrzunehmenden Veränderungen, und weiter vorn, sowie in der Gebärmutter starke Röthung und Auflockerung.

In der Maulhöhle zeigen sich die unter den Symptomen der Krankheit bereits aufgezählten Veränderungen. Die Schleimhaut des Kehlkopfes und der Luftröhre ist streifig und fleckig geröthet und auf der Höhe der Krankheit mit hautartigen, weißlich- oder grünlichgelben Auflagerungen besetzt oder von einer dicken Schicht zähen Schleimes überzogen.

Die Lungen erscheinen unverändert oder etwas blutreicher oder blasser und stark gedunsen und puffig.

Das Herz ist welk und schlaff, von schmutzig-brauner Farbe; das darin befindliche Blut ist dunkel, flüssig oder locker geronnen.

Rinderpestähnliche Krankheiten.

1. Die Maulseuche hat eine oberflächliche Aehnlichkeit mit der Rinderpest, indem bei derselben vermehrtes Speicheln und Blasen- und Geschwürsbildung auf der Maulschleimhaut sich finden. Eine einigermaßen genaue Untersuchung der Maulhöhle läßt aber die Unterschiede zwischen den Veränderungen der einen und der anderen Krankheit leicht erkennen. Weitere Unterscheidungsmerkmale sind das Vorkommen der Klauenseuche neben der Maulseuche und die Schnelligkeit der Verbreitung dieser Krankheit im Stalle, wenn erst ein Thier erkrankt ist. In der Regel breitet sich die Maulseuche im Laufe weniger Tage über den ganzen Viehbestand im Stalle aus.

2. Mit der Lungenseuche (im fieberhaften Stadium) kann die Rinderpest auf den ersten Blick verwechselt werden, weil bei beiden Krankheiten Athmungsbeschwerden bestehen. Die Aehnlichkeit kann noch größer werden, wenn das lungenseuchekranke Thier zufällig oder in Folge der Anwendung von Medicamenten mit Durchfall behaftet ist. Bei dieser Krankheit fehlen aber die der Rinderpest eigenthümlichen krankhaften Veränderungen auf den Schleimhäuten, während bei der Rinderpest wieder die Verhärtung der Lunge nicht vorhanden ist. In zweifelhaften Fällen giebt die Obduction Aufschluß.

Schwierig kann die Erkennung des Sachverhaltes sein, wenn die Rinderpest in einem Stalle zum Ausbruche kommt, in welchem bereits die Lungenseuche herrschte, und beide Krankheiten gleichzeitig in ein und demselben Thiere bestehen.

3. Das bösartige Catarrhalfieber, die Kopfkrankheit, ist eine der Rinderpest sehr ähnliche Krankheit, die in einer heftigen Entzündung der Schleimhäute des Kopfes besteht und mit heftigem Fieber, mit Athmungsbeschwerden, anfangs mit Verstopfung und

später mit Durchfall verbunden ist. Die Entzündung der Nasenschleimhaut ist aber bei dieser Krankheit viel heftiger, als bei der Rinderpest, das Athmen ist mit Geräuschen in den Nasengängen verbunden und der Ausfluß aus der Nase ist weit stärker und oft blutig. Regelmäßig ist bei dieser Krankheit die durchsichtige Hornhaut der Augen getrübt, während diese bei der Rinderpest klar bleibt. Bei der Obduction finden sich noch weitere Unterschiede.

4. Die Ruhr hat in ihren Erscheinungen und in ihrem Verlaufe in dem einzelnen Falle eine so große Aehnlichkeit mit der Rinderpest, daß eine Unterscheidung sehr oft nicht möglich ist. Erst die Verbreitung der Krankheit im Stalle, die bei der Ruhr anders zu sein pflegt, als bei der Rinderpest, ermöglicht es, die Krankheit sicher zu erkennen.

In allen zweifelhaften Fällen, wenn ein Verdacht auf Rinderpest besteht, sind die nöthigen Vorkehrungen gegen die weitere Verbreitung der Krankheit zu treffen, bis auf Grund der fortgesetzten Untersuchung der Krankheit durch Sachverständige eine sichere Entscheidung gefällt werden kann.

Gesetz,

Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend

vom 7. April 1869.

(Bundesgesetzblatt Seite 105.)

Wir **Wilhelm**, von Gottes Gnaden König von Preußen ꝛc., verordnen im Namen des Norddeutschen Bundes, nach erfolgter Zustimmung des Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

§ 1.

Wenn die Rinderpest (Löserdürre) in einem Bundesstaate oder in einem an das Gebiet des Norddeutschen Bundes angrenzenden oder mit demselben im direkten Verkehre stehenden Lande ausbricht, so sind die zuständigen Verwaltungsbehörden der betreffenden Bundesstaaten verpflichtet und ermächtigt, alle Maßregeln zu ergreifen, welche geeignet sind, die Einschleppung und beziehentlich die Weiterverbreitung der Seuche zu verhüten und die im Lande selbst ausgebrochene Seuche zu unterdrücken.

§ 2.

Die Maßregeln, auf welche sich die im § 1 ausgesprochene Verpflichtung und Ermächtigung je nach den Umständen zu erstrecken hat, sind folgende:

1) Beschränkungen und Verbote der Einfuhr, des Transports und des Handels in Bezug auf lebendes oder todtes Rindvieh, Schafe und Ziegen, Häute, Haare und sonstige thierische Rohstoffe in frischem oder trockenem Zustande, Rauchfutter, Streumaterialien, Lumpen, gebrauchte Kleider, Geschirre und Stallgeräthe; endlich Einführung einer Rindviehkontrole im Grenzbezirke;
2) Absperrung einzelner Gehöfte, Ortstheile, Orte, Bezirke gegen den Verkehr mit der Umgebung;

3) Tödtung selbst gesunder Thiere und Vernichtung von giftfangenden Sachen, ingleichen, wenn die Desinfection nicht als ausreichend befunden wird, von Transportmitteln, Geräthschaften und dergl. im erforderlichen Umfange;
4) Desinficirung der Gebäude, Transportmittel und sonstigen Gegenstände, sowie der Personen, welche mit seuchekranken oder verdächtigen Thieren in Berührung gekommen sind;
5) Enteignung des Grund und Bodens für die zum Verscharren getödteter Thiere und giftfangender Dinge nöthigen Gruben.

§ 3.

Für die auf Anordnung der Behörde getödteten Thiere, vernichteten Sachen und enteigneten Plätze, sowie für die nach rechtzeitig erfolgter Anzeige des Besitzers gefallenen Thiere wird der durch unparteiische Taxatoren festzustellende gemeine Werth aus der Bundeskasse vergütet.

Diese Entschädigung wird jedoch nicht gewährt für solches Vieh, welches innerhalb zehn Tagen nach erfolgter Einfuhr oder nach Eintrieb über die Bundesgrenze an der Seuche fällt.

§ 4.

Jeder, der zuverlässige Kunde davon erlangt, daß ein Stück Vieh an der Rinderpest krank oder gefallen ist oder daß auch nur der Verdacht einer solchen Krankheit vorliegt, hat ohne Verzug der Ortspolizeibehörde Anzeige davon zu erstatten. Die Unterlassung schleunigster Anzeige hat für den Viehbesitzer selbst, welcher sich dieselbe zu Schulden kommen läßt, jedenfalls den Verlust des Anspruches auf Entschädigung für die ihm gefallenen oder getödteten Thiere zur Folge.

§ 5.

Die Einwohner von der Rinderpest betroffener Orte sind verpflichtet, die Behörden bei Ausführung der polizeilichen Maßregeln entweder selbst oder durch geeignete Personen zu unterstützen.

§ 6.

Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet, so lange noch eine Gefahr der Einschleppung der Rinderpest von irgend einer

Seite her droht oder die Seuche im Bundesgebiete an irgend einem Orte herrscht, diejenigen Eisenbahnwagen, welche zum Transporte von Rindvieh oder auch, sobald die Wagen solche sind, welche sich zum Rindviehtransporte eignen, von anderem Vieh gedient haben, nach jedesmaligem Gebrauch zu desinficiren. Diese Verpflichtung liegt derjenigen Verwaltung ob, auf deren Strecke das Ausladen, beziehentlich im Transit die Ueberschreitung der Bundesgebietsgrenze beim Wiederausgange stattgefunden hat. Die Eisenbahnverwaltungen dürfen dafür von dem Versender eine Entschädigung von zehn Silbergroschen für den Wagen erheben.

§ 7.

Die näheren Bestimmungen über die Ausführung der vorstehenden Vorschriften und deren Ueberwachung durch die geeigneten Organe, über die Bestreitung der entstehenden Kosten und die Bestrafung der Zuwiderhandlungen sind von den Einzelstaaten zu treffen. Es ist jedoch von den deshalb erlassenen Verfügungen dem Bundespräsidium Mittheilung zu machen.

§ 8.

Vom Bundespräsidium wird eine allgemeine Instruction erlassen, welche über die Anwendung der im § 2 unter Nr. 1 bis 4 aufgeführten Maßregeln nähere Anweisung giebt und den nach § 7 von den Einzelstaaten zu treffenden Bestimmungen zur Grundlage dient.

§ 9.

Sobald die Regierung eines Bundesstaates in die Lage kommt, ein Einfuhrverbot zu erlassen, zu verändern oder aufzuheben, hat dieselbe dem Bundespräsidium und den Regierungen der benachbarten Bundesstaaten davon Mittheilung zu machen.

§ 10.

Einfuhrbeschränkungen zwischen den einzelnen Bundesstaaten sind erst dann zulässig, wenn die Rinderpest innerhalb eines Bundesstaates ausbricht.

§ 11.

Bricht die Rinderpest in einem Bundesstaate aus, so ist dem Bundespräsidium hiervon, sowie von den ergriffenen Maßregeln Anzeige zu machen, dasselbe auch von dem weiteren Gange der Seuche in Kenntniß zu erhalten.

§ 12.

Dem Bundeskanzler liegt ob, die Ausführung dieses Gesetzes und der auf Grund desselben erlassenen Anordnungen zu überwachen. Erforderlichen Falls wird der Bundeskanzler selbstständig Anordnungen treffen, oder einen Bundescommissar bestellen, welcher die Behörden des betheiligten Einzelstaates unmittelbar mit Anweisung zu versehen hat. Tritt die Seuche in einer solchen Gegend des Bundesgebietes oder in solcher Ausdehnung auf, daß von den zu ergreifenden Maßregeln nothwendig die Gebiete mehrerer Bundesstaaten betroffen werden müssen, so hat der Bundescommissar für Herstellung und Erhaltung der Einheit in den Seitens der Landesbehörden zu treffenden oder getroffenen Maßregeln zu sorgen und deshalb das Erforderliche anzuordnen.

§ 13.

Die Behörden der verschiedenen Bundesstaaten sind verpflichtet, sich bei Ausführung der Maßregeln gegen die Rinderpest auf Ansuchen gegenseitig zu unterstützen.

§ 14.

Zur Durchführung der Absperrungsmaßregeln ist militärische Hülfe zu requiriren. Die Commandobehörden haben den desfallsigen Requisitionen der competenten Verwaltungsbehörden im erforderlichen Umfange zu entsprechen.

Sämmtliche Mehrkosten, welche durch die geleistete militärische Hülfe gegen die reglementsmäßigen Kosten des Unterhalts der requirirten Truppen in der Garnison entstehen, fallen der Bundeskasse zur Last.

Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Bundes-Insiegel.

Gegeben Berlin, den 7. April 1869.

(L. S.) **Wilhelm.**

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Instruction

zu dem Gesetze vom 7. April 1869,

Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend.

(Bundesgesetzblatt Seite 105.)

Zur Ausführung von § 8 des Gesetzes vom 7. April 1869, Maßregeln gegen die Rinderpest betreffend, wird nachfolgende Instruction erlassen, deren Bestimmung ist, den Behörden eine allgemeine Anleitung zu geben, ohne die Nothwendigkeit der besonderen Entschließung über Einzelheiten und über die Ausdehnung der Maßregeln in jedem einzelnen Falle auszuschließen. Leitender Grundsatz soll sein: den Zweck ohne unverhältnißmäßige anderweite wirthschaftliche Opfer für die Bevölkerung zu erreichen. In der Regel wird dies am Besten durch energische Maßregeln erfolgen, welche die Seuche in kurzer Zeit tilgen, wenn auch die directen Opfer scheinbar groß sind.

Erster Abschnitt.

Maßregeln bei dem Ausbruche der Rinderpest im Auslande.

a) In der Entfernung.

§ 1. Bei dem Auftreten der Rinderpest in entfernten Gegenden kommt es darauf an, ob dieselben durch Eisenbahnen oder durch Schifffahrt in solcher Verbindung mit dem Inlande stehen, daß Viehtransporte in verhältnißmäßig kurzer Zeit in das Inland gelangen können.

Ist die von der Seuche ergriffene Gegend durch Eisenbahnen mit dem Inlande verbunden, so hat sich das Einfuhrverbot auf alles Rindvieh aus dieser Gegend ohne Ausnahme zu erstrecken.

§ 2. Das Einfuhrverbot hat sich ferner zu erstrecken: auf frische (auch gefrorene) Rindshäute, Hörner und Klauen, Fleisch, Knochen, Talg, wenn letzteres nicht in Fässern, ungewaschene Wolle, welche nicht in Säcken verpackt ist, und Lumpen.

§ 3. Die Einfuhr von Schafen und Ziegen ist ebenfalls zu verbieten. Schweine dürfen nur in Etagewagen eingeführt werden.

§ 4. Was von der Einfuhr gesagt ist, gilt im Allgemeinen auch von der Durchfuhr. Doch kann ausnahmsweise die Durchfuhr durch das Bundesgebiet Viehtransporten gestattet werden, wenn von Veterinärbeamten festgestellt ist, daß die Gegend, aus welcher das Vieh kommt, seit drei Monaten und mindestens in einem Umkreise von drei Meilen seuchenfrei ist und der Transport in vorschriftsmäßigen Wagen erfolgt.

Die Durchfuhr hat in besonderen Zügen unter polizeilicher Begleitung in denselben Wagen ohne Umladung zu geschehen, auch darf unterwegs kein Stück ausgeladen werden. Sterben unterwegs einzelne Stücke, so bleiben solche unberührt im Wagen liegen, bis zum Ausgangspunkte des Transports, wo selbige unter Zuziehung von Veterinärbeamten vorschriftsmäßig vernichtet werden müssen, wenn nicht die Möglichkeit geboten ist, daß die Ausladung und Vernichtung unterwegs durch einen Sachverständigen ohne Gefahr geschehen kann.

Wird wegen Zerbrechens eines Wagens oder aus ähnlichen Gründen ein Umladen unvermeidlich, so ist dasselbe von der Eisenbahnverwaltung unter amtlicher Aufsicht und unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln zu bewirken. Für Absperrung des umzuladenden Viehes, für sofortige Verscharrung der etwa vorhandenen Cadaver, welche letztere in jedem Falle gleich den an der Rinderpest gefallenen Thieren (§§ 27—30) zu behandeln sind, muß gesorgt werden.

Die entleerten Wagen und die Umladestellen sind zu desinficiren.

Zum Tränken der Thiere unterwegs sind eigene, von der Behörde gestempelte Tränkeimer mitzuführen. Das Füttern, sobald solches auf langen Transporten nothwendig wird, darf nur von den, den Transport begleitenden Personen besorgt werden.

Vieh, welches nach den Seeplätzen versendet wird, ist rücksichtlich des Transportes und aller in § 4 erwähnten Maßregeln dem Transitvieh gleich zu behandeln.

§ 5. Für Schlachtvieh, soweit es zur Versorgung des Inlandes nöthig ist, kann ausnahmsweise auch die Einfuhr nach solchen Städten gestattet werden, in welchen öffentliche Schlacht-

stätten vorhanden sind, die durch Schienenstränge mit der Eisenbahn, auf welcher die Einfuhr stattfindet, in Verbindung stehen. Die Einfuhr muß für jeden besonderen Fall von der Behörde genehmigt werden und hat unter Beobachtung der für jeden Fall besonders zu erlassenden polizeilichen Vorschriften zu erfolgen.

b) In der Nähe.

§ 6. Tritt die Seuche in Gegenden des Nachbarlandes auf, welche nicht über fünf bis zehn Meilen von der Grenze entfernt sind, dann ist für die nach Umständen zu bestimmende Grenzstrecke das Einfuhrverbot unbedingt auf alle Arten von Vieh (einschließlich der Pferde und des Federviehs), auf alle vom Rinde stammenden thierischen Theile in frischem oder trockenem Zustande (mit Ausnahme von Butter, Milch und Käse), auf Dünger, Rauchfutter, Stroh und andere Streumaterialien, gebrauchte Stallgeräthe, Geschirre und Lederzeuge, auf unbearbeitete (bez. keiner Fabrikwäsche unterworfene) Wolle, Haare und Borsten, auf gebrauchte Kleidungsstücke für den Handel zu erstrecken.

Personen, deren Beschäftigung eine Berührung mit Vieh mit sich bringt, z. B. Fleischer, Viehhändler und deren Personal, dürfen die Grenze nur an bestimmten Orten überschreiten und müssen sich dort einer Desinfection unterwerfen.

Nur in einzelnen dringenden Fällen können auch Ausnahmen für Schlachtvieh nach § 5 eintreten.

§ 7. Rückt die Seuche bis in die Grenzgegenden vor, oder gewinnt sie längs der Grenze in einer noch vom kleinen Grenzverkehr berührten Entfernung an Ausdehnung, dann hat für die betreffenden Grenzstrecken die vollständige Verkehrssperre unter Bildung eines Cordons mit militärischen Kräften einzutreten, im benachbarten Inland treten aber die Vorschriften des II. Abschnitts in Kraft.

Für den Durchgang von Posten u. s. w. kommen dann dieselben Maßregeln in Anwendung, wie bei einem abgesperrten Orte im Inlande.

§ 8. Wird in den vorstehend behandelten Fällen die angeordnete Sperre durchbrochen, so sind die der Sperre unterworfenen

Thiere soweit möglich sofort zu tödten und zu verscharren, Menschen und sonstige Gegenstände auf kürzestem Wege wieder über die Grenze zurückzubringen, wo möglich ohne Ortschaften zu passiren.

Giftfangende Sachen sind zu vernichten oder zu desinficiren.

§ 9. In den bedrohten Grenzkreisen sind für sämmtliche Ortschaften, welche innerhalb zwei Meilen von der Grenze entfernt liegen, folgende Kontrole-Maßregeln einzuführen.

Es ist in jedem Orte ein Viehrevisor zu bestellen, der ein genaues Register über den vorhandenen Rindviehstand aufnehmen und täglich den Ab- und Zugang, sowie jede Veränderung in dem Viehstande speciell verzeichnen muß.

Die Viehregister sind mindestens einmal wöchentlich von den vorgesetzten Organen zu revidiren.

Bei vorkommenden Krankheits- oder Todesfällen im Rindviehstande ist sofort Anzeige zu machen.

§ 10. Vorstehende in §§ 1 bis 9 enthaltene Vorschriften sind unter den durch die Umstände gebotenen Abänderungen auch dann in Anwendung zu bringen, wenn die Gefahr einer Einschleppung der Seuche zu Wasser droht.

Sind unter dem an Bord eines Schiffes befindlichen Rindvieh unterwegs verdächtige Erkrankungs- oder Todesfälle vorgekommen, dann sind von der Sanitätsbehörde des Hafenplatzes die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen.

Zweiter Abschnitt.

Maßregeln beim Ausbruche der Rinderpest im Inlande.

§ 11. Sobald in einem Orte des Inlandes ein der Rinderpest verdächtiger Krankheits- oder Todesfall an Rindvieh vorkommt, oder in einem Orte innerhalb 8 Tagen zwei Erkrankungs- oder Todesfälle unter verdächtigen Erscheinungen sich in Einem Viehbestande ereignen, tritt die in § 4 des Gesetzes vom 7. April 1869 ausgesprochene Anzeigepflicht ein.

§ 12. Der Besitzer darf dann die kranken Thiere nicht schlachten oder tödten, etwa gestorbene Thiere aber nicht verscharren

oder sonst beseitigen, ehe die Natur der Krankheit festgestellt ist. Bis dahin sind todte Thiere so aufzubewahren, daß das Hinzukommen von Thieren oder Menschen abgehalten wird.

§ 13. Auf die erhaltene Anzeige ist von den Orts-Polizeibehörden sofort der competente Thierarzt herbeizuholen, um an Ort und Stelle die Krankheit zu constatiren. Behufs der hierzu erforderlichen Section ist, in Ermangelung eines Cadavers, ein Thier zu tödten. Das Ergebniß der Untersuchung ist protocollarisch aufzunehmen.

§ 14. Wird die Krankheit als Rinderpest erkannt, so ist die Untersuchung auch auf die Ermittelung der Art der Einschleppung zu erstrecken.

Im Uebrigen ist dann sofort zur weiteren Anzeige an die vorgesetzten Behörden und zu öffentlicher Bekanntmachung zu schreiten, in welcher auf die Anzeigepflicht nach § 4 des Gesetzes vom 7. April 1869 für die zunächst liegenden Bezirke noch besonders hinzuweisen ist.

Vom Zeitpunkte dieser Bekanntmachung an treten die in §§ 17 bis 19 angegebenen Verbote und Verpflichtungen ein.

§ 15. Ist nur ein dringender Verdacht der Rinderpest zu constatiren, so ist eine vorläufige Sperre des Gehöftes (vergl. § 20) auf so lange anzuordnen, bis die Krankheit durch weitere Erkrankungen und beziehentlich Sectionen unzweifelhaft festgestellt ist.

In zweifelhaften Fällen ist ein höherer Thierarzt zuzuziehen.

§ 16. Anwendung, Verkauf und Anempfehlung von Vorbauungs- und Heilmitteln bei der Rinderpest sind bei Strafe zu verbieten. Zu den Vorbauungsmitteln sind Desinfectionsmittel nicht zu rechnen.

§ 17. Nach Ausbruch der Rinderpest ist in einem nach Maßgabe der Umstände besonders zu bestimmenden Umkreise, welcher nicht unter drei Meilen Entfernung vom Seuchenorte bemessen werden darf, die Abhaltung von Viehmärkten, nach Befinden auch von anderen Märkten, und sonstige Veranlassungen zu größeren Ansammlungen von Menschen und Thieren zu untersagen, auch der Handel mit Rindvieh und nach Befinden selbst von Schafen und

Schweinen und der Transport derselben, sowie von Rauchfutter, Streumaterialien und Dünger ohne besondere Erlaubnißscheine. Das nöthige Vieh zum Fleischconsum darf nur unter Aufsicht der Veterinär-Polizeibehörden gekauft und geschlachtet werden.

§ 18. Im Seuchenorte hat das Schlachten nur nach Anordnung der Polizeibehörde und unter Aufsicht von Sachverständigen nach Maßgabe des Bedarfes stattzufinden.

§ 19. Im Seuchenorte erstreckt sich die Anzeigepflicht auf jeden Erkrankungsfall von Rindvieh und Wiederkäuern.

§ 20. Das Gehöfte, in welchem die Rinderpest ausgebrochen ist, wird zunächst durch Wächter abgesperrt, welche weder das Gehöfte betreten und mit dessen Einwohnern verkehren, noch den Ein- und Austritt von Personen (außer den besonders dazu legitimirten), lebenden und todten Thieren oder Sachen aller Art dulden dürfen.

Die Ermächtigung zum Eintritt kann nur den mit der Tilgung der Seuche selbst beschäftigten Personen, sowie Geistlichen, Gerichtspersonen, Aerzten oder Hebeammen Behufs Ausübung ihrer Berufsgeschäfte ertheilt werden und ist für deren formelle Legitimation zu sorgen. Beim Wiederaustritt hat eine Desinfection derselben stattzufinden. Am Eingange und rund um das Gehöft sind Tafeln mit der Inschrift „Rinderpest" anzubringen.

§ 21. Für den ganzen Ort, welchem das infizirte Gehöfte angehört, tritt eine relative Ortssperre ein, welche in Folgendem besteht:

Die Einwohner dürfen unter einander verkehren, aber den Ort ohne besondere Genehmigung — welche in der Regel nur solchen Personen ertheilt werden soll, die keinen Verkehr mit Rindvieh haben — nicht verlassen.

Alles Vieh muß im Stalle behalten, Hunde und Katzen eingesperrt werden. Frei umherlaufende Schweine und Federvieh werden eingefangen und geschlachtet, Hunde und Katzen getödtet und verscharrt. Fuhren dürfen nur mit Pferden gemacht werden.

Für alles Vieh, Heu, Stroh und andere giftfangende Sachen ist die Ein-, Aus- und Durchfuhr zu verbieten.

An allen Ein- und Ausgängen des Ortes sind Tafeln mit der Aufschrift „Rinderpest" aufzustellen, und Wächter, welche die Beobachtung vorstehender Verbote zu überwachen haben.

§ 22. Für jeden Ort, wenigstens für jeden irgend größeren Ort ist für die Dauer der Seuche ein Ortscommissar (welchem nach Befinden noch besondere Aufseher beizugeben sind) zu bestellen, an welchen dann die im § 19 vorgeschriebenen Anzeigen zu richten sind und welcher die Ausführung der nöthigen Maßregeln zu überwachen hat.

Wenn einmal der Ausbruch der Seuche an einem Orte constatirt ist, so ist die fernere Constatirung neuer Krankheitsfälle (§ 13) den Ortscommissaren zu überlassen.

§ 23. Ergreift die Krankheit einen größeren Theil der Gehöfte des Ortes, dann kann durch die höheren Behörden die absolute Ortssperre verfügt werden.

Der Ort wird dann vollständig durch Wachen (in diesem Falle militärische) cernirt und gegen jede Art des Verkehrs — mit Ausnahme legitimirter Personen und unumgänglicher Bedürfnisse für die Ortseinwohner unter besonders anzuordnenden Vorsichtsmaßregeln — gesperrt.

Der Verkehr der Bewohner unter einander ist ebenfalls auf das Unvermeidliche zu reduziren. Gottesdienst, Schule und andere Versammlungen (vergl. § 17) können nicht abgehalten werden, die Schänken und Gasthöfe werden geschlossen.

Die durch den Ort führenden Straßen sind einstweilen zu verlegen. Liegt der Ort an einer Eisenbahn, so darf kein Eisenbahnzug daselbst halten, selbst wenn der Ort ein Stationsort wäre; es sei denn, daß der Bahnhof so gelegen ist, daß er vom Orte vollständig abgesperrt und der Verkehr der Eisenbahnstation mit anderen Orten ohne Berührung des Seuchenortes unterhalten werden kann.

§ 24. Je nach der Größe der Bauart des von der Seuche betroffenen Ortes kann die relative und die absolute Ortssperre auch auf einzelne Ortstheile beschränkt werden, sowie andererseits einzelne Häuser und Gehöfte benachbarter Orte nöthigenfalls mit in die Sperre einzuschließen sind.

§ 25. In Residenz- und Handelsstädten und sonstigen Städten mit lebhaftem Verkehr bleibt stets die Sperre auf einzelne Grundstücke, beziehungsweise Ortstheile beschränkt. Relative und absolute Sperre des Ortes kommen nicht in Anwendung. Dagegen ist auf schleunige Tilgung der Seuche durch schnelle Tödtung des gesammten Viehstandes der zunächst ergriffenen Gehöfte und schleunige Desinfection Bedacht zu nehmen.

§ 26. Alles an der Rinderpest erkrankte oder derselben verdächtige Vieh ist sofort zu tödten. Wird dadurch der Viehbestand eines Gehöftes bis auf einen verhältnißmäßig kleinen Rest absorbirt, so ist auch letzterer zu tödten.

Auf Ermächtigung der höheren Behörde kann auch zu schnellerer Tilgung der Seuche gesundes Vieh, ohne daß die obige Voraussetzung eingetreten ist, getödtet und diese Maßregel auf nachweislich noch nicht infizirte Gehöfte ausgedehnt werden (vergl. namentlich § 25).

§ 27. Die getödteten Thiere sind zu verscharren. Zu diesem Behufe sind geeignete Plätze, möglichst entfernt von Wegen und Gehöften, an solchen Stellen zu benutzen, wohin kein Rindvieh zu kommen pflegt. So weit möglich sind wüste und gar nicht oder wenig angebaute Stellen zu wählen. Die Gruben sind 6 bis 8 Fuß tief zu machen.

§ 28. Tödten und Verscharren erfolgt so weit möglich durch die Einwohner des infizirten Gehöftes oder durch solche Personen aus dem Orte, welche selbst kein Vieh haben und nicht mit Vieh in Berührung kommen.

Personen aus anderen Orten, auch außerhalb des Ortes wohnende Abdecker dürfen nicht dazu verwendet werden.

§ 29. Die Stelle, an der die Viehstücke getödtet werden sollen, hat der Ortscommissar unter Zuziehung des bestellten Thierarztes unter Berücksichtigung der Vermeidung jeder Verschleppungsgefahr zu bestimmen. Auswurfsstoffe, welche das Thier während des Transports entleert, sind zu beseitigen und zu vergraben.

Cadaver dürfen nur durch Pferde oder Menschen auf Wagen, Schleifen oder Schlitten, ohne daß einzelne Theile die Erde berühren, nach der Grube transportirt werden. Die Transport-

mittel sind, so lange noch weitere Transporte in Aussicht stehen, sorgfältig separirt aufzubewahren, dann aber zu vernichten.

§ 30. Das Abledern der Cadaver ist streng zu untersagen. Vor dem Verscharren muß von den dazu bestellten Personen die Haut an mehreren Stellen zerschnitten und unbrauchbar gemacht werden. Alle etwaige Abfälle, Blut und mit Blut getränkte Erde sind mit in die Grube zu werfen. Soweit möglich sind die Cadaver vor dem Zuwerfen der Grube mit Kalk zu beschütten.

Beim Ausfüllen der Grube sind Zwischenschichten von Steinen oder Reissig, wenn möglich, anzubringen. Die Grube ist bis zur Aufhebung der Sperre, mindestens aber drei Wochen hindurch mit Wachen zu besetzen.

§ 31. Ist ein Stall, in welchem krankes oder verdächtiges Vieh gestanden hat, durch Tödtung des Viehbestandes entleert, so ist der etwa zurückbleibende Dünger mit Desinfectionsflüssigkeit zu übergießen, der Stall nach luftdichtem Verschluß aller Oeffnungen stark mit Chlor zu räuchern und hierauf die Stallthüre zu schließen und zu versiegeln. Alle Stallutensilien und was sonst bei den Thieren gebraucht worden ist, verbleiben im Stalle und sind beziehentlich vor dessen Verschluß wieder hineinzubringen.

Die Wiedereröffnung des Stalles darf nicht vor Eintritt der eigentlichen Desinfection stattfinden (vergl. §§ 40 ff.).

§ 32. Vorstehende Vorschriften über die Gehöfts- und Ortssperre erleiden dann die im Interesse der Wirthschaft unbedingt nöthigen Modificationen, wenn die Seuche zu einer Zeit auftritt, wo Feldarbeiten und Weidegang im Gange sind. Diese Modificationen sind von der vorgesetzten Behörde besonders festzustellen. Es sind dabei folgende Gesichtspunkte zu beachten.

§ 33. Die Gehöftsperre (§§ 15 und 20) kann auch dann nicht umgangen oder gemildert werden. Es ist aber dann dahin zu streben, daß sobald als möglich zu völliger Reinerklärung des Gehöftes gelangt werde. (Vergl. §§ 25 und 26.)

Unaufschiebbare Feldarbeiten sind entweder durch fremde Hülfe, oder durch die eigenen Leute des Gehöftes unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln zu beschaffen.

§ 34. Sind die Voraussetzungen der Ortssperre gegeben, so tritt dann an deren Stelle die Sperre der ganzen Feldmark, d. h. die in §§ 21 und 23 ff. angeordneten Sperrmaßregeln werden an die Grenze der Feldmark verlegt. Die durch die Feldmark führenden Wege werden abgegraben. Für längs der Grenze hinführende Wege wird das Betreten und der Transport von Vieh, Rauchfutter u. s. w. verboten.

Alle Ortseinwohner, welche noch krankheitsfreie ungesperrte Gehöfte haben, können ihre Feldarbeiten mit eigenen Leuten und Gespannen verrichten.

Rindviehgespanne sind dabei von der nachbarlichen Flurgrenze und von beziehungsweise verbotenen Wegen soweit irgend thunlich fern zu halten.

§ 35. Für die Umgebung des Seuchenortes (§ 17) ist nöthigenfalls der Weidegang ebenfalls zu untersagen und für die unmittelbar angrenzenden Fluren sind die nöthigen Beschränkungen des freien Verkehrs und Vorsichtsmaßregeln für die Feldbestellung anzuordnen.

§ 36. Bei der absoluten Sperre ist für Herbeischaffung der nothwendigsten Bedürfnisse der Bewohner: Lebensmittel, Brennmaterialien, Futter ꝛc. unter den nöthigen Vorsichtsmaßregeln Sorge zu tragen.

Dritter Abschnitt.

Maßregeln nach dem Erlöschen der Seuche.

§ 37. Die Seuche gilt in einem Gehöfte oder Orte für erloschen, wenn entweder alles Rindvieh gefallen oder getödtet ist, oder seit dem letzten Krankheits- oder Todesfalle drei Wochen verstrichen sind.

§ 38. Mit der Desinfection ist nach Maßgabe der Umstände sofort zu beginnen, sobald in einem Gehöfte ein Stall vom Vieh entleert ist.

§ 39. Die Desinfection darf nur auf amtliche Anordnung und nur unter sachverständiger Aufsicht geschehen.

§ 40. Die Desinfection beginnt mit Oeffnung der nach § 31 mit Chlor durchräucherten und verschlossenen Ställe und deren mehrtägiger Lüftung.

Aller Dünger wird herausgeschafft und an Orten, wo in den nächsten drei Monaten kein Rindvieh hinkommen kann, tief vergraben oder verbrannt.

Alles Mauerwerk wird abgekratzt (die Fugen gereinigt) und dann frisch mit Kalk beworfen und abgeputzt. Holzwerk wird ebenfalls abgefegt, mit heißer scharfer Lauge gewaschen, nach einigen Tagen mit Chlorkalklösung überpinselt.

Erd-, Sand- und Tennen- (Lehmschlag-) Fußböden werden aufgerissen, die Erde einen Fuß tief ausgegraben und Alles gleich dem Dünger behandelt. Pflaster-Fußböden gewöhnlicher Art, d. h. deren Steine in Sand oder Erde gesetzt sind, werden ebenfalls aufgerissen, die Erde einen Fuß tief ausgegraben und wie der Dünger behandelt. Die Steine können gereinigt, mit Chlorkalklösung behandelt und, wenn sie vier Wochen lang an der Luft gelegen haben, wieder benutzt werden. Fußböden von Holz werden nach Maßgabe ihrer Beschaffenheit entweder verbrannt oder in entsprechender Weise desinficirt. Müssen die Fußböden aufgerissen werden, so ist die Erde ebenfalls wie vorstehend auszugraben und zu behandeln. Feste undurchlässige Pflaster von Asphalt, Cement oder in Cement gesetztem Pflaster werden gereinigt und desinficirt.

Alles bewegliche Holzwerk (Krippen, Raufen, Gefäße und sonstige Utensilien, Stricke, wo möglich auch die Scheidewände) wird verbrannt, Eisenzeug ausgeglüht.

Jauchebehälter und Stallschleusen werden analog behandelt wie die Stallfußböden, oder, wenn sie gemauert sind, wie das Mauerwerk

Zum Schluß wird der Stall nochmals mit Chlor durchräuchert und dann 14 Tage lang durchlüftet.

§ 41. Bei der Desinfection dürfen nur Leute aus dem eigenen oder aus anderen inficirten Gehöften oder solche Personen verwendet werden, welche selbst kein Vieh haben; diese Personen müssen bis zu Beendigung der Reinigung im Gehöfte bleiben. Zu den Fuhren sind nur Pferdegespanne anzuwenden.

Bei dem Transporte von Dünger und Erde ist wie nach §§ 28. und 29 zu verfahren. Die Transportgeräthe können statt des Verbrennens auch einer sorgfältigen Desinfection, wie sie für Holzwerk vorgeschrieben ist, unterworfen werden.

§ 42. Die Kleidungsstücke der mit den kranken und todten Thieren und der Reinigung und Desinfection beschäftigt gewesenen Leute sind entweder zu verbrennen, oder, soweit sie waschbar sind, mit heißer Lauge 12 bis 24 Stunden stehen zu lassen, dann mit Seife gründlich zu waschen und an der Luft zu trocknen, soweit sie nicht waschbar sind, 12 bis 24 Stunden lang mit Chlor zu räuchern oder trockener Hitze auszusetzen und dann 14 Tage zu lüften.

Schuhwerk und Lederzeug muß sorgfältig gereinigt, mit Lauge oder schwacher Chlorkalklösung gewaschen und frisch gefettet, nochmals mit Chlor geräuchert und 14 Tage gelüftet werden.

Die Personen selbst haben die Kleider zu wechseln und den Körper gründlich zu reinigen.

§ 43. Alles Rauchfutter, welches nach der Art seiner Lagerung der Aufnahme von Ansteckungsstoff verdächtig erscheint, ist sogleich bei beginnender Desinfection durch Verbrennung zu vernichten.

§ 44. Auch der Mist von den Düngerstätten ist mit Pferdegeschirr fortzuschaffen und auf dem Felde sogleich — wenn der Frost dies hindern sollte, so bald als möglich — unterzupflügen.

So lange letzteres nicht geschehen ist und vier Wochen nachher, darf kein Rindvieh dieses Feld betreten.

§ 45. Selbst nach vollständiger Desinfection eines Gehöftes oder Ortes und Beseitigung der Sperre darf neuer Ankauf oder Verkauf von Vieh erst nach einer von der Behörde zu bestimmenden Frist, welche nicht unter sechs Wochen betragen darf, erfolgen.

Weideplätze, welche von pestkrankem oder pestverdächtigem Vieh benutzt worden sind, dürfen nicht vor Ablauf von mindestens zwei Monaten wieder benutzt werden.

§ 46. Die Abhaltung von Viehmärkten ist nicht vor Ablauf von sechs Wochen, nachdem der letzte Ort im Kreise oder Bezirke für seuchefrei erklärt, zu gestatten. Dasselbe gilt vom Handel mit Rindvieh.

Vierter Abschnitt.

Desinfection der Eisenbahnwagen.

§ 47. Der in § 6 des Gesetzes vom 7. April 1869 ausgesprochenen Verpflichtung der Eisenbahnverwaltungen zu Desinfection der Viehtransportwagen kann auch, unbeschadet der Verantwortlichkeit der zunächst gesetzlich verpflichteten Verwaltung, durch Verständigung mehrerer Verwaltungen unter einander über bestimmte Stationen, an denen die Desinfection vorzunehmen ist, genügt werden. Jedenfalls sind die Verwaltungen dafür haftbar, daß der Transport der entleerten Wagen bis zu dieser Station unter Aufsicht und strenger Vermeidung der Berührung mit Vieh erfolge und vor erfolgter Desinfection keine Wiederbenutzung der Wagen stattfinde.

§ 48. Wo die Ausladestation nicht zu fern von der Einfuhrgrenze liegt, ist es zulässig, die Wagen unter Aufsicht leer ohne vorgängige Desinfection wieder über die Grenze zurückgehen zu lassen.

§ 49. Die Wagen können auch, wenn der Versender dies ausdrücklich wünscht, demselben an geeigneten Stationen zu eigener Besorgung der Desinfection, deren richtige Ausführung aber dann die Eisenbahnverwaltung zu überwachen hat, zur Verfügung gestellt werden.

§ 50. Die Eisenbahnverwaltungen haben die nöthigen Anordnungen zu treffen, daß jeder zum Viehtransport benutzte Wagen, welcher noch nicht desinficirt worden ist, und eben so jeder desinficirte Wagen, als beziehentlich noch nicht desinficirt und desinficirt äußerlich erkennbar bezeichnet werde.

§ 51. Die Desinfection der Wagen hat stets nach Beseitigung des Strohes und Düngers mit einer gründlichen Reinigung von Fußboden und Wänden mittelst Wasser und stumpfer Besen zu beginnen.

Wo die Einrichtungen dazu vorhanden sind, kann die weitere Desinfection durch heiße Wasserdämpfe oder heißes Wasser und heiße alkalische Lauge (½ Pfund Soda auf 100 Pfund Wasser) erfolgen.

Wo dies nicht der Fall ist, empfiehlt sich Ausspülen und Ausspritzen mit kaltem, im Winter mit warmem Wasser, und sodann sorgfältiges Auspinseln entweder mit Chlorkalklösung, oder mit einem Gemische von Carbolsäure und Eisenvitriol. Letzteres ist so lange fortzusetzen, als noch der Dung- und Thierdunstgeruch am Wagen bemerkbar ist.

§ 52. Die Rampen sind ebenso zu reinigen, wie die Wagen.

§ 53. Der entleerte Dünger sammt Streumaterial ist zu sammeln und sofort mittelst Chlorkalk und Eisenvitriol zu desinficiren.

§ 54. Alle diese Arbeiten sind durch Personen auszuführen, welche nicht mit Rindvieh zu thun haben.

§ 55. Darüber, daß die Desinfection der Eisenbahnwagen gehörig ausgeführt werde, ist durch die Behörde eine Aufsicht und Controle zu üben.

Berlin, den 26. Mai 1869.

Der Kanzler des Norddeutschen Bundes.

Gr. v. Bismarck-Schönhausen.

Durch die im Vorstehenden angegebenen Maßregeln wird der Zweck, die Seuche schnell und gründlich zu tilgen, um so sicherer erreicht, wenn die Viehbesitzer selbst nach Kräften mitwirken, die Einschleppung der Seuche in ihre Gehöfte zu verhindern.

Wer in Zeiten, in welchen die Rinderpest im Inlande herrscht, Vieh ankauft und auf der Eisenbahn transportirt, hat zunächst für eine gründliche Desinfection der zu benutzenden Wagen zu sorgen. Das Vieh ist dann nach seiner Ankunft am Bestimmungsorte 10 — 14 Tage isolirt aufzustellen und muß während der Zeit von besonderen Wärtern gepflegt werden, sodaß, wenn dasselbe etwa an der Pest erkrankt, eine Verschleppung der Krankheit bis dahin nicht hat stattfinden können. Wenn irgend möglich, ist das Vieh während der Beobachtungszeit in isolirt liegenden Gehöften aufzustellen. Dies empfiehlt sich besonders in Wirthschaften, mit denen eine Zuckerfabrik oder eine Brennerei verbunden ist, da diese von der absoluten Sperre beim Ausbruche der Pest besonders hart

betroffen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Rinderpest auch auf Schafe übertragen werden kann. Schäfereihöfe sind deshalb sehr ungeeignete Quarantaine-Anstalten.

Mit besonderer Vorsicht ist solches Vieh zu behandeln, welches vorher auf Marktplätzen gestanden hat.

Wenn die Krankheit in der Nähe herrscht, so sind fremde Personen, namentlich solche, welche mit Vieh in Berührung kommen, von den Ställen fern zu halten. Das Wartepersonal ist anzuhalten, fremde Viehställe nicht zu betreten. Namentlich den Kuhhirten oder Futtermeistern größerer Güter, welche die Gewohnheit haben, nebenbei kranke Kühe im Orte zu behandeln, ist dies zu verbieten. Ein derartiges Curiren ist oft die Ursache der Einschleppung, bezw. der weiteren Verbreitung ansteckender Krankheiten.

Die Berührung der Zugochsen mit fremdem Vieh, z. B. auf Fabrikhöfen, ist soviel als möglich zu verhindern. Diese Vorsicht ist auch in Betreff der Lungenseuche geboten.

Wenn bei einem Rinde ein irgendwie rinderpestähnlicher Krankheitsfall vorkommt, so ist eine vorläufige Absperrung des Stalles geboten, bis eine Untersuchung durch einen Sachverständigen stattgefunden hat. Das Vieh ist im Stalle zu behalten; die mit dem kranken Thiere in Berührung gewesenen Personen sind im Gehöfte zu interniren und dürfen andere Viehställe in dem Gehöfte nicht betreten. Eine Trennung des kranken Thieres von den gesunden ist zweckmäßig, wenn ein passender Stall im Gehöfte vorhanden ist. In ein anderes Gehöft darf das kranke Thier nicht gebracht werden, weil sonst, wenn die Krankheit die Rinderpest ist, auch dieses zweite Gehöft als verseucht behandelt werden müßte. Auf eine Unterdrückung der Krankheit und Rettung der übrigen Thiere in demselben Stalle durch schleunige Entfernung des zuerst erkrankten Thieres ist nicht zu rechnen. Diese Trennung kann nur den Zweck haben, die Verschleppung der Krankheit in andere Ställe zu verhindern, indem Personen und Sachen, die Träger des Contagiums werden können, von dem abgesonderten Thiere leichter fern zu halten sind. Es liegt, abgesehen von der moralischen Verpflichtung, im eigenen Interesse jedes Besitzers, in dessen Viehbestande die Seuche zum Ausbruche kommt, die weitere Verbreitung der-

selben in dem Wohnorte nach Kräften zu verhindern, weil mit der Ausbreitung der Krankheit die Ortssperre strenger wird und länger, nämlich immer wenigstens bis 3 Wochen nach dem letzten Krankheitsfalle, andauert. Auch dann, wenn der Ausbruch der Seuche in einem Gehöfte constatirt und dieses durch Wächter abgesperrt ist, hat der Besitzer desselben die Pflicht gegen Andere und gegen sich selbst, bei der Absperrung mitzuwirken und jede Verschleppung des Contagiums so viel als möglich zu verhindern, namentlich seine Dienstboten zu controliren. Anderenfalls ist es oft sehr schwierig, ein Gehöft so zu bewachen, daß ohne besondere Erlaubniß nichts herauskommt.

Die Besitzer der seuchefreien Gehöfte in einer verseuchten Ortschaft werden selbstverständlich alles aufbieten, ihr Vieh vor der Ansteckung zu schützen. Dies ist zu erreichen durch Fernhaltung aller fremden Personen, Thiere und Sachen, welche Träger des Contagiums sein können, und durch strenge Beaufsichtigung der Dienstboten, namentlich der Viehwärter und Melker, damit dieselben fremde Gehöfte nicht betreten. Es ist zu berücksichtigen, daß die Seuche in einem Thiere schon vorhanden sein und von demselben aus weiter verschleppt werden kann, ohne daß das Thier krank erscheint. In einem Orte, wo die Rinderpest herrscht, muß der Vorsicht halber jedes Gehöft, auf welchem Rindvieh steht, als verdächtig betrachtet werden. Die Straßen und Wege, über welche das Vieh oder Sachen, Dünger u. s. w., aus dem verseuchten Gehöfte transportirt sind, müssen möglichst vermieden werden, bis eine gründliche Reinigung derselben stattgefunden hat. Diese Vorsichtsmaßregeln der Besitzer erkrankungsfähigen Viehes können durch die schärfsten polizeilichen Maßregeln nicht überflüssig gemacht werden.

Räucherungen der Viehställe oder arzneiliche Vorbeugungsmittel sind nicht im Stande, den Ausbruch der Rinderpest zu verhindern, wenn das Contagium eingeschleppt und mit einem dafür empfänglichen Thiere in Berührung gekommen ist.

Halle, Buchdruckerei des Waisenhauses.

2784.

Verlag der **Buchhandlung des Waisenhauses** in **Halle.**

Der Schutz der nützlichen Vögel

in seiner Nothwendigkeit für den Land-, Forst- und Gartenbau

von

Oeconomie-Rath Dr. **Stadelmann.**

Sechste Auflage. 1870. 4 Bog. gr. 8. Geh. 4 Sgr.

Eine neue und mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand der Gesetzgebung in Bezug auf die Vogelschutzfrage umgearbeitete Auflage befindet sich in Vorbereitung.

Untersuchungen über das Reifen des Getreides

nebst Bemerkungen über den zweckmäßigsten Zeitpunkt der Ernte

von

Dr. **Anton Nowacki.**

Mit 2 Steindrucktafeln. 1870. 8½ Bog. Lex. 8. Geh. 25 Sgr.

Zeitschrift des landwirthschaftlichen Central-Vereins der Provinz Sachsen,

herausgegeben vom

Oeconomie-Rath **Dr. Stadelmann,**

General-Secretair des Vereins.

12 Hefte à 2 Bogen. Lex. 8. geh. pr. Jahrgang 1 Thlr.

Die in weitesten Kreisen bekannte und in einer Auflage von 7800 Exempl. gedruckte Zeitschrift erscheint regelmäßig am 1. des betr. Monates und zeichnet sich unter Anderem auch dadurch aus, daß sie nur Originalartikel, zum Theil von den bedeutendsten landwirthschaftlichen Schriftstellern und practischen Landwirthen bringt. Das erste, an interessanten Arbeiten reiche Heft des neuen Jahrgangs wird als Probenummer einzeln versandt.

Unter der Presse befindet sich und erscheint Anfang Februar dieses Jahres:

Der landwirthschaftliche Pachtvertrag.

Von dem

landwirthschaftlichen Centralverein für die Provinz Sachsen

gekrönte Preisschrift

von

G. Drechsler,

o. Professor der Landwirthschaft an der Universität Göttingen.

In 2 Theilen. ca. 36 Bogen. Preis ca. 2 — 2½ Thlr.

Verlag der **Buchhandlung des Waisenhauses** in **Halle.**

Vaterländisches Lesebuch

für die

Evangelische Volksschule Norddeutschlands.

Herausgegeben

unter Mitwirkung von Dr. L. Meyn und Dr. A. Sach

von

H. Keck und **Chr. Johannsen.**

Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen.

1871. 3te sorgfältig revidirte Ausgabe. Preis 13 Sgr. geheftet, in Schulband R. u. E. in Leder 16 Sgr. Mit Anhang für die Provinz Sachsen bearbeitet von Dietlein. Preis 14 Sgr. geh., 17 Sgr. geb.

Norddeutsches Lesebuch.

Mit besonderer Berücksichtigung der Bedürfnisse der einklassigen Volksschule.

Herausgegeben

unter Mitwirkung von Dr. L. Meyn und Dr. A. Sach

von

H. Keck und **Chr. Johannsen.**

1870. 7te verbesserte Auflage. 19 Bog. gr. 8. Preis geh. 8 Sgr., in starkem Schulband 11 Sgr. Beide Lesebücher, seither im Verlage der Schulbuchhandlung (Herm. Heiberg) in Schleswig, haben sich in kürzester Zeit die übereinstimmende Anerkennung der Schulbehörden und der pädagogischen Presse erworben und dadurch eine so ausgedehnte Verbreitung gefunden, daß seit dem Jahre 1868 gegen 70,000 Exempl. abgesetzt wurden.

Durch das Königl. Preuß. Ministerium ꝛc. in den Provinzen Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Nassau, sowie in Lauenburg amtlich empfohlen, erfreuen sich die beiden Bücher auch in der Provinz Sachsen einer zunehmenden Verbreitung, da sie sich nicht nur für die Forderungen und Bedürfnisse der Volksschule als werthvolle Unterrichtsmittel bewährt, sondern auch durch den beispiellos billigen Preis, bei guter Ausstattung alle ähnlichen Bücher weit hinter sich gelassen haben.

Wir sind bereit, bei Einführungen den Herren Schulvorstehern und Lehrern die günstigsten Bedingungen zu stellen.

Heimathskunde der Provinz Sachsen

für

Volks- und Bürgerschulen bearbeitet

von **H. Schultze,** Lehrer in Halle.

Mit einer colorirten Karte der Provinz.

1870. 3½ Bogen. gr. 8. gebunden in Leinwandrücken 4 Sgr.

Auch dieses Buch hat sich seit Jahresfrist in sehr vielen Schulen unserer Provinz eingebürgert, so daß die erste, 3000 Expl. starke Auflage nahezu vergriffen ist und eine neue Auflage vorbereitet wird.

181168